

Neuer
PFLANZEN-KALENDER

oder

ANWEISUNG

welche in Deutschland wachsenden Pflanzen
man in jedem Monate blühend finden könne,
und an welchem Standorte.



Nach dem

jetzigen Standpunkte der Botanik

eingrichtet

von

D. KARL FRIEDRICH DOBEL.

ZWEITER BAND.

NÜRNBERG, 1835.

Druck und Verlag von Friedrich Campe.

Wd

Neuer

PELAVNER-KALENDER

oder

ANWEISUNG

welche in Deutschland wachsenden Pflanzen
man in jedem Monate pflanzen kann,
und an welchen Standorten.

—>>><<<—

Nach dem

jetzigen Standpunkte der Botanik

eingesichtet

von

D. KARL FRIEDRICH DORR.

ZWEITER BAND.

NÜRNBERG, 1835.

Druck und Verlag von Friedrich Campe.

ZWEITER BAND.

Jun bis December.

J U N.

1) *An Abhängen.*

Androsaemum, XVIII. Blüthen.

A. officinale All. (*Hypericum Androsaemum* L.),
englisches Hartheu.

An feuchten, schattigen Abhängen.

(*Asperugo procumbens* s. May S. 156.)

An feuchten, sonnigen Abhängen.

Chlora, VII. Chlora.

Chl. perfoliata L., durchwachsene Chlora.

An trocknen, steinigen Abhängen.

Iberis, XV. Schleifenblume.

I. linifolia L., leinblättrige Schleifenblume.

(*Arabis hirsuta* s. May S. 156.)

2) *An Ackerrändern.*

Salvia, II. Salbey.

S. Aethiopis L., ungarische Salbey.

S. Sclarea L., Muscateller Salbey.

Agrostis, III. Straussgras.

A. stolonifera L., wucherndes Str., wuchern-
der Windhalm.

Bromus, III. Trespe.

Br. sterilis L., unfruchtbare Trespe.

Lolium, III. Kolch.

L. perenne L., ausdauernder L., Taubenkorn,
englisches Raygras.

An Ackerrändern.

Verbascum, V. Wollkraut.

V. thapsiforme *Schrad.*

Eryngium, V. Mannstreu.

E. campestre *L.*, Feld-Mannstreu.

Bupleurum, V. Hasenohr.

B. rotundifolium *L.*, rundblättriges Hasenohr
oder Durchwachs.

Silene, X. Leimkraut.

S. Armeria *L.*, Garten-S., Morgenröschen.

Lychnis, X. Lichtnelke.

L. dioica *L.*, Wiesen-Lichtnelke, Lichtröschen,
Abend-Lichtnelke, weisses Marienröschen.

Reseda, XI. Wau.

R. Phyteuma *L.*, kleine Resede.

Euphorbia, XI. Wolfsmilch.

E. nicaeensis *All.*, glatte Wolfsmilch.

Rosa, XII. Rose.

R. marginata *Wallr.*, gerandete Rose.

Papaver, XII. Mohn.

P. intermedium *Beck.*, mittlerer Mohn.

Orobanche, XIV. Ervenwürger.

O. elatior *Sutt.*, hoher E., hohe Sommerwurz.

(Auf *Medicago falcata* und *sativa*.)

Althaea, XVI. Eibisch.

A. pallida *W. Kit.*, bleicher Eibisch.

Galega, XVII. Geisraute.

G. officinalis *L.*, gemeine Geisraute.

Ervum, XVII. Erve, Linse.

E. monanthos *L.*, einblüthige Linse.

Astragalus, XVII. Traganth.

A. asper *Jacq.*, scharfes Wirbelkraut.

Melilotus, XVII. Melote.

M. Petitpierreana *W.* (*Trifolium Petitpierreanum*
Hayne), Petitpierrische Melote.

*An Ackerrändern.***Coronilla, XVII. Kronwicke.****C. varia L., bunte Kronwicke.**

(*Salvia austriaca*, *Chilochloa aspera*, *Hordeum maritimum*, *Nonnea pulla*, *Anchusa arvalis*, *A. officinalis*, *Verbascum phoeniceum*, *Reseda lutea*, *Euphorbia virgata*, *Rosa arvina*, *R. hybrida*, *R. pumila*, *Linaria chalepensis*, *Lepidium perfoliatum*, *Euclidium syriacum*, *Laelia orientalis*, *Sisymbrium officinale*, *S. pannonicum*, *Hesperis tristis*, *Vicia bithynica*, *Lotus corniculatus*, *Barkhausia bursifolia*, *Scorzonera laciniata* s. May S. 156 ff.)

3) Auf Aeckern.**Apera, III. Windhalm.****A. interrupta P. B. (*Agrostis interrupta L.*), unterbrochener Windhalm.****A. spica venti P. B. (*Agrostis spica venti L.*), grosser Windhalm, Acker-Straussgras, grosse Ackerschmiele.****Eragrostis, III. Liebesgras.****E. megastachya Lk. (*Briza Eragrostis L.*), grossähriges L. oder Rispengras.****Bromus, III. Trespe.****Br. arvensis L., Acker-Trespe, bunte Trespe.****Br. divaricatus Rhod. ausgebreitete Trespe.****Avena, III. Hafer.****A. fatua L., Flug-Hafer, Wild-Hafer.****A. tenuis Mnch., zarter Hafer.****Lolium, III. Lolch.****L. temulentum L., betäubender L., Taumellolch, Tollkorn, Schwindelhafer.****Cynosurus, III Kammgras.****C. echinatus, weichstacheliges Kammgras.****Galium, IV. Labkraut.****G. Aparine L., kletterndes Labkraut.**

Auf Aeckern.

Galium saccharatum All. (*Vaillantia Aparine* L.),
Zucker-Labkraut. (Verwildert.)

G. spurium, L., lästiges Labkraut.

G. tricorne With., dreihörniges Labkraut.

Sherardia, IV. Sherardie.

S. arvensis L., Acker-Sh., Acker-Sternkraut,
kleine Ackerröthe.

Alchimilla, IV. Alchimille.

A. arvensis Scop., Acker-Sinau.

Sagina, IV. Mastkraut.

S. ciliata Fr., gewimpertes M. (In fettem Boden).

*Cerinth*e, V. Wachsblume.

C. minor L., kleine Wachsblume.

Anchusa, V. Ochsenzunge.

A. verrucosa Lam., warzige Ochsenzunge.

Campanula, V. Glockenblume.

C. trachelioides M. B. (In Berggegenden.)

Coriandrum, V. Coriander.

C. sativum L., gemeiner Coriander.

Orlaya, V. Orlaye.

O. grandiflora Hoffm. (*Caucalis grandiflora* L.),
grossblumige Haftdolde.

Linum, V. Lein.

L. humile Mill., niedriger Lein.

Porrum, VI. Porrey.

P. sphaerocephalum L., rundköpfiger Lauch.

Tribulus, X. Burzeldorn.

Tr. terrestris L., gemeiner Burzeldorn.

Saponaria, X. Seifenkraut.

S. Vaccaria L., Acker-Seifenkraut. (Zwischen
Sommergetreide.)

Silene, X. Leimkraut.

S. rubella L., röthliches Leimkraut.

Auf Aeckern.

Silene silvestris Schott. β . *Silene quinquevul-*
nera L. fünffleckige *Silene*.

Spergula, X. Spark.

Sp. arvensis L., Acker-Spark, Futter-Spark.

Oxalis, X. Sauerklee.

O. stricta Jacq., steifer Sauerklee.

Euphorbia, XI. Wolfsmilch.

E. segetalis L., Acker-Wolfsmilch.

Papaver, XIII. Mohn.

P. Argemone L., Sand-M., keulenförmiger M.

P. dubium L., zweifelhafter Mohn.

P. Rhoeas L., Acker-M., gemeine Klatschrose.

Glaucium, XIII. Hornmohn.

Gl. corniculatum P. (*Chelidonium cornicula-*
tum L.), bleichrother Hornmohn.

Delphinium, XII. Rittersporn.

D. Ajacis L., Garten-Rittersporn. (Verwildert.)

D. Consolida L., Feld-Rittersporn.

Adonis, XIII. Adonis.

A. flammea Jacq., brennendrothes Feuerröschen.

Phlomis, XIV. Phlomis.

Phl. tuberosa L., knollige Phlomis.

Stachys, XIV. Ziest.

St. palustris L., Sumpf-Ziest.

Antirrhinum, XIV. Löwenmaul.

A. Orontium L., wildes L., Feld-L., kleiner
Dorant.

Rapistrum, XV. Rapsdotter.

R. perenne All. (*Myagrum perenne All.*), aus-
dauernder Dotter.

Conringia, XV. Conringie.

C. orientalis Pers. (*Brassica orientalis L.*),
morgenländischer Kohl.

Auf Aeckern.

Malva, XVI. Malve, Käspappel.

M. rotundifolia L., rundblättrige Käspappel.

Pisum, XVII. Erbse.

P. arvense L., Stock-E. (Unter Sommergetreide.

Lathyrus, XVII. Platterbse.

L. hirsutus L., haarige Platterbse.

L. tuberosus L., Erdmandel, Erdnüsschen.

Vicia, XVII. Wicke.

V. Bobartii Forst., Bobartische Wicke.

V. grandiflora Scop., grossblumige Wicke.

V. hybrida L., Bastard-Wicke.

V. leucosperma Munch., weissamige Wicke.

V. polyphylla Desfo., vielblättrige Wicke.

V. villosa Rth., zotige Wicke.

Ervum, XVII. Erve, Linse.

E. dispernum Roxb., kleine und schwarze L.

E. hirsutum L., haarige Linse.

E. Lens L., gemeine Linse.

E. Lenticula Schreb., kleine Linsen - Erve.

Medicago, XVII. Schneckenklee

M. denticulata W., gezählter Schneckenklee.

M. orbicularis All. (*Medicago polymorpha* α .
orbicularis L.), tellerförmiger Schneckenklee.

Crepis, XIX. Pippau.

Cr. tectorum L., Dach-Pippau.

Anthemis, XIX. Chamille.

A. arvensis L., unächte Chamille, Acker-Ch.,
gemeine After-Chamille.

Centaurea, XIX. Flockenblume.

C. crupina L., feinblättrige Flockenblume.

Calendula, XIX. Ringelblume.

C. arvensis L., Acker-Ringelblume.

(*Veronica acinifolia*, *V. agrestis*, *V. arvensis*, *V. opaca*,
V. peregrina, *Valerianella Auricula*, *V. dentata*, *V. eriocarpa*,

Auf Aeckern.

Alopecurus creticus, *Phalaris paradoxa*, *Briza minor*, *Triticum villosum*, *Scabiosa arvensis*, *Sagina procumbens*, *Lycopsis arvensis*, *Anchusa azurea*, *Myosotis intermedia*, *M. versicolor*, *Anagallis arvensis*, *Convolvulus arvensis*, *Scandix Pecten*, *Caucalis daucoides*, *C. leptophylla*, *Myosurus minimus*, *Muscari comosum*, *Rumex Acetosella*, *Stellaria graminea*, *Stellaria media*, *Potentilla canescens*, *Ranunculus arvensis*, *R. bulbosus*, *Adonis aestivalis*, *Odontites verna*, *Melampyrum barbatum*, *Linaria pelisseriana*, *Camelina sativa*, *Teesdalia nudicaulis*, *Thlaspi arvense*, *Isatis tinctoria*, *Myagrum perfoliatum*, *Rapistrum rugosum*, *Neslia paniculata*, *Erysimum repandum*, *Brassica campestris*, *Sinapis arvensis*, *Raphanistrum segetum*, *Erodium moschatum*, *Geranium dissectum*, *G. rotundifolium*, *Fumaria parviflora*, *Lathyrus Nissolia*, *Vicia onobrychioides*, *V. pannonica*, *V. segetalis*, *V. uncinata*, *Ervum uniflorum*, *Ornithopus perpusillus*, *Arthrolobium scorpioides*, *Medicago Gerardi*, *Arnoseris pusilla*, *Barkhausia praecox*, *Matricaria Chamomilla* s. May S. 158 ff.)

a) *Auf Aeckern unter dem Getreide.*

(*Caucalis daucoides*, *Ranunculus arvensis*, *Adonis aestivalis*, *Geranium dissectum*, *Vicia segetalis* s. May S. 163.)

b) *Auf Aeckern unter Saat und Gemüse.*

(*Neslia paniculata* s. May S. 164.)

c) *Auf Aeckern verwildert.*

(*Lepidium virginicum* s. May S. 164.)

d) *Auf fetten, etwas feuchten Aeckern.***Orobanche, XIV. Ervenwürger.**

O. ramosa L., ästiger E. oder Hanfwürger, ästige Sommerwurz. (Auf *Cannabis sativa*, *Nicotiana Tabacum* und *Polygonum Fagopyrum*).

e) *Auf feuchten Aeckern.***Juncus, VI. Simse.**

J. capitatus Weig., kopfförmige Simse.

(*Bunium Bulbocastanum*, *Malachium manticum*, *Nasturtium palustre*, *N. silvestre* s. May S. 164.)

f) *Auf feuchten, sandigen Aeckern.*

Centunculus, IV. Kleinling.

Centunculus minimus L., Wiesen-Kleinling.

g) *Auf kalk- und lehmhaltigen Aeckern.*

Sonchus, XIX. Distelsalat.

S. arvensis L., Acker-Gänsedistel, Saudistel.

h) *Auf sandigen Aeckern.*

Chenopodium, V. Gänsefuss.

Ch. Botrys L., traubiger G., Traubenkraut.

Silene, X. Leimkraut.

S. silvestris Schott., wildes L., Wald-L.

Sabulina, X. Sandkraut, Sändling.

S. tenuifolia (Arenaria tenuifolia L.), feinblät-
teriges Sandkraut.

Papaver, XIII. Mohn.

P. hybridum L., Bastard-Mohn.

Acinos, XIV. Basilienthym.

A. thymoides Mnch. (*Thymus Acinos L.*),
blauer Berg-Thymian, Steinquendel.

(*Stellaria anomala*, *Erodium cicutarium* s. May S. 164.)

i) *Auf sonnigen Aeckern.*

(*Cynosurus echinatus* s. May S. 165.)

k) *Auf steinigen Aeckern.*

Stellera, VIII. Stellere.

St. Passeriana L., gemeine Spatzenzunge.

l) *Auf trocknen Aeckern.*

Echium, V. Natterwurz.

E. italicum L., italienischer Natterkopf.

E. vulgare L., gemeiner Natterkopf.

E. Wierzbickii Haberl., Wierzbicks N.

(*Saxifraga Tridactylites* s. May S. 165.)

4) *Auf und in Alpen.**A. Auf Alpen.*

Veronica, II. Ehrenpreis.

V. urticaefolia Jacq., nesselblättriger Ehrenpreis.

Poa, III. Rispengras.

P. nemoralis L., Hain-R., Wald-R. Var. *c.*

Poa marginata Willd.

Festuca, III. Schwingel.

F. alpestris R. S., Alpen-Schwingel.

Avena, III. Hafer.

A. flavescens L., gelblicher H. Var. *c. variegata.*

Cortusa, V. Cortuse.

C. Matthioli Clus., Matthioli's C., Bergsanikel.

Soldanella, V. Drattelblume.

S. minima Hoppe, kleine Drattelblume.

S. pusilla Baumg., winzige Drattelblume.

Primula, V. Primel, Schlüsselblume.

Pr. crenata Lam., gerandete Schlüsselblume.

Pr. glaucescens Morett., blaugrünliche Schl.

Campanula, V. Glockenblume.

C. pubescens Schm., weichhaarige Glockenbl.

C. pulla L., dunkelblaue Glockenblume.

Rhamnus, V. Kreuzdorn.

Rh. pumilus L., niedriger Kreuzdorn.

Gentiana, V. Enzian.

G. verna L., Frühlings-E., Schusternägelein.

Heracleum, V. Bärenklau.

H. siifolium Rchb. (*Tordylium siifolium Scop.*),
merkblättriger Bärenklau.

Athamanta, V. Augenwurz.

A. Matthioli Wulff., fadenblättrige Hirschwurz.

Laserpitium, V. Laser.

L. peucedanoides L., haarstrangartiges L.

Auf Alpen.

Linum, V. Lein.

L. narbonense *L.*, französischer Lein.

Juncus, VI. Simse.

J. alpinus *Vill.*, Alpen-Simse.

Toffieldia, VI. Toffieldie.

T. calyculata *Wahlb.* (*Anthericum calyculatum L.*), kelchfrüchtige Liliensimse, Var. *Tof. rubra*.

Saxifraga, X. Steinbrech.

S. atropurpurea *L.*, schwarzpurpurrother St.

S. Cotyledon *L.*, nabelkrautartiger, pyramidenförmiger Steinbrech.

S. Geum *L.*, nierenblättriger Steinbrech.

S. Hostii *Tsch.*, Hostischer Steinbrech.

Dianthus, X. Nelke.

D. silvestris *Wulff.*, wilde Nelke.

Silene, V. Leimkraut.

S. inflata *Sm.* Var. *Cucubulus viridis Lam.*, grüner Taubenkropf.

Arenaria, X. Sandkraut.

A. villosa *Wulff.*, zotiges Sandkraut.

Potentilla, XII. Fingerkraut.

P. affinis *H. st.*

Delphinium, XIII. Rittersporn.

D. intermedium *Ait.*, mittlerer Rittersporn.

Orobanche, XIV. Ervenwürger.

O. platystigma *Rchb.*

Pedicularis, XIV. Läusekraut.

P. comosa *L.*, schopfblüthiges Läusekraut.

Draba, XV. Hungerblümchen.

Dr. ciliata *Scop.*, gefranztes Hungerblümchen.

Dr. muricella *Wahlb.*

Alyssum, XV. Steinkraut.

A. alpestre *L.*, Alpen-Steinkraut.

Auf Alpen.

Arabis, XV. Gänsekraut.

A. ciliata R. Br., wimperiges Gänsekraut.

Geranium, XVI. Storchschnabel.

G. argenteum L., silberblättriger Storchschn.

G. silvaticum L., Wald-Storchschnabel.

Orobanchus, XVII. Walderbse.

O. laevigatus Kit., geglättete Walderbse.

O. luteus L., gelbe Walderbse.

Artemisia, XIX. Beifuss.

A. valesiaca All., Walliser Beifuss.

Anthemis, XIX. Chamille.

A. mucronulata Bertol., borstenstachelige Ch.

Centaurea, XIX. Flockenblume.

C. variegata Lam., bunte Flockenblume. Var.

Centaurea Fischeri W.

Orchis, XX. Knabenkraut.

O. atropurpurea Tsch., schwarzpurpurrothes Kn.

Vignea, XXI. Segge.

V. Grypos (Carex Grypos Schk.), krummfrüchtige Segge, krummfruchtiges Riedgras.

Carex, XXI. Riedgras.

C. brachystachys Schrk., kurzähriges Riedgras.

C. brevifolia Host., kurzblättriges Riedgras.

C. firma Host., hartblättriges Riedgras.

Salix, XXII. Riedgras.

S. limosa Wahlenb. (*Salix arenaria L.*), Gebirgs-Weide.

S. myrsinites L., myrsinenartige Weide.

S. prunifolia Sm., pflaumenblättrige Weide.

S. Waldsteiniana Willd., Waldsteinische W.

Empetrum, XXII. Rauschbeere.

E. nigrum L., gemeine, schwarze R. oder Hexenbeere.

Auf Alpen.

(*Valeriana montana*, *Alchimilla alpina*, *A. fissa*, *A. pubescens*, *Soldanella alpina*, *Primula ciliata*, *Pr. integrifolia*, *Pr. pubescens*, *Androsace Chamaejasme*, *Juncus bufonius*, *Vaccinium Myrtillus*, *Saxifraga aretioides*, *S. rotundifolia*, *Silene Saxifraga*, *Aronia cretica*, *Dryas octopetala*, *Pulsatilla alba*, *P. vernalis*, *Callianthemum rutaefolium*, *Scutellaria alpina*, *Pedicularis foliosa*, *Draba azoides*, *Dr. confusa*, *Dr. contorta*, *Arabis crispata*, *A. ovirensis*, *Vignea capitata*, *Carex ferruginea*, *Alnus viridis*, *Pinus Cembra*, *P. rotundata*, *Salix myrtilloides*, *S. retusa* s. May S. 165. ff.)

a) *Auf Alpen an grasigen Abhängen.*

Gentiana, V. Enzian.

G. obtusifolia W., stumpfblättriger Enzian.

Scorzonera, XIX. Haferwurz.

S. rosea W. Kit., rosenfarbene Haferwurz.

b) *Auf Alpen an Felsen und felsigen Orten.*

Primula, V. Primel, Schlüsselblume.

P. viscosa Vill., klebrige Schl. (In Felsritzen.)

Campanula, V. Glockenblume.

C. cespitosa Scop., Rasen-Glockenblume.

Saxifraga, X. Steinbrech.

S. caesia L., blaugrüner St. (Auf Kalkfelsen.)

Sabulina, X. Sändling.

S. Gerardi (*Arenaria Gerardi W.*), Gerards-Sandkraut.

S. lanceolata (*Arenaria lanceolata All.*), lanzettblättriges Sandkraut. (In Felsritzen.)

Sedum, X. Fetthenne.

S. annuum L., einjährige Fetthenne.

S. atratum L., schwärzliche Fetthenne. (Beide auf nackten Felsen.)

Atragene, XIII. Alprebe.

A. alpina L., Alpen-Doppelblume.

Ranunculus, XIII. Ranunkel, Hahnenfuss.

R. alpestris L., Alpen-R. oder H. (In Felsritzen.)

Auf Alpen an Felsen und felsigen Orten.

(*Primula hirsuta*, *Rhodothamnus Chamaecistus*, *Saxifraga oppositifolia*, s. May S. 167 f. — In Felsritzen: *Primula viscosa*, *Ranunculus alpestris* s. May S. 168.)

An sonnigen Felsen.

Poa, III. Rispengras.

P. nemoralis L., Hain-Rispengras. Var. *d. P. glauca* Sm.

An felsigen nassen Stellen.

Carex, XXI. Riedgras.

C. Mielichhoferi Schk., Mielichhofers Riedgras.

An felsigen, trocknen Orten.

Arctostaphylos, X. Bärentraube.

A. alpina Spr., (*Arbutus alpina* L.), Alpen-B., Alpen-Sandbeere.

c) Auf Alpen an feuchten Stellen.

Luzula, VI. Hainsimse.

L. spadicea De. C. (*Juncus pilosus* b. Linn.), braunblüthige Hainsimse.

Carex, XXI. Riedgras.

C. geniculata Host., kniehalmiges Riedgras.

An feuchten, schattigen Orten.

Saxifraga, X. Steinbrech.

S. cuneifolia L., keilblättriger Steinbrech.

Ranunculus, XIII. Ranunkel, Hahnenfuss.

R. vaginatus Sommerauer, weisser Hahnenkamm.

An feuchten, steinigen Orten.

Anemone, XIII. Windblume, Windröschen.

A. narcissiflora L., narcissenblüthige W.

d) Auf Alpen-Gerölle.

Lloydia, VI. Lloydie.

L. serotina Rchb. (*Anthericum scrobinum* L.), späte Zaunblume.

Auf Alpen-Gerölle.

Oxytropis, XVII. Spitzfahne.

O. campestris *De C.* (*Astragalus campestris* *L.*),
Feld-Spitzfahne, Feld-Wirbelkraut.

(*Cerinthe glabra* s. May S. 168.)

e) *Auf Alpen an grasigen, trocknen Orten.*

(*Carex mucronata* s. May S. 168.)

f) *Auf Moorgrund.*

Viola, V. Veilchen.

V. palustris *L.*, Sumpf-Veilchen.

Pinus, XXI. Kiefer.

P. Mughus *Scop.*, Berg-Fichte.

g) *Auf Alpen an quelligen Orten.*

Ranunculus, XIII. Ranunkel, Hahnenfuss.

R. alpestris *L.*, Alpen-Ranunkel oder Hahnenfuss.

(*Pinguicula flavescens*, *Saxifraga stellaris* s. May S. 168.)

h) *Auf sandigen, steinigen Orten.*

Festuca, III. Schwingel.

F. nigrescens *Lam.*, schwärzlicher Schwingel.

i) *Auf Alpen an steinigen Orten.*

Androsace, V. Mannsschild.

A. lactea *L.*, milchweisser Mannsschild.

Atragene, XIII. Alprebe.

A. alpina *L.*, Alpen-Doppelblume.

Ranunculus, (s. oben) Traunfellneri *Hopp.*, Traun-
fellners Ranunkel oder Hahnenfuss.

Polygala, XVII. Kreuzblume.

P. alpestris *Rchb.*, Alpen-Kreuzblümchen.

Phaca, XVII. Berglinse.

Ph. alpina *Jacq.*, Alpen-Berglinse.

k) *Auf Alpen-Sumpfwiesen und an Alpen-Teichen.*

Eriophorum, III. Wollriet.

E. capitatum Host., kopfförmiges Wollgras.

Vignea, XXI. Segge.

V. Grypos (Carex Grypos Schk.), krummfrüchtige Segge, krummfrüchtiges Riedgras.

l) *Auf Alpentriften.*

Veronica, II. Ehrenpreis.

V. Fröhlichiana Rchb., Fröhlichischer E.

Alchimilla, IV. Alchimille.

A. alpina L., Alpen-Sinau.

Primula, V. Primel, Schlüsselblume.

Pr. longiflora All., langblumige Schlüsselblume.

Polygonum, VIII. Knöterich.

P. viviparum L., knollentragender Kn., kleine Natterwurz.

Horminum, XIV. Horminum.

H. pyrenaicum L., pyrenäische Melisse.

Oxytropis, XVII. Spitzfahne.

O. campestris De C. (Astragalus campestris L.), Feld-Sp., Feld-Wirbelkraut.

Onobrychis, XVII. Esparsette, Hahnenkopf.

O. montana De C. (Hedysarum confertum Desf.), gedrängter Hahnenkopf.

Senecio, XIX. Kreuzkraut.

S. alpinus Scop., Alpenkresse, herzblättrige Aschenpflanze.

(*Veronica alpina*, *V. aphylla*, *Gentiana acaulis*, *G. alpina*, *G. angustifolia*, *G. discolor*, *Rumex alpinus*, *Potentilla aurea*, *Sieversia montana* s. May S. 168 f.)

Auf steinigen Alpentriften.

(*Gentiana angulosa* s. May S. 169.)

m) *In Alpenwäldern.*

Valeriana, III. Baldrian.

V. tripteris L., dreiblättriger Baldrian.

Cortusa, V. Cortuse.

C. Matthioli Clus., Matthioli's C., Bergsanikel.

Phyteuma, V. Rapunzel.

Ph. fistulosum Rchb., röhrlige Rapunzel.

Dianthus, X. Nelke.

D. barbatus L., Bartnelke.

Homogyne, XIX. Alplattig.

H. alpina H. Cass (*Tussilago alpina L.*), Alpen-Huflattig, Groschenkraut.

n) *Auf Alpenwiesen.*

Poa, III. Rispengras.

P. sudetica Haenke, Riesengebirgs-Rispengras.

Campanula, V. Glockenblume.

C. Alpini L., Alpini's Glockenblume.

C. rhomboidalis L., rautenförmige Glockenbl.

Gagea, VI. Gilbsterne.

G. fistulosa (*Ornithogalum fistulosum Ram.*), röhrliger G. oder Milchsterne oder Vogelsterne.

Luzula, VI. Hainsimse.

L. spadicea De. C. (*Juncus pilosus b. Linn.*), braunblüthige Hainsimse.

Bartsia, XIV. Bartsie.

B. alpina L., Alpen-Bartsie.

Pedicularis, XIV. Läusekraut.

P. versicolor Wahlb., buntes Läusekraut.

Geracium, XIX. Sperberkraut.

G. incarnatum (*Hieracium incarnatum Jacq.*), röthliches Sp., oder Habichtskraut.

Willemetia, XIX. Willemetie.

W. apargioides Neck. (*Crepis apargioides Willd.*), pfaffenröhrleinartiger Pippau.

Auf Alpenwiesen.

Cineraria, XIX. Aschenpflanze.

C. pratensis Hoppe, Wiesen-Aschenpflanze.

Gymnadenia, XX. Nacktdrüse.

G. suaveolens (*Orchis suaveolens* Vill.), wohlriechendes Knabenkraut.

o) Auf Hochalpen.

Azalea, V. Azalee.

A. procumbens L., liegende A., liegender Felsenstrauch.

Campanula, V. Glockenblume.

C. barbata L., rauhblüthige Glockenblume. (Auf höhern Alpenwiesen.)

Gentiana, V. Enzian.

G. alpina Vill., Alpen-Enzian.

G. pumila Jacq., Zwerg-E. (Beide auf Triften.)

Saxifraga, X. Steinbrech.

S. androsacea L., mannsschildartiger St. (An feuchten Orten.)

S. exarata Vill., genervter, gefurchter Steinbr.

S. stellaris L., sternförmiger St. (An quelligen Orten.)

Silene, X. Leimkraut.

S. acaulis L., stielloses Leimkraut. (An grasigen, steinigen Orten, in Thälern auf Gerölle.)

Ranunculus, XIII. Ranunkel, Hahnenfuss.

R. aconitifolius L., eisenhutblättriger R., weisser Bergranunkel. (Auf Triften.)

R. alpestris L., Alpen-R. (An steinigen Orten, in Felsritzen.)

R. parnassifolius L., parnassienblättriger R. (Auf Gerölle.)

Erinus, XIV. Leberbalsam.

E. alpinus L., Alpen-L. (Auf steinigen Triften.)

*Auf Hochalpen.***Pedicularis**, XIV. Läusekraut.*P. asplenifolia Floerke*, streifenfarnnblättriges L.*P. verticillata L.*, vierblättriges Läusekraut.

(Auf Triften.)

Draba, XV. Hungerblümchen.*Dr. Sauteri Hoppe*, Sauters-Hungerblümchen.**Anthyllis**, XVII. Wundklee.*A. alpestris Rchb.*, Alpen-Wundklee. (Auf Triften an steinigen Orten.)**Orobus**, XVII. Walderbse.*O. luteus L.*, gelbe W. (In hohen Alpenwäldern an steinigen Orten.)p) *Auf den höchsten Alpen.***Koeleria**, III. Kammschmiele.*K. subspicata Rchb.* (*Aira subspicata L.*), ährentragende Schmiele. (An der Schneegrenze.)**Androsace**, V. Mannsschild.*A. villosa L. Wulff.*, zotiger Mannsschild.**Aretia**, V. Aretie.*A. glacialis Schleich.*, Gletscher-Aretie.*A. helvetica L.*, schweizerische A. (In Felsritzen.)**Lloydia**, VI. Lloydie.*L. serotina Rchb.* (*Anthericum serotinum L.*), späte Zaunblume.**Juncus**, VI. Simse.*J. arcticus W.* (*Juncus effusus a. Linn.*), nördliche Simse. (Auf Glimmerschiefer.)*J. trifidus L.*, dreitheilige S. (Auf Urgebirge.)**Pulsatilla**, XIII. Küchenschelle.*P. vernalis Mill.* (*Anemone vernalis L.*), Frühlings-Küchenschelle, frühe Waldtulpe.**Ranunculus**, XIII. Ranunkel, Hahnenfuss.*R. pyrenaeus L.*, Pyrenäen-R. (An unfruchtbaren Plätzen.)

Auf den höchsten Alpen.

Petrocallis, XV. Steinschmüchel.

P. pyrenaica R. Br. (*Draba pyrenaica L.*), spaltblättriges Hungerblümchen. (Auf den höchsten Jochen)

Carex, XXI. Riedgras.

C. capillaris L., haarstieliges Riedgras.

C. rupestris All., Felsen-R. (An Felsblöcken.)

B. In Alpengegenden und Alpenthälern.

Chaerophyllum, V Kälberkropf.

Ch. Cicutaria Vill., schierlingsartiger K.

Noccaea, XV. Noccäe.

N. cepeaefolia Rchb. (*Iberis cepeaefolia W lf.*), sedumblättriger Bauernsenf, sedumbl. Zungenblume.

Thlaspi, XV. Täschelkraut.

Thl. alpinum Jacq., Alpen-Täschelkraut.

Oxytropis, XVII. Spitzfahne.

O. campestris De C. (*Astragalus campestris L.*), Feld-Spitzfahne, Feld-Wirbelkraut.

Geracium, XIX. Sperberkraut.

G. parviflorum (*Hieracium parviflorum Schleich.*), kleinblüthiges Sp. oder Habichtskraut.

Carex, XXI. Riedgras.

C. frigida All., kaltes Riedgras.

(*Anthoxanthum odoratum*, *Campanula barbata*, *Rumex scutatus*, *Saxifraga Cotyledon*, *Rosa pendulina*, *Acinos alpinus*, *Pedicularis recutita*, *Geracium aureum*, *Carduus carlinaefolius*, *Carex baldensis*, *Empetrum nigrum* s. May S. 169 f.)

a) *An lichten, grasigen Anhöhen.*

(*Thesium alpinum* s. May S. 170.)

b) *An Alpen-Bächen und Flüssen, auf Gries.*

Arabis, XV. Gänsekraut.

H. ciliata R. Br. gewimpertes G. (Auf Glimmerschiefer-Gries.)

An Alpen-Bächen und Alpen-Flüssen auf Gries.

Polygala, XVII. Kreuzblume.

P. alpestris *Rchb.*, Alpen-Kreuzblümchen.

Salix, XXII. Weide.

S. grandifolia *Ser.* grossblättrige Weide.

(*Cerinth glabra*, *Saxifraga oppositifolia*, *Gypsophila repens*, *Linaria alpina*, *Noccaea alpina*, *N. rotundifolia*, *Biscutella laevigata*, *Kenera saxatilis*, *Arabis bellidifolia* siehe May S. 170. f.)

c) In Alpengegenden und Alpenthälern an Felsen.

Paederota, II. Päderote.

P. Ageria *L.*, gelbe Päderote.

P. Bonarota *L.*, blaue Päderote.

(*Helianthemum alpestre*, *Ononis rotundifolia* s. May S. 171.)

An sonnigen Felsen.

Lychnis, X. Lichtnelke.

L. Flos Jovis *Lam.* (*Agrostemma Flos Jovis* *L.*), doldentraubige Rade.

In Felsspalten.

Hieracium, XIX. Habichtskraut.

H. amplexicaule *L.*, stängelumfassendes H.

(*Sabulina Ponaee*, *Noccaea alpina* s. May S. 171.)

An felsigen, steinigen Orten.

(*Atragene alpina*, *Arabis alpina*, s. May S. 172.)

An feuchten, etwas schattigen Felsen und an bemoosten Steinen.

(*Moehringia muscosa* s. May S. 172.)

Am Fusse der Alpen an felsigen, trocknen Stellen.

Campanula, V. Glockenblume.

C. spicata *L.*, ährenblüthige Glockenblume.

Unter Felsen.

(*Cortusa Matthioli* s. May S. 172.)

d) *In Alpengegenden an feuchten Stellen.*

Carex, XXI. Riedgras.

C. geniculata Host., kniehalmiges Riedgras.

(*Streptopus amplexifolius*, *Ranunculus aconitifolius* siehe May S. 172.)

An feuchten, schattigen Orten.

Sisymbrium, XV. Rauke.

S. austriacum Jacq., österreichische Rauke.

(*Viola biflora* s. May S. 172.)

An feuchten, steinigen Plätzen.

(*Potentilla aurea* s. May S. 172.)

e) *An Alpenflüssen* (s. oben unter b).

f) *Zwischen Gebüsch.*

(*Anemone trifolia* s. May S. 173.)

g) *Auf Gerölle.*

Cerinthe, V. Wachsblume.

C. glabra Mill., glatte W., schwäbische W.

(*Silene acaulis*, *Leontodon Taraxaci* s. May S. 173.)

h) *Auf trocknen Grasplätzen und Hügeln.*

Saxifraga, X. Steinbrech.

S. mutata L., veränderter Steinbrech. (Auf Thonboden.)

(*Lotus corniculatus* Var. *b.* s. May S. 173.)

Auf trocknen, sandig-steinigen Grasplätzen.

(*Carex atrata* s. May S. 173.)

i) *Auf Gries* s. oben unter b).

k) *Auf Heideboden.*

Galium, IV. Labkraut.

G. silvestre Poll., Wald-Labkraut.

l) *Auf Hügeln* (Vergl. h.)

(*Carex alpestris* s. May S. 173.)

m) *In Alpengegenden auf Mauern.*

Hieracium, XIV. Habichtskraut.

H. amplexicaule L., stängelumfassendes *H.*

n) *Auf Moorboden.*

Viola, V. Veilchen.

V. palustris L., Sumpfveilchen.

Rhododendron, X. Alpbalsam.

Rh. ferrugineum L., rostfarbiger *A.*, rostblät-
terige Alpenrose.

Rh. hirsutum L., gefranzter, haariger *A.*, ge-
franzte, haarige Alpenrose.

Bartsia, XIV. Bartsie.

B. alpina L., Alpen-Bartsie.

Carex, XXI. Riedgras.

C. firma Host., steifblättriges *R.* (Auf Moorziesen).

(*Pinguicula flavescens* s. May S. 173.)

o) *An Quellen.*

(*Ranunculus aconitifolius* β . s. May S. 174.)

An quelligen Orten.

Saxifraga, X. Steinbrech.

S. mutata L., veränderter Steinbrech.

(*Pinguicula flavescens* s. May S. 174.)

p) *Auf sandigem, steinigem Boden.*

Silene, X. Leimkraut.

S. inflata Sm., aufgeblasenes Leimkraut. *Var. A.*
glabra α . *vesicaria* und β . *glauca*.

q) *In Schluchten.*

(*Cortusa Matthioli* s. May S. 174.)

r) *An steinigen Orten* (Vergl. c).

Cardamine, XV. Schaumkraut.

C. hirsuta L., haariges *Sch.* (An lichten,
freien Plätzen.)

s) *Auf Sumpfwiesen.*

Eriophorum, III. Wollriet.

E. capitatum Host., kopfförmiges Wollgras.

Viola, V. Veilchen.

V. palustris L., Sumpf-Veilchen.

Vignea, XXI. Segge.

V. Grypos (*Carex Grypos* Schk.); krummfrüchtige Segge, krummfrüchtiges Riedgras.

Carex, XXI. Riedgras.

C. capillaris L., haarstieliges Riedgras.

(*Pedicularis acaulis* s. May S. 174.)

t) *Auf Triften.*

(*Gentiana acaulis*, *Potentilla aurea*, *Sieversia montana*, *Ranunculus montanus* s. May S. 174.)

u) *In Wäldern.*

(*Valeriana tripteris*, *Cortusa Matthioli*, *Homogyne alpina* — *Veronica urticaefolia* s. May S. 174 f.)

v) *Auf Wiesen.*

(*Senecio alpinus* s. May S. 175.)

5) *Angebaut oder angepflanzt (und zum Theil verwildert).*

Olea, II. Oelbaum.

O. europaea L., gemeiner Oelbaum.

Hordeum, III. Gerste.

H. distichon L., zweizeilige G., Sommer-G.

H. hexastichon L., sechszeilige Gerste, Roll-G., Stock-Gerste.

H. vulgare L., gemeine oder vierzeilige Gerste.
(Verwildert.)

H. Zeocriton L., Bart-, Fächer-, Pfauen-, Reiss-G.

Triticum, III. Weizen.

Tr. dicoccum Schrk., Amelkorn, Emer, russischer Mehldinkel, Reissdinkel, Zweikorn.

Angebaut oder angepflanzt.

Triticum durum Desf., arabischer Winterweizen,
Tuneser Weizen.

Tr. monococcum L., Einkorn, St. Peterskorn.

Tr. polonicum L., polnischer W., astrakanisches,
wallachisches Korn.

Tr. Spelta L., Spelz, Dinkel, Fäsen.

Tr. vulgare Vill., gem. W., Sommer-, Winter-W.

Asterocephalus, IV. Kronen-Scabiose.

A. atropurpureus (*Scabiosa atropurpurea L.*),
schwarzrothe Scabiose.

Solanum, V. Nachtschatten.

S. tuberosum L., knolliger, essbarer N., Erd-
apfel, Kartoffel.

Lycium, V. Bocksdorn.

L. barbarum L., chinesischer Bocksdorn.

L. europaeum L., europäischer Bocksdorn.

Zizyphus, V. Judendorn.

Z. vulgaris Lam. (*Rhamnus Zizyphus L.*), ge-
meiner J. (Im südlichen Gebiete verwildert.)

Anethum, V. Dill.

A. graveolens L., gemeiner, zahmer Dill oder
Till, Gurken-Till, Kümmerlingskraut. (Verw.)

Levisticum, V. Liebstöckel.

L. vulgare J. Bauh (*Ligusticum Levisticum L.*),
gemeiner, gewöhnlicher Liebstock, Liebstöckel.

Petroselinum, V. Petersilie, Stein-Silge.

P. sativum Hoffm. (*Apium Petroselinum L.*),
Petersilien-Eppich, Peterling. (Verwildert.)

Foeniculum, V. Fenchel.

F. officinale All (*Anethum Foeniculum L.*), ge-
meiner, grosser, süsser Fenchel.

Rhus, V. Sumach.

Rh. Cotinus L., Perücken-S., Gelbholz-S.,
Perückenbaum.

Angebaut oder angepflanzt.

Rh. *Toxicodendron L.*, Gift-Sumach. (Verw.)

Rh. *Typhina L.*, virginischer S., Essigbaum,
grosser, hirschkolbiger S. (Verwildert.)

Linum, V. Lein, Flachs.

L. usitatissimum L., gewöhnlicher L. oder F.

Allium, VI. Lauch.

A. fistulosum L., Schnitzzwiebel, Winterzwiebel.

A. Schoenoprasum L., Schnittlauch.

Porrum, VI. Porrey.

P. ascalonicum (Allium ascalonicum L.), askalo-
nische Zwiebel, Schalotten.

P. commune C. Bauh., Porre.

P. sativum L., gemeiner, zahmer Knoblauch.

Lilium, VI. Lilie.

L. candidum L., weisse Lilie.

Silene, X. Leimkraut.

S. inflata Sm., Var. γ . *oleracea Fic.*, Knarre,
Knärre, Sandhohl.

Agrimonia, XI. Odermennig.

A. repens L., kriechender O. (Verwildert.)

Reseda, XI. Wau.

R. odorata K., Garten-Resede.

Prunus, XII. Pflaume, Kirsche.

Pr. semperflorens Ehrh., Allerheiligenkirsche.

Rosa, XII. Rose.

R. camtschatica Vent., kamtschatkische Rose.

R. caucasica M. B., caucasische Rose.

R. centifolia L., hundertblättrige R., Garten-
Rose, Centifolie.

R. coriifolia Fries., lederblättrige Rose.

R. Dicksonii Lindl., Dicksons Rose.

R. dimorpha Bess., doppelgestaltige Rose.

R. ferox Ait., wilde Rose.

R. glutinosa Sibth., klebrige Rose.

Angebaut oder angepflanzt.

Rosa hibernica Sm., irländische Rose.

R. involuta Sm., eingerollte Rose.

R. Jundzilliana Bess., Jundzillische Rose.

R. Sabini Woods, Sabinische Rose.

R. sulphurea Ait., schwefelgelbe Rose.

R. Wilsonii Hook, Wilsons-Rose.

R. Woodsii Lindl., Woodsische Rose.

Papaver, XIII. Mohn.

P. officinale Gm. (*Papaver somniferum L.* Var. γ .), weisser Mohn.

P. somniferum L., gemeiner M., Magsaamen, Oelmagen.

Tilia, XIII. Linde.

T. corallina Sm., Corallen-Linde.

T. corylifolia Host., haselblättrige Linde.

T. intermedia Host., mittlere Linde.

T. latebracteata Host., Linde mit breiten Nebenblättern.

T. mutabilis Host., braungelbliche Linde.

T. obliqua Host., schiefblättrige Linde.

T. platyphyllos Scop., breitblättrige Linde.

T. praecox Host., frühe Linde.

T. tenuifolia Host., dünnblättrige Linde.

T. vinifolia Host., weinblättrige Linde.

Nigella, XIII. Schwarzkümmel.

N. sativa L., gemeiner Schwarzkümmel.

Thymus, XIV. Thymian, Quendel.

Th. vulgaris L., gemeiner Thymian.

Matthiola, XV. Levkoy.

M. annua Sweet. (*Cheiranthus annuus L.*), Sommer-Levkoje.

M. fenestralis R. Br. (*Cheiranthus fenestralis L.*), englische Fenster-Levkoje.

Angebaut oder angepflanzt.

Matthiola viridis Rchb. (*Cheiranthus viridis Ehrh.*), Levkoje mit dem Lackblatte.

Raphanus, XV. Rettig.

R. sativus L., gemeiner, zahmer *R.* (Verwildert.)

Geranium, XVI. Storchschnabel.

G. striatum L., gestreifter Storchschnabel.

Lavatera, XVI. Lavatere.

L. trimestris L., Garten-Lavatere.

Althaea, XVII. Eibisch.

A. rosea Cav. (*Alcea rosea L.*), Stockrose, Herbstrose.

Lupinus, XVII. Wolfsbohne, Feigbohne.

L. albus L., weisse Feigbohne.

L. angustifolius L., schmalblättrige Feigbohne.

L. linifolius Rth., leinblättrige Feigbohne.

L. luteus L., gelbe Feigbohne.

Phaseolus, XVII. Bohne.

Ph. multiflorus W. (*Phaseolus vulgaris* β . *coccineus L.*), Feuerbohne.

Ph. nanus L., Zwerg-Bohne, Busch-Bohne.

Ph. vulgaris L., Stangenbohne, Schwertbohne.

Pisum, XVII. Erbse.

P. leptolobum Camer., holländische Zuckererbse, Sichelerbse.

P. quadratum C. Bauh., Eckerbse, Knockererbse.

P. saccharatum Host., Zuckererbse.

Lathyrus, XVII. Platterbse

L. odoratus L., wohlriechende Platterbse, spanische Wicke.

L. sativus L., teutsche Kicher, weisse Erve, Erbis.

Trigonella, XVII. Trigonelle.

Tr. Foenum graecum L., Bockshornklée, griechisches Heu.

Angebaut oder angepflanzt.

Cicer, XVII. Kicher.

C. arietinum *Dod. L.*, gemeine K., Kaffee-Erbse.

Ervum, XVII. Erve, Linse.

E. dispermum *Roxb.*, zweisaamige E. oder L.

E. Lens *L.*, Pfennig-Linse.

Astragalus, XVII. Traganth.

A. baeticus *L.*, spanisches Wirbelkraut, Kaffee-Stragel.

Trifolium, XVII. Klee.

Tr. sativum *Mill.*, spanischer, türkischer Klee.
(Verwildert.)

Onobrychis, XVII. Esparsette, Hahnenkopf.

O. sativa *Lam.* (*Hedysarum Onobrychis* *L.*),
gemeiner Hahnenkopf, Schweizerklee, Espar-
sette, Esper.

Hedysarum, XVII. Süssklee.

H. coronarium *L.*, italienischer Hahnenkopf.

Anthemis, XIX. Chamille.

A. nobilis *L.*, edle After-Chamille, römische Ch.
Garten-Ch., römischer Romey. (Verwildert)

Urtica, XXI. Nessel.

U. pilulifera *L.*, römische Nessel.

Cucurbita, XXI. Kürbis.

C. maxima *Duch.*, grosser Kürbis.

C. Melopepo *L.*, Melonen-Kürbis.

C. Pepo *L.*, gemeiner Kürbis.

Lagenaria, XXI. Keulen-Kürbis.

L. vulgaris *Ser.* (*Cucurbita Lagenaria* *L.*), Fla-
schen-Kürbis, Herculeskeule.

Cannabis, XXII. Hanf.

C. sativa *L.*, gemeiner Hanf. (Verwildert.)

Acacia, XXIII. Acacie.

A. Farnesiana *W.* (*Mimosa Farnesiana* *L.*), Far-
nesische Acacie.

Angebaut oder angepflanzt.

(*Gladiolus communis*, *Secale cereale*, *Elaeagnus angustifolia*, *Lonicera Caprifolium*, *L. Periclymenum*, *Vitis laciniosa*, *V. vinifera*, *Saxifraga hirsuta*, *Silene pendula*, *Philadelphus coronarius*, *Cydonia vulgaris*, *Spiraea opulifolia*, *Rosa altaica*, *R. blanda*, *R. carolina*, *R. damascena*, *R. floribunda*, *R. gemella*, *R. lucida*, *R. moschata*, *R. myriacantha*, *R. turbinata*, *Rubus odoratus*, *Fragaria chiloensis*, *Fr. eschschellii*, *Fr. elatior*, *Fr. grandiflora*, *Fr. virginiana*, *Camelina sativa*, *Lepidium sativum*, *L. virginicum*, *Cochlearia Armoracia*, *C. officinalis*, *Crambe maritima*, *Brassica campestris*, *Br. oleracea*, *Sinapis alba*, *Cheiranthus Cheiri*, *Colutea arborescens*, *Pisum ramulare*, *P. sativum*, *P. umbellatum*, *Robinia Pseudacacia*, *Cytisus Laburnum*, *Glycyrrhiza glabra*, *Medicago sativa*, *Citrus Aurantium*, *C. medica*, *Calendula officinalis*, *Morus alba*, *M. nigra*, *Castanea vesca*, *Pinus Strobilus*, *Spinacia inermis*, *Sp. oleracea* s. May S. 175 ff.)

6) *Auf Anhöhen.*

Poa, III. Rispengras.

P. nemoralis L., Hain-R. Var. *f. Poa coarctata* Hall fil.

Avena, III. Hafer.

A. pubescens L., weichhariger Hafer.

Asterocephalus, IV. Kronen-Scabiose.

A. columbarius (*Scabiosa columbaria* Linn.), Tauben-Scabiose.

(*Koeleria cristata*, *Festuca duriuscula*, *Bromus tectorum*, *Astragalus exscapus*, *Hieracium obscurum*, *Leontodon hispidus*, *Tragopogon undulatus* s. May S. 180 ff.)

a) *Auf bewachsenen Anhöhen.*

(*Danthonia calycina*, *Globularia vulgaris* s. May S. 182.)

b) *Auf dürren Anhöhen.*

(*Myosotis intermedia* s. May S. 182.)

c) *Auf grasigen Anhöhen.*

Campanula, V. Glockenblume.

C. glomerata L., knaulförmige Gl. (In Wäldern)

Auf grasigen Anhöhen.

Porrum, VI. Porrey.

P. Scorodoprasum (Allium Scorodoprasum L.),
Roccambole, Schlangen-Knoblauch.

Cineraria, XIX. Aschenpflanze.

C. spathulaefolia Gm., spathelblättrige A. (In
Gebirgswäldern.)

(Armeria vulgaris, Ornithogalum sulfureum, Potentilla
canescens, Thymus pannonicus, Arabis sagittata s. May
S. 182 f.)

*Auf grasigen, sonnigen Anhöhen in Berg-
gegenden.*

(Ophrys myodes s. May S. 183.)

Auf grasigen, steinigen Anhöhen.

(Turritis glabra s. May S. 183.)

d) *Auf kalkigen, sandigen, trocknen, waldigen
Anhöhen.*

Geranium, XVI. Storchschnabel.

G. columbinum L., Tauben-Storchschnabel.

e) *Auf schattigen Anhöhen zwischen Gebüsch
in Thälern der Gebirge und Voralpen.*

(Lunaria rediviva s. May S. 183.)

f) *Auf sonnigen Anhöhen.*

Festuca, III. Schwingel.

F. amethystina Host., violetter Schwingel.

Porrum, VI. Porrey.

P. crinitum (Allium crinitum Tsch.), haariger Lauch.

Helianthemum, XIII. Ciströschen.

H. piliferum Gmel., haartragendes C. oder S.

H. vulgare Gärtner. (Cistus Helianthemum L.),
gemeines C. oder Sonnenröschen.

Teucrium, XIV. Gamander.

T. Botrys L., Trauben-G. (Auf Kalkboden.)

(Muscari racemosum, Dianthus atrorubens, Helianthe-
mum grandiflorum, Genista decumbens, Hieracium Pilo-

Auf sonnigen Anhöhen.

sella, *Tragopogon major*, *Cephalanthera ensifolia*, *C. pal-lens* s. May S. 183. f. — *Globularis vulgaris*, ebend. 184. *Ophrys myodes* ebend. 185. — *Lepidium campestre* ebend.)

g) *Auf steinigen Anhöhen.*

(*Hieracium collinum* s. May S. 185.)

h) *Auf trocknen Anhöhen.*

Sedum, X. Fetthenne.

S. sexangulare L., sechseckiger Knörpel.

Geranium, XVI. Storchschnabel.

G. columbinum L., Tauben-Storchschnabel.

(*Arabis hirsuta*, *Erigeron acris* s. May S. 185.)

i) *Auf waldigen Anhöhen.*

Campanula, V. Glockenblume.

C. simplex De C., einfache Glockenblume.

Geranium columbinum (siehe oben).

7) *Auf aufgeschwemmtem Boden.*

(*Reseda lutea*, *Nasturtium anceps*, *N. silvestre* s. May S. 185.)

Auf fettem, aufgeschwemmten Boden.

Erodium, XVI. Reiherschnabel.

E. pimpinellifolium Sm. (*Geranium pimpinelli-folium* Cav.), bibernellblättriger R. oder Storchschnabel.

8) *In Auen.*

Euphorbia, XI. Wolfsmilch.

E. dulcis L., süsse, nichtscharfe Wolfsmilch.

Lathyrus, XVII. Platterbse.

L. incurvus W., krummfrüchtige Platterbse.

9) *An und in Bächen.*A. *An Bächen.*

Veronica, II. Ehrenpreis.

V. maritima L., Meerstrands-Ehrenpreis.

Valeriana, III. Baldrian.

V. officinalis L., gemeiner B. Var. β . Valeriana exaltata Mik.

Calamagrostis, III. Reithgras.

C. lanceolata Rth., (Arundo Calamagrostis L.), vielhalmiges R., Wiesenrohr.

Heliosciadium, V. Sumpfdoldchen.

H. nodiflorum Koch. (Sium nodiflorum L.), knotenblüthiger Merk.

Nasturtium, XV. Brunnenkresse.

N. rivulare Rchb., Bach-Brunnenkresse.

(Veronica serpyllifolia, Myosotis palustris, Chrysosplenium oppositifolium, Stellaria neglecta, Spiraea Aruncus, Sp. denudata, Sp. Ulmaria, Ranunculus Flammula, Nasturtium officinale, N. silvestre, Sisymbrium strictissimum, Cardamine amara s. May S. 186.)

a) *An Bächen in Berggegenden zwischen Waldgebüsch*

(Thalictrum aquilegifolium s. May S. 187.)

b) *An Bächen in Bergwäldern.*

(Actaea spicata s. May S. 187.)

c) *An Bächen in Gebirgstälern.*

Ephemerum, V. Ephemerum.

E. nemorum Rchb. (Lysimachia nemorum L.), kriechende Lysimachie, Egelkraut, Pfennigkrt.

d) *An Bächen zwischen Gebüsch.*

Malachium, X. Weichmeier.

M. aquaticum Fries. (Cerastium aquaticum L.), Wasser-Hornkraut.

e) *An Bächen in höheren Urgebirgswäldern.*

Geranium, XVI. Storchschnabel.

G. silvaticum L., Wald-Storchschnabel.

B. In Bächen.

Callitriche, I. Wasserstern.

C. autumnalis L., Herbst-W., *A. fluviatilis*.

C. platycarpa Ktzig., breitfrüchtiger W. *A. fluviatilis*.

Veronica, II. Ehrenpreis.

V. Beccabunga L., Quellen-E., Bachbungen, Wasser-Salat.

Ranunculus, XIII. Ranunkel, Hahnenfuss.

R. hederaceus L., epheublättriger R. oder H.

R. fluitans Lam., Wasser-Ranunkel.

(*Larbrea bracteata, L. uliginosa* s. May 187.)

10) *An sonnigen Basaltfelsen.*

(*Ruta divaricata* s. May S. 187.)

11) *In Baumgärten.*

Cynosurus, III. Kammgras.

C. cristatus L., gemeines Kammgras.

Aegopodium, V. Geisfuss, Giersch.

A. Podagraria L., gemeiner G., Strenzel, Zipperleinskraut.

(*Bromus racemosus* s. May S. 188.)

12) *Auf bebautem Boden.*

Gastridium, III. Bandgras.

G. lendigerum Gaud. L. (*Milium lendigerum L.*), ährentragendes Hirsegras.

Poa, III. Rispengras.

P. annua L., einjähriges Rispengras. (An feuchten Plätzen.)

Auf bebautem Boden.

Hordeum, III. Gerste.

H. bulbosum L., knollige Gerste.

Agropyrum, III. Queckengras.

A. repens P. B. (*Triticum repens L.*), kriechender Weizen, Quecke, Pädergras.

Crucianella, IV. Kreuzblatt.

Cr. angustifolia L., schmalblättriges Kreuzblatt.

Solanum, V. Nachtschatten.

S. nigrum, schwarzer Nachtschatten.

Campanula, V. Glockenblume.

C. rapunculoides L., rapunzelartige Glockenbl.

Conium, V. Schierling.

C. maculatum L., gefleckter Sch., Garten-Sch.

Aethusa, V. Gleise.

A. Cynapium L., gemeine Gl., kleiner Schierling, Hundspetersilie.

Foeniculum, V. Fenchel.

F. officinale All. (*Anethum Foeniculum L.*), gemeiner, grosser, süsser Fenchel.

Aegopodium, V. Geissfuss, Giersch.

A. Podagraria L., gemeiner G., Zipperleinskraut.

Asparagus, VI. Spargel.

A. officinalis L., gemeiner Spargel.

Silene, X. Leimkraut.

S. cerastoides L., hornkrautartiges Leimkraut.

Lychnis, X. Lichtnelke.

L. dioica L., Wiesen-L., Lichttröschen, Abend-Lichtnelke, weisses Marienröschen.

Euphorbia, XI. Wolfsmilch.

E. canescens L., graue Wolfsmilch.

E. peploides Gou., kleinste Wolfsmilch.

E. Peplus L., rundblättrige W., Garten-W.

Geum, XII. Benediktenkraut.

G. urbanum L., wahres B., gem. Nelkenwurz.

Auf bebaulichem Boden.

Papaver, XIII. Mohn.

P. hybridum L., Bastard-Mohn.

Iberis, XV. Schleifenblume.

I. amara L., bittere Schleifenblume oder Zungenblume, bitterer Bauernsenf.

Rapistrum, XV. Rapsdotter.

R. glabrum Host., (*Myagrum*) glatter R.

Erysimum, XV. Hederich.

E. cheiranthoides L., leiskoienartiger H., kleinblüthiger Hederich.

Althaea, XVI. Eibisch.

A. hirsuta L., haariger Eibisch.

Hibiscus, XVI. Hibiscus.

H. Trionum L., Stunden-Ibisch.

Fumaria, XVII. Erdrauch.

F. officinalis L., gemeiner E., Taubenkropf, Feldraute.

F. parviflora Lam., kleinblüthiger Erdrauch.

Vicia, XVII. Wicke.

V. sativa L., Futter-Wicke, Saat-Wicke.

Onobrychis, XVII. Esparsette, Hahnenkopf.

O. Caput galli Lam. (*Hedysarum Caput galli L.*), gemeiner Hahnenkopf.

Medicago, XVII. Schneckenklee.

M. carstiensis Wulff., karstischer Schneckenkl.

M. denticulata W., gezählter Schneckenklee.

Senecio, XIX. Kreuzkraut.

S. squalidus L., schmutziges Kreuzkraut.

Urtica, XXI. Nessel

U. urens L., kleine Brenn-Nessel.

(*Blitum Bonus Henricus*, *Veronica arvensis*, *V. serpyllifolia*, *Lophochloa phleoides*, *Avena sterilis*, *Asperugo procumbens*, *Convolvulus arvensis*, *Roucela Erinus*, *Anthriscus Cerefolium*, *Muscari comosum*, *M. racemosum*,

Auf bebautem Boden.

Stellaria media, *Cerastium triviale*, *C. vulgatum*, *Oxalis corniculata*, *O. stricta*, *Euphorbia Lathyris*, *E. stricta*, *Ranunculus parviflorus*, *Linaria minor*, *Alyssum sinuatum*, *Lepidium campestre*, *Cochlearia Armoracia*, *Sinapis alba*, *S. nigra*, *Sisymbrium Sophia*, *Geranium molle*, *G. pusillum*, *G. pyrenaicum*, *Fumaria capreolata*, *F. Vaillantii*, *Medicago lupulina*, *Lapsana communis*, *Sonchus asper*, *S. oleraceus*, *Scorzonera octangularis*, *Pyrethrum Parthenium*, *Senecio vulgaris* s. May S. 188 ff.)

An bebauten und feuchten Plätzen.

(*Poa annua* s. May S 191.)

13) *An und auf Bergen.*

Veronica, II. Ehrenpreis.

V. officinalis L., gemeiner, heilsamer Ehrenpr.

Agrostis, III. Straussgras.

A. canina L., Hunds-Str., Haargras.

Melica, III. Perlgras.

M. ciliata L., gefranztes, wolliges P., haariges Waldgras.

Festuca, III. Schwingel.

F. vaginata W.K., scheidentragender Schw.

Verbascum, V. Wollkraut.

V. Lychnitis L., lichtblumenartige Königskerze.

V. nigro-austriacum Rchb.

V. orientale M. B., morgenländische Königs-k.

V. thapsoides L., schmalblättrige Königskerze.

Physospermum, V. Blasensaame.

Ph. aquilegifolium Koch. (*Ligusticum aquilegifolium* Willd.), akeleiblättriger Liebstöckel.

Pimpinella, V. Pimpinelle.

P. Saxifraga L., Steinbibernell, Pfefferwurz.

Linum, V. Lein.

L. perenne L., ausdauernder L., sibirischer L.

An und auf Bergen.

Epilobium, VIII. Schotenweiderich.

E. hypericifolium Tsch., Johanniskrautblättriger Schotenweiderich.

Euphorbia, XI. Wolfsmilch.

E. pilosa L., behaarte Wolfsmilch.

Rosa, XII. Rose.

R. geminata Rau., Zwillings-Rose.

Rubus, XII. Himbeere, Brombeere.

R. hirtus W. Kit., rauhe Brombeere.

R. Menkeii Weihe, Menkeische Brombeere.

Potentilla, XII. Fingerkraut.

P. micrantha Ram., kleinblumiges Fingerkraut.

Micromeria, XIV. Bart-Saturey.

M. variegata (Satureia variegata Hst.), bunte Saturey.

Orobancha, XIV. Ervenwürger.

O. coerulea Vill., blauer E. Var. *Millefolii Rchb.*

Digitalis, XIV. Fingerhut.

D. fulva Lindl., rothgelber Fingerhut.

Galega, XVII. Geisraute.

G. officinalis L., gemeine Geisraute.

Astragalus, XVII. Traganth.

A. asper Jacq., scharfes Wirbelkraut.

Hypericum, XVIII. Hartheu.

H. pulchrum L., hübsches H. od. Johanniskraut.

Barkhausia, XIX. Barkhausie.

B. alpina Mnch. (*Crepis alpina L.*), Alpen-B., Alpen-Pippau.

Centaurea, XIX. Flockenblume.

C. sordida W., schmutzige Flockenblume.

(*Salvia pratensis*, *Iris biflora*, *Agropyrum cristatum*, *Rhamnus alpinus*, *Artemisia agrimonoides*, *Philadelphus coronarius*, *Rosa farinosa*, *Cistus salvifolius*, *Linaria triphylla*, *Polygala major*, *Trifolium montanum*, *Hippocrepis unisiliqua*, *Hypericum elegans*, *Hieracium peleterianum* s. May S. 191 ff.)

a) *An Bergabfällen.*

Rubus, XII. Himbeere, Brombeere.

R. cordifolius *Weihe*, herzblättrige Brombeere.

An Bergabhängen.

Luzula, VI. Hainsimse.

L. albida *De C.* (*Juncus pilosus e. Linn.*), Var. *rubella Hoppe*, röthliche Hainsimse.

An grasigen Bergabhängen.

Polygala, XVII. Kreuzblume.

P. comosa *Schk.*, schopfförmige Kreuzblume.

An feuchten, schattigen Abhängen.

(*Asperugo procumbens* s. May S. 194.)

b) *Auf grasigen Bergebenen.*

Veronica, II. Ehrenpreis.

V. prostrata *L.*, niedergestreckter E. Var. *c.*

V. angustifolia *Brnh.*

c) *Auf Bergen unter Büschen.*

Verbascum, V. Wollkraut.

V. austriacum *Schott.*, österreichisches W.

Rubus (mehrere Arten s. unter Gebüsch Nr. 37.)

Betonica, XIV. Betonie.

B. officinalis *L.*, gemeine Betonie.

Platanthera, XX. Platanthere.

Pl. chlorantha *Cust.* (*Orchis virescens Zollik.*), grünliches Knabenkraut.

d) *Auf Bergen an Felsen.*

(*Dianthus caesius* s. May S. 194.)

e) *Auf Bergen in Wäldern.*

(*Cerastium repens* s. May S. 194.)

In Waldgebüsch.

Veronica, II. Ehrenpreis.

V. maritima *L.*, Meerstrands-Ehrenpreis.

f) *An begrasten Bergen unter Laubholz.*

(*Thesium montanum* s. May S. 194.)

g) *An sonnigen Bergen.*

Rubus, XII. Himbeere, Brombeere.

R. rudis *Weihe.*

(*Silene nutans* s. May S. 194.)

h) *An steinigen Bergen.*

Asperula, IV. Waldmeister.

A. montana *Kit.*, Berg-Waldmeister.

i) *An waldigen Bergen zwischen Gebüsch.*

(*Hyoseris foetida* s. May S. 194.)

k) *Auf den höchsten Bergspitzen.*

(*Festuca ovina*, Var. c. *Festuca vivipara* *Sm.* s. May S. 195.)

14) *In Berggegenden.*

Calamagrostis, III. Reithgras.

C. pyramidalis *Host.* (*Agrostis*), pyramidenförmiges Reithgras.

Scabiosa, IV. Scabiose.

Sc. silvatica *L.*, Wald-Scabiose.

Silene, X. Leimkraut.

S. silvestris *Schott.*, Wald-Leimkraut, wildes L.

Sedum, X. Fetthenne.

S. villosum *L.*, haariger Knörpel, Wiesen-Knörpel.

Rosa, XII. Rose.

R. tomentosa *Sm.*, filzige Rose.

R. villosa *L.*, zottige Rose.

Vicia, XVII. Wicke.

V. dumetorum *L.*, Busch-Wicke, Hecken-W.,

V. tenuifolia *Rth.*, dünnblättrige Wicke.

Cytisus, XVII. Bohnenstrauch.

C. nigrescens *L.*, schwärzlicher B. oder Geisklee.

In Berggegenden.

Trifolium, XVII. Klee.

Tr. medium L., mittlerer oder bogiger Klee.

(*Veronica officinalis*, *Sanicula europaea*, *Thalictrum flexuosum*, *Neslia paniculata*, *Geranium pyrenaicum* s. May S. 195.)

a) *In Berggegenden auf Aeckern.*

Campanula, V. Glockenblume.

C. trachelioides M. B., halskrautartige Gl.

b) *In Berggegenden an sonnigen, grasigen Anhöhen.*

(*Ophrys myodes* s. May S. 195.)

c) *An Bergbächen.*

Agropyrum, III. Queckengras.

A. caninum R. S. (*Triticum caninum L.*), Hunds-Quecke, Hunds-Weizen, Hunds-Haargras, rothe Quecke.

In Berggegenden an Bächen zwischen Waldgebüsch.

(*Thalictrum aquilegifolium* s. May S. 196.)

d) *In Berggegenden an Felsen.*

Rosa, XII. Rose.

R. sepium Thuill., Zaunrose. (Auf Kalkboden.)

e) *In Berggegenden an feuchten Orten.*

Chaerophyllum, X. Kälberkropf.

Ch. hirsutum L., behaarter Kälberkropf.

An feuchten, schattigen Orten.

(*Carex Agastachys* s. May S. 196.)

f) *In Berggegenden zwischen Gebüsch.*

Rosa, XII. Rose.

R. micrantha Sm., kleinblumige Rose.

In Berggegenden zwischen Gebüsch.

Platanthera, XX. Platanthere.

Pl. chlorantha Cust. (Orchis virescens Zollik.),
grünliches Knabenkraut.

(*Epilobium montanum*, *Rosa umbellata* s. May S. 196.)

g) *In Berggegenden auf Halk.*

(*Rubus saxatilis* s. May S. 196.)

h) *In Berggegenden auf lichten Triften, Hü-
geln und an Waldrändern.*

(*Viola canina* s. May S. 196.)

i) *In Berggegenden auf Wiesen.*

Geranium, XVI. Storchschnabel.

G. pratense L., Wiesen-Storchschnabel.

Auf feuchten Wiesen.

**Platanthera (s. oben) brachyglossa (Orchis bifolia
β. brachyglossa Wallr.)**

k) *In feuchten Berggegenden.*

(*Veronica montana* s. May S. 197.)

l) *In rauhen Berggegenden in Wäldern.*

(*Evonymus verrucosus* s. May S. 197.)

m) *Auf bergigen Stellen.*

(*Geranium macrorrhizon* s. May S. 197.)

n) *Am Fusse von Bergen.*

Verbascum, V. Wollkraut.

V. sinuatum Lam., buchtigblättriges Wollkraut.

o) *In Berggründen.*

(*Chrysosplenium oppositifolium* s. May S. 197.)

p) *An Bergströmen.*

Chaerophyllum, V. Kälberkropf.

Ch. Cicutaria Vill., schierlingartiger Kälberkropf.

*An Bergströmen.***Agrostemma, X.** Rade.*A. Coronaria L.*, gekrönte Rade, Garten-R., Sammetröschen, Vexirnelke.**Spiraea, XII.** Spiere.*Sp. Aruncus L.*, Waldspierstaude, Waldbart, Geisbart. (In Bergwäldern.)*Sp. salicifolia L.*, weidenblättrige Spierstaude. (In Waldungen.)**Cardamine, XV.** Schaumkraut.*C. asarifolia L.*, haselwurzblättriges Schaumkraut. (Am Gries.)**Cirsium, XIX.** Kratzdistel.*C. rivulare Rchb.* (*Carduus rivularis Jacq.*), Bach-Kratzdistel.*q) Auf Bergtriften.*

(Geracium praemorsum, Platanthera bifolia, Trollius europaeus s. May S. 198.)

15) In Bergwäldern.**Cornus, IV.** Hornstrauch.*C. sanguinea L.*, rother Hartriegel, Hundsbereenstrauch.**Sagina, IV.** Mastkraut.*S. ciliata Fries.*, gefranztes, gewimpertes M.**Campanula, V.** Glockenblume.*C. bononiensis L.*, bologneser Glockenblume.**Tilia, XIII.** Linde.*T. platyphyllos Scop.*, breitblättrige Linde.**Aconitum, XIII.** Eisenhut.*A. Stoerkianum Rchb.*, Störkischer Eisenhut.**Origanum, XIV.** Dosten.*O. vulgare L.*, wilde Dosten, wilder Majoran, Wohlgemuth.

*In Bergwäldern.***Astragalus, XVII. Traganth.***A. rotundifolius Prsl.*, rundblättriges Wirbelkraut.**Hieracium, XIX. Habichtskraut.***H. silvaticum Gou.*, Wald-Habichtskraut.

(*Lonicera nigra*, *Smyrnum perfoliatum*, *Staphylea pinnata*, *Lilium Martagon*, *Dianthus caesius*, *Euphorbia dulcis*, *Fragaria semperflorens*, *Paeonia officinalis*, *Ranunculus Thora*, *Pyrethrum Clusii* s. May S. 198 f.)

a) *In Bergwäldern an Bächen.*

(*Spiraea Aruncus*, *Actaea spicata*, *Cardamine silvatica* s. May S. 199 f.)

b) *In Bergwäldern an Bergströmen.*

(*Spiraea Aruncus* s. May S. 200.)

c) *In Bergwäldern an Felsen.*

(*Potentilla rupestris*, *Arabis Turrita* s. May S. 200.)

d) *In Bergwäldern an feuchten Orten.*

(*Euphorbia coralloides*, *Actaea spicata* s. May S. 200.)

e) *In Bergwäldern auf Kalk.*

(*Crataegus monogyna* s. May S. 201.)

f) *In der Nähe von Quellen.*

(*Cardamine silvatica* s. May S. 201.)

g) *In Bergwäldern auf Sandboden.***Vicia, XVII. Wicke.***V. cassubica L.*, cassubische Wicke.h) *In Bergwäldern auf Wiesen.*

(*Ranunculus Steveni* s. May S. 201.)

i) *In schattigen Bergwäldern.***Salvia, II. Salbey.***S. glutinosa L.*, klebrige Salbey.k) *In trocknen Bergwäldern.*

(*Sorbus torminalis* s. May S. 201.)

l) *An den Rändern der Bergwälder.*

Rosa, XII. Rose.

R. alpina L., Alpen-Rose. (Auf Kalkboden.)

An den Rändern trockner Bergwälder.

Dianthus, X. Nelke.

D. Seguieri Vill., Seguer's Nelke.

m) *In Bergwaldungen.*

Chimophila, X. Wintergrün.

*Ch. umbellata Nutt. (Pyrola umbellata L.), dol-
dentragendes Wintergrün.*

Rosa, (s. oben) Waiziana Rchb., Waizische Rose.
(*Convallaria latifolia* s. May S. 201.)

In Bergwaldungen an Hügeln.

Verbascum, V. Wollkraut.

*V. cuspidatum Schrad., Wollkraut mit borstig-
zugespitzten Blättern. (An schattigen Hügeln.)*

Oxytropis, XVII. Spitzfahne.

*O. montana De C. (Astragalus montanus L.),
Berg-Sp., Berg-Wirbelkraut.*

In feuchten Bergwaldungen.

Festuca, III. Schwingel.

F. montana Sternb., Berg-Schwingel.

An und in schattigen Bergwaldungen.

(*Soldanella montana* s. May S. 202.)

In schattigen Bergwaldungen an Vorhölzern.

(*Symphytum tuberosum* s. May S. 202.)

16) *Auf Bergwiesen.*

Avena, III. Hafer.

A. planiculmis Schrad., plattthalmiger Hafer.

(*Phyteuma orbiculare, Ranunculus Thora, Melampyrum
barbatum, Polygala uliginosa, Orobus albus, O. lacteus,
Leontodon hastilis, Scorzonera villosa, Orchis hybrida, O.
O. moravica, O. sambucina* s. May S. 202 f.)

a) *Auf durren Bergwiesen.*

(*Rosa hybrida*, *R. pumila* s. May S. 203.)

b) *Auf feuchten Bergwiesen.*

Cirsium, XIX. Kratzdistel.

C. anglicum *Lob.* (*Cnicus anglicus* *Gm*), Wiesen-Kratzdistel.

c) *Auf freien Bergwiesen.*

Cirsium serratuloides *Scop.* (*Cnicus serratuloides* *W.*), schartenartige Kratzdistel.

d) *Auf hohen Bergwiesen.*

Hieracium, XIX. Habichtskraut.

H. bifurcum *M. B.*, zweigabeliges Habichtskraut.

e) *Auf steinigen Bergwiesen.*

Anthyllis, XVII. Wundklee.

A. montana *L.*, Berg W., Berg-Wollblume.

f) *Auf trocknen Bergwiesen.*

Galium, IV. Labkraut.

G. rubrum *L.*, rothes Labkraut.

Silene, X Leimkraut.

S. viscosa *Pers.*, klebriges Leimkraut.

Euphorbia, XI. Wolfsmilch.

E. nicaeensis *All.*, glatte Wolfsmilch.

Orchis, XX. Knabenkraut.

O. mascula *L.*, männliches Kn., grosser Salep.

17) *Auf Brachäckern.*

Alchimilla, IV. Alchimille.

A. arvensis *Scop.*, Acker Sinau.

Echium, V. Natterwurz.

E. vulgare *L.*, gemeiner Natterkopf.

E. Wierzbickii *Habrl.*, Wierzbicks Natterwurz.

Verbascum, V. Wollkraut.

V. floccosum *W. Kit.*, flockiges Wollkraut.

Auf Brachäckern.

Rubus, XII. Himbeere, Brombeere.

R. caesius L., kriechende, blaue Brombeere,
Bocksbeere, *β. arvalis*.

Orobanche, XIV. Ervenwürger.

O. coerulea Vill., blauer E. Var. *Orobanche*
Millefolii Richb. (Auf *Achillea Millefolium*.)

Carduus, XIX. Distel.

C. nutans L., nickende Distel, grosse Bach-D.,
Bisam-Distel.

Anthemis, XIX. Chamille.

A. agrestis Wallr., Acker-Chamille.

A. arvensis L., gemeine After-Ch., unächte Ch.

(*Asperula arvensis*, *Rumex Acetosella*, *Silene dichotoma*,
Vicia bithynica s. May S. 204.)

Auf sandigen Brachäckern.

Silene, X. Leimkraut.

S. tenerrima Prsl, zartes Leimkraut.

18) *Auf Brüchen.*

Rubus, XII. Himbeere, Brombeere.

R. Schlechtendalii Weihe, Schechtendals Br.

19) *In Buchenwaldungen.*

Monotropa, X. Ohnblatt.

M. glabra Bernh., glattes O., glatte Waldwurz.

M. Hypopithys L., Fichten-O., Fichten-Spargel,
Waldwurz.

20) *Auf Dächern.*

Sedum, X. Fetthenne.

S. album L., weisser Knörpel oder Tripmadam.

(*Bromus tectorum* s. Ma S. 205.)

21) *An Dämmen.*

Carduus, XIX. Distel.

C. tenuiflorus Sm., dünnblumige Distel.

(*Ranunculus repens*, *Carex hirta* s. May S. 205.)

22) *Auf Dammerde.*

Spergula, X. Spark.

Sp. vulgaris Bnng., gemeiner Sp., Watergeil.

23) *Um Dörfer und Städte.*

Tilia, XIII. Linde.

T. europaea L., Sommer-Linde.

24) *Auf Dünen.*

Elymus, III. Haargras.

E. arenarius L., Sand-Haargras.

Juncus, VI. Simse.

J. pygmaeus Rich., Zwerg-S., dreifädige Simse.

Rosa, XII Rose.

R. pimpinellifolia L., pimpinellenblättrige R.

25) *Auf dürren Plätzen.*

Brachypodium, III. Kurzstielchen.

Br. tenellum P. B. (*Triticum tenellum a. Lam.*)

Cerithe, V. Wachsblume

C. aspera Roth., scharfblättrige Wachsblume.

Pimpinella, V. Pimpinelle.

P. Saxifraga L., Steinbibernell, Pfefferwurz.

Sedum, X. Fetthenne.

S. acre L., scharfer Knörpel od. Mauerpfeffer.

Rubus, XII. Himbeere, Brombeere.

R. caesius L., kriechende, blaue Brombeere,

Bocksbeere *β. arvalis*.

(*Gaudinia fragilis* s. May S. 206.)

Auf dörren, freien Plätzen.

(*Potentilla rupestris* s. May S. 206.)

An dörren und grasigen Orten.

(*Catapodium loliaceum* s. May S. 206.)

Auf dürrem, sandigen Boden.

(*Aira flexuosa* s. May S. 206.)

Auf dürrem, steinigem Boden.

Sesleria, III. Seslerie.

S. elongata Host. (*Phleum autumnale* Scop.),
verlängerte Seslerie.

(*Paliurus aculeatus* s. May S. 206.)

An dörren, waldigen Orten.

Dianthus, X. Nelke.

D. plumarius L., Feder-Nelke, Pfingst-Nelke.

26) In Eichenwäldern.

(*Orchis moravica* s. May S. 207.)

27) Auf Feldern.

Agropyrum, III. Queckengras.

A. repens P. B. (*Triticum repens* L.), krie-
chender Weizen, Quecke, Pädergras.

Hypochaeris, XIX. Ferkelkraut.

H. radicata L., grosses, langwurzeliges F.

(*V. agrestis*, *V. opaca*, *V. serpyllifolia*, *Brassica chei-*
ranthiflora s. May S. 207.)

Auf nassen Feldern.

(*Veronica acinifolia* s. May S. 207.)

28) An Feldrainen und Feldrändern.

Salvia, II. Salbey.

S. verticillata L., quirlförmige Salbey.

Holcus, III. (XXIII.) Pferdegras.

H. mollis L., weiches Pf., kriechendes Darr-
gras oder Honiggras.

An Feldrainen und Feldrändern.

Briza, III. Zittergras.

Br. media *L.*, Wiesen-Z., Flitterchen, Hasenbrod.

Festuca, III. Schwingel.

F. inermis *De C.* (*Bromus inermis L.*), gran-
nenloser Schwingel, wehrlose Trespe.

Dactylis, III. Knauelgras.

D. glomerata *L.*, gemeines K., Hundsgras.

Asterocephalus, IV. Kronen-Scabiose.

A. columbarius (*Scabiosa columbaria L.*), Tauben-Sc.

Galium, IV. Labkraut.

G. verum *L.*, ächtes Labkraut, Bettstroh.

Verbascum, V. Wollkraut.

V. australe *Schrad.*, südliches Wollkraut.

V. nigrum *L.*, schwarzes Wollkraut, schwarze
Königskerze.

V. phlomoides *L.*, windblumenartige Königskerze.

Campanula, V. Glockenblume.

C. patula *L.*, ausgebreitete Glockenblume.

C. Rapunculus *L.*, Rapunzel-Glockenblume.

Eryngium, V. Mannstreu.

E. planum *L.*, flachblättrige Mannstreu.

Levisticum, V. Liebstöckel.

L. vulgare *J. Bauh.* (*Ligusticum Levisticum L.*),
gemeiner, gewöhnlicher Liebstock.

Linum, V. Lein.

L. catharticum *L.*, Purgir-Lein.

Dianthus, X. Nelke.

D. Armeria *L.*, Feld-Nelke, Büschel-Nelke.

Rosa, XII. Rose.

R. pimpinellifolia *L.*, pimpinellenblättrige Rose.

R. rubiginosa *L.*, rostfarbige Rose, Wein-R.

Potentilla, XII. Fingerkraut.

P. Wiemanniana *Günth. et Schumm.*, Wie-
mannisches Fingerkraut.

*An Feldrainen und Feldrändern.***Vicia, XVII.** Wicke.*V. angustifolia* *Riv.* (*Vicia sativa* β . *nigra* *L.*),
schmalblättrige Wicke.*V. tenuifolia* *Rth.*, feinblättrige Wicke.**Ervum, XVII.** Erve, Linse.*E. tetraspermum* *L.*, viersaamige Linse.**Barkhausia, XIX.** Barkhausie.*B. rhoeadifolia* *M. B.* (*Crepis rhoeadifolia* *M. B.*),
klatschrosenblättriger Pippau.**Hypochaeris, XIX.** Ferkelkraut.*H. radicata* *L.*, grosses, langwurzelliges F.**Achillea, XIX.** Garbe.*A. Millefolium* *L.*, gemeine Schaafgarbe, Feld-
garbe, Schaafrippe.**Centaurea, XIX.** Flockenblume.*C. Jacea* *L.*, gemeine Flockenblume.(Veronica Chamaedrys, *V. prostrata*, Agrostis stolonifera,
Holcus lanatus, Vulpia bromoides, Anchusa arvalis, *A. of-*
ficinalis, Campanula Rapunculus, Chaerophyllum silvestre,
Polygonum aviculare, Stellaria graminea, Euphorbia dulcis,
E. Esula, *E. Gerardiana*, Turritis glabra, Arabis sagittata,
Geranium rotundifolium, Astragalus Cicer, Crepis agrestis,
Erigeron acris, Poterium Sanguisorba s. May S. 207 ff.)*An grasigen Feldrainen.***Carduus, XIX** Distel.*C. nutans* *L.*, nickende D. β . *Carduus invo-*
lucratus *Beck.**An sonnigen Feldrainen.***Agrimonia, XI.** Odermennig.*A. Eupatorium* *L.*, gemeiner O., Leberklette,
Steinwurz.*Auf trocknen Feldrainen.***Dianthus, X.** Nelke.*D. deltoides* *L.*, deltaförmige, deltafleckige N.,
Wiesen-Nelke.

29) *An Feldwegen.*

(Rosa collina, Camelina microcarpa s. May S. 210.)

30) *An Felsen.***Centranthus**, III. Spornblume.*C. ruber* *De C.* (*Valeriana rubra* *L.*), rother Baldrian.**Poa**, III. Rispengras.*P. Langeana* *Rchb.*, Lange'sches Rispengras.*P. nemoralis* *L.*, Hain-R., Wald-R., Var. *f. Poa coarctata* *Hall. fil.***Plantago**, IV. Wegerich.*Pl. sericea* *W. Kit.*, seidenhaariger Wegerich.**Verbascum**, V. Wollkraut.*V. Lychnitis* *L.*, lichtblumenartige Königskerze.*V. montanum* *Schrad.*, Berg-Königskerze.*V. thapsoides* *L.*, schmalblättrige Königskerze.**Campanula**, V. Glockenblume.*C. cespitosa* *Scop.*, Rasen-Glockenblume (In Alpengegenden.)**Athamanta**, V. Augenwurz.*A. Matthioli* *Wulff.*, Matthioli's A. od. Hirschwurz.**Anthericum**, VI. Zaunlilie.*A. Liliago* *L.*, astlose Z. oder Graslilie.**Ruta**, X. Raute.*R. graveolens* *L.*, starkkriechende R., Weinraute.**Dianthus**, X. Nelke.*D. prolifer* *L.*, sprossende Nelke, Kopf-Nelke.**Sedum**, X. Fetthenne.*S. album* *L.*, weisser Knörpel od. Tripmadam.*S. boloniense* *Lois.*, boulogner F. oder Knörpel.*S. hispanicum* *L.*, spanische Fetthenne, spanischer Knörpel.*S. purpureum* *Andrz.* (*Sedum Telephium* β . *purpureum* *L.*), purpurrother Knörpel.

An Felsen.

Sedum sexangulare L., sechseckiger Knörpel.
S. Telephium L., breitblättriger Kn., Schmeer-
 wurz, Bohnen-Fetthenne.

Myrtus, XII. Myrte.

M. communis L., gemeine M. (Im südl. Gebiete.)

Potentilla, XII. Fingerkraut.

P. argentea L., silberweisses Fingerkraut.

Hyssopus, XIV. Ysop.

H. officinalis L., gemeiner Ysop.

Acinos, XVI. Basilienthym.

A. thymoides Mnch. (*Thymus Acinos* L.), blauer
 Berg-Thymian, Steinquendel.

Origanum, XIV. Dosten.

O. vulgare L., wilde Dosten, wilder Majoran,
 Wohlgemuth.

Anarrhinum, XIV. Lochschlund.

A. bellidifolium Desf. (*Antirrhinum bellidifoli-
 um* L.), masliebenblättriges Löwenmaul.

Geranium, XVI. Storchschnabel.

G. columbinum L., Tauben-Storchschnabel.

Genista, XVII. Ginster.

G. tinctoria L., Färbe-Ginster.

Coronilla, XVII. Kronwicke.

C. varia L., bunte Kr., Schaaflinse.

Hypericum, XVIII. Harthen.

H. hirsutum L., haariges H. oder Johanniskraut.

H. montanum L., Berg-Johanniskraut.

Crepis, XIX. Pippau.

Cr. chondrilloides Jacq., knorpelsalatartiger P.

Barkhausia, XIX. Barkhausie.

B. foetida De C. (*Crepis foetida* L.), stinken-
 der Pippau.

Centaurea, XIX. Flockenblume.

C. Jacea L., gemeine Flockenblume.

*An Felsen.***Ephedra, XXII. Meerträubchen.**

E. distachya L., europäischer Meerträubel.

(*Salvia officinalis*, *Pollinia Gryllus*, *Stipa pennata*, *Airacaryophyllea*, *Briza maxima*, *Festuca ovina*, *Asperula galioides*, *Campanula elatinoidea*, *C. rotundifolia*, *Cynanchum Vincetoxicum*, *Daphne alpina*, *Dianthus caesius*, *Silene italica*, *Cotoneaster tomentosa*, *Capparis spinosa*, *Thalictrum flexuosum*, *Th. foetidum*, *Orobanche Rapum*, *Linaria Cymbalaria*, *Biscutella laevigata*, *Sisymbrium multisiliquosum*, *Arabis alpina*, *Geranium lucidum*, *Corydalis lutea*, *Genista germanica*, *Ononis rotundifolia*, *Cytisus biflorus*, *C. falcatius*, *Hippocrepis comosa*, *Hieracium cinereum*, *H. collinum*, *H. fallax*, *H. murorum*, *H. praealtum*, *Xeranthem uminaper-tum*, *Cephalanthera ensifolia*, *C. pallens*, *Poterium glaucescens* s. May S. 210 ff.)

a) *An Felsen in Berggegenden.*

Rosa, XII. Rose.

R. sepium Thuill., Zaun-R. (Auf Kalkboden.)

b) *An Felsen in Bergwäldern.*

(*Potentilla rupestris* s. May S. 214.)

c) *Auf Felsen an Flussufern.*

Thalictrum, XIII. Wiesenraute.

Th. medium Jacq., mittlere Wiesenraute.

d) *An Felsen in höheren Gebirgsgegenden.*

Campanula, V. Glockenblume.

C. pusilla Haenk., kleine Glockenblume.

e) *An Felsen in Gebüsch.*

Trifolium, XVII. Klee.

Tr. agrarium L., gelber Acker-K., Gold-, Hopfen-K.

(*Lithospermum officinale* s. May S. 214.)

f) *An Felsen der Kalkalpen.*

Globularia, IV. Kugelblume.

G. nudicaulis L., nacktstielige Kugelblume.

g) *An Felsen in Kalkgebirgen.*

Digitalis, XIV. Fingerhut.

D. purpurea L., purpurrother Fingerhut.

Alyssum, XV. Steinkraut.

A. montanum L., Berg-Steinkraut.

Arabis, XV. Gänsekraut.

A. alpina L., Alpen-Gänsekraut.

h) *An Felsen in Kalk- und Urgebirge.*

Digitalis (s. oben) *grandiflora* Lam., grossblumiger Fingerhut.

i) *An Felsen auf Sandboden.*

Silene, X. Leimkraut.

S. Armeria L., Garten-Silene, Morgenröschen.

k) *An Felsen der Thäler und Vorgebirge.*

Digitalis (s. oben) *ochroleuca* Jacq., blassgelber Fingerhut.

l) *An Felsen der Voralpen.*

Lasiagrostis, III. Rauhgras.

L. Calamagrostis Lk. (*Agrostis Calamagrostis* L.), ästiger Windhalm, silberfarbenes Rohr.

Sabulina, X. Sändling.

S. Gerardi (*Arenaria Gerardi* W.), Gerards-Sandkraut.

Arabis alpina (s. oben unter g).

Genista, XVII. Ginster.

G. radiata Scop., gestrahlter Ginster, gestrahlte Pfriemen.

m) *An Felsen in Waldgebüsch.*

(*Potentilla recta* s. May S. 214.)

n) *An bewachsenen Felsen zwischen Gebüsch.*

Asperula, IV. Waldmeister.

A. tinctoria L., färbender Waldmeister.

An bewachsenen, sonnigen Felsen.

(Globularia vulgaris s. May S. 215.)

o) *An feuchten Felsen.*

Sedum, X. Fetthenne.

S. dasyphyllum L., bereifte F., bereifter Knörpel.

An feuchten, etwas schattigen Felsen in Voralpen.

Moehringia, VIII. Möhringie.

M. muscosa L., gemeine Moosmiere.

p) *An grasigen, sonnigen Felsen.*

Agrostemma, X. Rade.

A. Coronaria L., gekrönte Rade, Garten-Rade, Vexirnelke.

q) *An nackten Felsen in Alpen und Voralpen.*

Sedum (s. oben) annuum L., jährige Fetthenne, jähriger Knörpel.

S. atratum L., schwärzlicher Knörpel.

r) *An schattigen Felsen.*

Sedum Cepaea L., portulakblättriger Knörpel.

Peltaria, XV. Scheibenkraut.

P. alliacea L., knoblauchduftendes Scheibenkr.

s) *An sonnigen Felsen.*

Iris, III. Schwertel.

I. sambucina L., fliederduftende Schwertlilie.

Calamintha, XIV. Calaminthe.

C. thymifolia Rchb. (*Satureja thymifolia Scop.*), thymianblättrige C., Felsenpfefferkraut.

Genista, XVII. Ginster.

G. dalmatica Bartl., dalmatischer Ginster.

Hypericum, XVIII. Hartheu.

H. Coris L., vierblättriges H. oder Johanniskraut.

(*Festuca glauca*, *Lychnis Viscaria*, *Potentilla obscura*, *P. pedata* *P. pilosa*, *Hesperis inodora* s. May S. 215 f.)

t) *An waldigen Felsen.*

(*Dracocephalum austriacum* s. May S. 216.)

u) *An Felsabhängen.*

(*Camelina microcarpa* s. May S. 216.)

v) *An Felsenrändern.*

(*Myosotis intermedia* s. May S. 216.)

w) *In Felsritzen.*

Foeniculum, V. Fenchel.

F. dulce, *C. Bauh.*, süsser Fenchel.

Hieracium, XIX. Habichtskraut

H. amplexicaule *L.*, stängelumfassendes H.

H. rupestre *All.*, Felsen-Habichtskraut.

In Felsspalten.

Saxifraga, X. Steinbrech.

S. hypnoides *L.*, astmoosartiger Steinbrech.

Acanthus, XIV. Bärenklau.

A. mollis *L.*, ächte Bärenklaue.

(*Noccaea alpina* s. May S. 216.)

x) *An felsigen Orten.*

Pteroselinum, V. Flügelsilge.

Pt. glaucum (*Pastinaca glauca Scop.*), blau-grüne Flügelsilge.

(*Frangula Wulfenii*, *Arctostaphylos Uva ursi* s. May S. 217.)

An felsigen, sonnigen Orten.

Brachypodium, III. Kurzstielchen.

Br. pinnatum *P. B.* (*Bromus pinnatus L.*), gefiedertes Kurzstielchen, gefiederte Trespe.

Thymus, XIV. Thymian, Quendel.

Th. humifusus *Brnh.*, gestreckter Thymian od. Quendel. (Auf Kalkboden.)

y) *An Felsvorsprüngen unter Gebüsch.*

Echinospermum, V. Igelrüßchen.

E. deflexum *Lehm.* (*Myosotis deflexa* *Wahlb.*),
hängefrüchtiger Igelsaame, hängefrüchtiges
Vergissmeinnicht.

31) *An feuchten Orten.*

Veronica, II. Ehrenpreis.

V. Anagallis *L.*, Wasser-Ehrenpreis.

Poa, III. Rispengras.

P. trivialis *L.*, gemeines R., Knotengras.

Cynosurus, III. Kammgras.

C. cristatus *L.*, gemeines Kammgras.

Galium, IV. Labkraut.

G. palustre *L.*, Sumpf-Labkraut.

Juncus, VI. Simse.

J. bufonius *L.*, Kröten-S., gemeines Krötengras.

Stachys, XIV. Ziest.

St. ambigua *Sm.*, Bastard-Ziest.

St. palustris *L.*, Sumpf-Ziest.

(*Sagina maritima*, *S. procumbens*, *Chrysosplenium oppositifolium*, *Euphorbia coralloides*, *Potentilla Anserina*, *Geum intermedium*, *G. rivale*, *Ranunculus hirsutus*, *R. repens*, *R. sceleratus*, *Vicia serratifolia*, *Vigna divisa*, *V. nemorum*, *V. remota* *S. May* *S.* 217 f.)

a) *An feuchten Orten in Bergwäldern.*

Euphorbia, XI. Wolfsmilch.

E. coralloides *L.*, rothstielige Wolfsmilch.

b) *An feuchten Orten in Gebirgsthälern.*

(*Ephemerum nemorum*, *Myrrhis odorata* *s. May* *S.* 218.)

c) *An feuchten Orten in Gebirgswäldern und Voralpen.*

Chaerophyllum, V. Kälberkropf.

C. aureum *L.*, goldfarbener Kälberkropf.

d) *An feuchten Orten zwischen Gebüsch in Laubwäldern.*

(*Stellaria nemorum* s. May S. 219.)

e) *An feuchten Orten in Laubwäldern.*

(*Carex Drymeja* s. May S. 219.)

f) *An feuchten Orten der Voralpen.*

Valeriana, III. Baldrian.

V. sambucifolia Mik., hollunderblättriger B.

In Voralpenthälern.

(*Cardamine trifolia* s. May S. 219.)

g) *An feuchten Orten in schattigen Wäldern.*

Stachys, XIV. Ziest.

St. silvata L., Wald-Ziest.

h) *Auf feuchten, bebauten Plätzen.*

(*Poa annua* s. May S. 219.)

i) *An feuchten, sandigen Plätzen.*

Tillaea, IV. Tilläe.

T. muscosa L., moosartige Tilläe.

(*Carex hirta*, *C. secalina*, *Typha minima* s. May S. 219.)

k) *An feuchten, schattigen Orten.*

Festuca, III. Schwingel.

F. arundinacea Schreb., rohrartiger, hoher Schw.

Rubus, XII. Himbeere, Brombeere.

R. caesius L., kriechende, blaue Br., Bocksbeere α . *umbrosus*.

Scrofularia, XIV. Braunwurz.

Scr. nodosa L., gemeine Braunwurz.

Lepidium, XV. Kresse.

L. latifolium L., breitblättrige Kr. od. Pfefferkraut.

Geranium, XVI. Storchschnabel.

G. palustre L., Sumpf-Storchschnabel.

(*Viola biflora*, *Actaea spicata*, *Ranunculus lanuginosus*, *Carex Agastachys*, *C. leptostachys* s. May S. 219 f.)

l) *Auf feuchten, steinigen Plätzen.*

Festuca, III. Schwingel.

F. laxa Host., schlaffer Schw. (Im Hochgebirg.)
(*Alchimilla fissa*, *Barbarea stricta*, *Sisymbrium strictissimum* s. May S. 220.)

m) *An feuchten, wüsten Orten.*

Ranunculus, XIII. Ranunkel, Hahnenfuss.

R. muricatus L., stachelsaamiger R. oder H.

32) *In Fichtenwaldungen.*

Monotropa, X. Ohnblatt.

M. Hypopithys L., Fichten-O., Fichten-Spargel,
Waldwurz. (Unter *Pinus silvestris*.)

33) *In Flugsand.*

Tribulus, X. Burzeldorn.

Tr. terrestris L., gemeiner Burzeldorn.

Achillea, XIX. Garbe.

A. pectinata W., kammförmige Schaafgarbe.

(*Onosma arenarium* s. May S. 221.)

34) *An und in Flüssen.*

(Vergleiche Bergströme, Gebirgsflüsse und Gries.)

a) *An Flüssen.*

Calamagrostis, III. Reithgras.

C. laxa Host. (*Arundo Pseudo-Phragmitis Hall. fil.*), schlaffes Reithgras. (In Sandgegenden.)

Festuca, III. Schwingel.

F. arundinacea Schreb., rohrartiger, hoher Schw.

Agropyrum, III. Queckengras.

A. glaucum R. S. (*Triticum glaucum Desf.*),
blaugrünes Queckengras, blaugrüner Weizen.

Elymus, III. Haargras.

E. arenarius L., Sand-Haargras, Sandhafer,
Helm, Rothwurz.

An Flüssen.

Verbascum, V. Wollkraut.

V. ambiguum *Lej.*, Bastard-W. oder Königskerze.

V. phlomoides *L.*, windblumenartige Königskerze.

V. ramigerum *Lk.*, ästiges W. (In Sandboden an Hügeln.)

Myricaria, V. Myricarie.

M. germanica *Dso.* (Tamarix germanica *L.*),
teutsche Tamariske.

Allium, VI. Lauch.

A. Schoenoprasum *L.*, Schnittlauch.

Oenothera, VIII. Nachtkerze.

O. biennis *L.*, gem. N., gelbe Rapunzel, Rhapontica.

Dianthus, X. Nelke.

D. caesius *Sm.*, graublättrige Nelke, blau-
graue Nelke, Feder-Nelke. (An Hochge-
birgsflüssen.)

Malachium, X. Weichmeier.

M. aquaticum *Fries.* (Cerastium aquaticum *L.*),
Wasser-W., Wasser-Hornkraut. (Zwischen
Gebüsch.)

Thalictrum, XIII. Wiesenraute.

Th. medium *Jacq.*, mittlere Wiesenraute.

Nasturtium, XV. Brunnen-Kresse.

N. astylon *Rchb.*, griffellose Brunnenkresse.

Typha, XXI. Rohrkolbe.

T. minima *Funk.*, kleine R. (In Lehm Boden.)

(Gratiola officinalis, Valerianella tridentata, Vitis vini-
fera, Euphorbia dulcis, E. Esula, E. Gerardiana, E. stricta,
Nasturtium anceps, N. silvestre, Cochlearia Armoracia, Isa-
tis tinctoria, Erysimum Cheiranthus, Barbarea stricta, Bras-
sica Cheiranthus, Sisymbrium strictissimum, Carex punctata,
Vigna acuta, V. intermedia, Salix incana s. May S. 221 f.)

b) *In Flüssen.*

Callitriche, I. Wasserstern.

C. autumnalis *L.*, A. fluviatilis, Fluss-W.

In Flüssen.

Potamogeton, IV. Laichkraut.

P. compressus L., zusammengedrücktes Laichkr.
oder Saamkraut.

P. crispus L., krauses L. oder Saamkraut.

P. gramineus L., grasartiges L. oder Saamkraut.

P. perfoliatus L., durchwachsenes L. od. Saamkr.

Ranunculus, XIII. Ranunkel, Hahnenfuss.

R. fluitans Lam. (*Ranunculus aquatilis* δ . *Linn.*),
Fluss-Ranunkel, Fluss-Hahnenfuss.

c) *Auf Flussinseln.*

Calamagrostis, III. Reithgras.

C. acutiflora De C. (*Arundo acutiflora Schrad.*),
spitzblüthiges Rohr.

Glaucium, XIII Hornmohn.

Gl. luteum Scop. (*Chelidonium Glaucium L.*),
gelber Hornmohn.

(*Bulliarda Vaillantii*, *Chacrophyllum aromaticum* siehe
May S. 223.)

35) *In Gartenland.*

Agropyrum, III. Queckengras.

A. repens P. B. (*Triticum repens L.*), kriechen-
der Weizen, Quecke, Pädergras.

Fragaria, XII. Erdbeere.

Fr. virginiana Ehrh., Scharlach-Erdbeere, kable
Garten-Erdbeere.

(*Oxalis stricta* s. May S. 223.)

An Gärten.

Nepeta, XIV. Katzenmünze.

N. citriodora Balb., citronenduftige K.

36) *Auf und in Gebirgen.*

Veronica, II. Ehrenpreis.

V. spuria L., unächter E. Var. γ . *V. nitida Ehrh.*

Auf und in Gebirgen.

Poa, III. Rispengras.

P. nemoralis L., Hain-R. *Var. e. Poa glaucantha Gaud.*

Brachypodium, III. Kurzstielchen.

Br. tenellum P. B. (*Triticum tenellum a. Lam.*)

Polemonium, V. Sperrkraut.

P. coeruleum L., blaues Sperrkraut.

Silene, X. Leimkraut.

S. inflata Sm. aufgeblasenes *L.* *Var.* Mittelform zwischen *Var. a. glabra* und *B. ciliata.*

Sieversia, XII. Sieversie.

S. montana Spr. (*Geum montanum L.*), Berg-S., Berg-Benediktenkraut.

Aconitum, XIII. Eisenhut.

A. Myoconum Rchb.

Thymus, XIV. Thymian, Quendel.

Th. humifusus Brnh., gestreckter *Th. γ. origanifolius.*

Alectorolophus, XIV. Hahnenkamm.

A. major Rchb. (*Rhinanthus Crista galli L.*), grosser Hahnenkamm. *Var. β. alpestris.*

Bartsia, XIV. Bartsie.

B. alpina L., Alpen-Bartsie.

Trifolium, XVII. Klee.

Tr. alpestre L., Wald-Klee, rother Berg-Klee, rother Spitzklee.

Carex, XXI. Riedgras.

C. tetanica Schk., scheidiges Riedgras.

Salix, XXII. Weide.

S. iserana Prsl., Iser-Weide.

S. limosa Wahlb. (*Salix arenaria L.*), Gebirgs-Weide.

Juniperus, XXII. Wachholder.

J. nana W., Zwerg-Wachholder.

Auf und in Gebirgen.

(*Festuca glauca* Var *b. laevigata*, *Evonymus latifolius*, *Convallaria verticillata*, *Sabulina cespitosa*, *Cotoneaster tomentosa*, *Rosa pyrenaica*, *Rosa stylosa*, *Geranium divaricatum*, *Buphthalmum salicifolium*, *Carex leucoglochin*, *Castanea vesca*, *Betula carpathica*, *Abies picea*, *Salix silesiaca* s. May S. 223 f.)

a) *In Gebirgen an Abhängen, auf Anhöhen, Triften und trocknen Wiesen.*
(*Arabis hirsuta* s. May S. 224.)

b) *In Gebirgen an felsigen Orten.*
(*Arctostaphylos Uva ursi* s. May S. 224.)

In Gebirgen an feuchten, etwas schattigen Felsen.

Moehringia, VIII. Möhringie.

M. muscosa L., gemeine Moosmiere.

c) *In Gebirgen in Gebüsch.*
Digitalis, XIV. Fingerhut.

D. lutea L., gelber Fingerhut.

d) *In Gebirgen auf Grasplätzen.*
(*Habenaria albida* s. May S. 225.)

e) *In Gebirgen auf Hügeln und an Rainen.*
(*Bunium Bulbocastanum* s. May S. 225.)

f) *In Gebirgen auf sandigem, steinigem Boden.*
Silene, X. Leimkraut.

S. inflata Sm., aufgeblasenes L., Var. *A. glabra*
 α . *Silene vesicaria* Schrad. und β . *glauca*.

g) *In Gebirgen an trocknen, steinigen Orten.*
(*Phaca australis* s. May S. 225.)

h) *In Gebirgen in Wäldern.*
(*Ranunculus aureus* s. May. S. 225.)

Zwischen Waldgebüsch.

Lathyrus, XVII. Platterbse.

L. ensifolius Badarro, schwertblätterige Pl.

i) *In Gebirgen auf Wiesen.*

Vignea, XXI. Segge.

V. saxatilis (Carex saxatilis L.), Klippen-Segge,
Klippen-Riedgras.

Auf feuchten Wiesen.

Gentiana, V. Enzian.

G. utriculosa L., bauchiger Enzian.

k) *Auf hohen Gebirgen.*

Saxifraga, X. Steinbrech.

S. oppositifolia L., paarblättriger, blauer St.

Geum, XII. Benediktenkraut.

G. inclinatum Schleich.

Delphinium, XIII. Rittersporn.

D. intermedium Ait., mittlerer Rittersporn.

Pulsatilla, XIII. Küchenschelle.

P. alba L (Anemone alpina L.), weisse K.,
Alpen-Windblume.

(Carex tetanica s. May S. 225.)

Auf höhern Gebirgen.

Pulsatilla (s. oben) vernalis Mill. (Anemone ver-
nalis L.), Frühlings-K., frühe Waldtulpe.

In höhern Gebirgen an grasigen Abhängen.

Gentiana, V. Enzian.

G. obtusifolia W., stumpfblättriger Enzian.

l) *In niedern Gebirgen.*

(Trientalis europaea s. May S. 226.)

In niedern Gebirgen an steinigen Orten.

Oxytropis, XVII. Spitzfahne.

O. pilosa De C. (Astragalus pilosus L.), haarige
Spitzfahne, haariges Wirbelkraut.

m) *Auf waldigen Gebirgen.*

Elymus, III. Haargras.

E. europaeus L., europäisches H., Wald-H.

n) *An Gebirgs-Bächen und Flüssen.*

Festuca, III. Schwingel.

F. latifolia Host., breitblättriger Schwingel.

(*Thesium rostratum*, *Bunias Erucago* s. May S. 226.)

o) *In Gebirgsgegenden.*

Levisticum, V. Liebstöckel.

L. vulgare J. Bauh. (*Ligusticum Levisticum* L.),
gemeiner, gewöhnlicher Liebstock. (Angepflanzt.)

Erica, VIII. Heide.

E. cineraria L., graues Heidekraut.

Vicia, XVII. Wicke.

V. pisiformis L., erbsenartige Wicke.

V. silvatica L., Wald-Wicke.

Platanthera, XX. Platanthere.

Pl. chlorantha Cust. (*Orchis virescens* Zollik.),
grünliches Knabenkraut.

(*Saxifraga petraea*, *Rosa arvina*, *Aconitum pyramidale*,
Cardamine amara β . Card. Opizii s. May S. 226.)

*In Gebirgsgegenden in Ebenen, auf feuchten
Wiesen.*

Thalictrum, XIII. Wiesenraute.

Th. angustifolium L., schmalblättrige W.

In Gebirgsgegenden an feuchten Stellen.

Trifolium, XVII. Klee.

Tr. spadiceum L., kastanienbrauner Klee.

(*Ranunculus aconitifolius* s. May S. 227.)

*In Gebirgsgegenden auf feuchten, bemoosten
Plätzen.*

Spergella, X. Spergelle.

Sp. saginoides (*Spergula saginoides* L.), mast-
krautartiger Spark.

In Gebirgsgegenden an Flüssen.

Aquilegia, XIII. Akeley.

A. Sternbergii Rchb., Sternbergs-Akeley.

In Gebirgsgegenden auf sonnigen Grashügeln.
(*Scorzonera angustifolia* s. May S. 227.)

In Gebirgsgegenden am Gries der Bergströme.
Myricaria, V. Myricarie.

M. germanica Dso. (*Tamarix germanica* L.),
teutsche Tamariske.

Cardamine, XV. Schaumkraut.

C. asarifolia L., haselwurzblättriges Schaumkr.

In Gebirgsgegenden an quelligen Orten.

Cardamine resedifolia L., resedenblättriges Sch.

An sandigen, steinigen Orten.

(*Matthiola varia* s. May S. 227.)

Auf Triften.

Hypochaeris, XIX. Ferkelkraut.

H. maculata L., geflecktes Ferkelkraut.

Arnica, XIX. Wolverley, Wohlverleih.

A. montana L., Berg-W., ächte, wahre W.

In Wäldern.

(*Ranunculus polyanthemos* s. May S. 227.)

Auf Waldwiesen.

Trifolium, XVII. Klee.

Tr. elegans Savi., zierlicher Klee.

(*Cineraria campestris* s. May S. 227.)

Auf Wiesen.

(*Geranium phaeum* s. May S. 227.)

Auf feuchten Wiesen.

Veratrum, VI. (XXIII.) Germer.

V. album L., weisser G., weisse Nieswurz

V. Lobelianum Brnh., Lobelischer Germer.

In höhern Gebirgsgegenden an Felsen und Mauern.

Campanula, V. Glockenblume.

C. pusilla Haenk., kleine Glockenblume.

p) *In Gebirgsthälern.*

Spiraea, XII. Spiere.

Sp. carpinifolia Willd., hainbuchenblättrige Spierstaude.

Rubus, XII. Himbeere, Brombeere.

R. glandulosus Bellard., drüsenhaarige Br.

R. Güntheri Wh., Günthers Brombeere.

R. Koehleri Wh., Köhlers Brombeere.

Scrofularia, XIV. Braunwurz.

Scr. chrysanthemifolia M. B., wucherblumenblättrige Braunwurz.

In Gebirgsthälern an schattigen Anhöhen zwischen Gebüsch.

Lunaria, XV. Mondveil.

L. rediviva L., spätfrüchtige, dauernde Mondviole, Winter-Mondviole.

In Gebirgsthälern an Bächen.

(*Ephemerum nemorum, Peltaria alliacea* s. May S. 228.)

An feuchten Orten.

Ranunculus, XIII. Ranunkel, Hahnenfuss.

R. aconitifolius L., eisenhutblättriger Ranunkel, weisser Berg-Ranunkel.

(*Ephemerum nemorum, Myrrhis odorata* s. May S. 228.)

In Gebirgsthälern an feuchten, schattigen Orten in feiner Lauberde.

(*Viola biflora* s. May S. 228.)

Zwischen Gebüsch.

Lunaria rediviva (s. oben).

(*Geranium phaeum* s. May S. 228.)

An Quellen.

(*Ephemerum nemorum* s. May S. 228. — *Ranunculus aconitifolius* s. May S. 227.)

In Gebirgsthälern an steinigen Orten.

(*Geranium nodosum* s. May S. 228.)

An den Seiten wasserreicher Gebirgsthäler.

(*Pinus obliqua* s. May S. 228.)

q) *In Gebirgswäldern.*

Lilium, VI. Lilie.

L. bulbiferum L., Feuerlilie

Aquilegia, XII. Akeley.

A. Sternbergii Rchb., Sternbergs-Akeley.

(*Milium paradoxum*, *Campanula lingulata*, *Lilium chalconicum*, *Doronicum Matthioli*, *D. Pardalianches*, *Himantoglossum hircinum* s. May S. 228 f.)

In Gebirgswäldern auf grasigen Anhöhen und Wiesen.

Cineraria, XIX. Aschenpflanze.

C. spathulaefolia Gm., spathelblättriges Aschenkrt.

An feuchten Orten.

Chaerophyllum, V. Kälberkropf.

Ch. aureum L., goldfarbener Kälberkropf.

An bemoosten Heideplätzen.

Pyrola, X. Birnkraut.

P. uniflora L., einblumiges Birnkraut.

Auf bemoosten Stellen.

Galium, IV. Labkraut.

G. saxatile L., Stein-Labkraut.

An schattigen Plätzen.

(*Asperula odorata* s. May S. 229.)

In schattigen Gebirgswäldern.

Festuca, III. Schwingel.

F. silvatica Vill., Wald-Schwingel.

*In Gebirgswaldungen.***Empetrum, XXII.** Rauschbeere.*E. nigrum L.*, gemeine, schwarze Rauschbeere oder Hexenbeere.

(Ribes alpinum, Pinus rubra s. May S. 229 f.)

*r) Auf Gebirgswiesen.***Phyteuma, V.** Rapunzel.*Ph. fistulosum Rchb.*, röhrige Rapunzel.**Crepis, XIX.** Pippau.*Cr. alpestris Rchb.*, Alpen-Pippau.**Nigritella, XX.** Nigritelle.*N. globosa Rchb.* (*Orchis globosa L.*), kugelförmiges Knabenkraut.**37) In Gebüsch.****Veronica, II.** Ehrenpreis.*V. officinalis L.*, gemeiner, gebräuchlicher E.**Holcus, III. (XXIII.)** Pferdegras.*H. mollis L.*, weiches Pf., kriechendes Darrgras oder Honiggras.**Avena, III.** Hafer.*A. pubescens L.*, weichhaariger Hafer.**Rubia, IV.** Krapp, Röthe.*R. peregrina L.*, fremde Röthe.**Galium, IV.** Labkraut.*G. Aparine L.*, kletterndes Labkraut, Klebkraut, Zaunreis.**Verbascum, V.** Wollkraut.*V. Schottianum Schrad.*, Schottische Königskerze.**Oenanthe, V.** Rebendolde.*O. Lachenalii Gmel.*, Lachenals-Rebendolde.**Asparagus, VI.** Spargel.*A. officinalis L.*, gemeiner, gewöhnlicher Sp.

*In Gebüsch.***Rosa, XII. Rose.***R. affinis* *Rau.*, verwandte Rose.*R. canina* *L.*, Hunds-Rose, Hecken-Rose, wilde Feldrose.*R. caryophyllacea* *Bess.*, Gewürznelken-Rose.*R. dumetorum* *Thuill.*, Hecken-Rose.*R. inodora* *Fr. et Hook.*, geruchlose Rose.*R. psilophylla* *Rau.*, geruchlose Schirmrose.*R. rubiginosa* *L.*, rostfarbige Rose, Weinrose.*R. sepium* *Thuill.*, Zaunrose.**Rubus, XII. Himbeere, Brombeere.***R. corylifolius* *Sm.*, haselnussblättrige Bromb.*R. villicaulis* *Koehl.*, zottigstängelige Brombeere.

Ausser diesen noch folgende, neuerlich von *Weihe* *) bestimmte Arten.

Rubus *apiculatus*, *argenteus*, *carpinifolius*, *discolor*, *foliosus*, *fusco-ater*, *fuscus*, *Güntheri*, *humifusus*, *Hystrix*, *infestus*, *Koehleri*, *Lejeunei*, *Lingua*, *macroanthus*, *macrophyllus*, *Menkeii*, *pallidus*, *pubescens*, *pygmaeus*, *Radula*, *Reichenbachii*, *roseus*, *scaber*, *Schleicheri*, *silvaticus*, *thyrsiflorus*, *vestitus*, *vulgaris*.

Althaea, XVI. Eibisch.*A. officinalis* *L.*, gemeiner Eibisch.**Lathyrus, XVII. Platterbse.***L. silvestris* *Dod., L.*, Wald-Platterbse.*L. tuberosus* *L.*, knollige Platterbse, Erdmandel, Erdnüsschen.**Vicia, XVII. Wicke.***V. Cracca* *L.*, Vogel-Wicke, Kracke.

*) *Weihe et Nees ab Esenbeck* "Rubi germanici", Elberfeld 1822 — 27.

*In Gebüsch.***Galega, XVII.** Geisraute.

G. officinalis L., gemeine Geisraute.

Hypericum, XVIII. Hartheu.

H. hirsutum L., haariges H. oder Johanniskraut.

(Veronica Chamaedrys, Galium Mollugo, Ilex Aquifolium, Myosotis sparsiflora, Tordylium maximum, Chaerophyllum bulbosum, Ch. silvestre, Ch. temulum, Berberis vulgaris, Convallaria multiflora, Lychnis diurna, Mespilus vulgaris, Rosa cinnamomea, R. flexuosa, R. sempervirens, Potentilla canescens, Clematis Viticella, Digitalis ferruginea, Hesperis tristis, Geranium robertianum, Bonjeanea hirsuta, Aristolochia pallida s. May S. 230 ff.)

a) *Zwischen Gebüsch auf schattigen Anhöhen.*

(Lunaria rediviva s. May S. 232.)

b) *Zwischen Gebüsch an Bächen, Flüssen, Gräben, Sümpfen.***Malachium, X.** Weichmeier.

M. aquaticum Fries (Cerastium aquaticum L.), Wasser-W., Wasser-Hornkraut.

c) *Zwischen Gebüsch an Bergen.***Verbascum, V.** Wollkraut.

V. austriacum Schott., österreichische Königskerze.

Trifolium, XVII. Klee.

Tr. agrarium L., gelber Acker-Klee, Gold-Kl., Hopfen-Klee.

*In Berggegenden.***Epilobium, VIII.** Schotenweiderich.

E. montanum L., Berg-Weidenröslein.

(Rosa umbellata s. May S. 232.)

In waldigen Bergen.

(Hyoseris foetida s. May S. 232.)

d) *Zwischen Gebüsch an Felsen.*

(Lithospermum officinale s. May S. 232.)

Zwischen Gebüsch an Kalkfelsen.

Arabis, XV. Gänsekraut.

A. brassicaeformis Wallr. (*Brassica alpina L.*),
kohlförmiges Gänsekraut, Alpenkohl.

An sonnigen Felsen.

(*Hesperis inodora* s. May S. 232.)

An steinigen, bewachsenen Felsen.

Asperula, IV. Waldmeister.

A. tinctoria L., färbender Waldmeister.

An Felsvorsprüngen.

Echinospermum, V. Igelrüßchen.

E. deflexum Lehm. (*Myosotis deflexa Wahlb.*),
hängefrüchtiger Igelsaame.

e) *Zwischen Gebüsch in Gebirgsgegenden.*

Platanthera, XX. Platanthere.

Pl. chlorantha Cust. (*Orchis virescens Zollik.*),
grünliches Knabenkraut.

In Gebirgstälern.

(*Geranium phaeum* s. May S. 232.)

f) *Zwischen Gebüsch an Hügeln.*

Verbascum austriacum (s. oben unter c).

Lathyrus, XVII. Platterbse.

L. latifolius L., breitblättrige Platterbse.

Cytisus, XVII. Bohnenstrauch.

C. capitatus Jacq., kopfförmiger B. oder Geis-
klee. (An trocknen Hügeln.)

(*Crataegus Azarolus*, *Rosa agrestis* s. May S. 232.)

g) *In Laubwäldern an feuchten Orten.*

(*Stellaria nemorum* s. May S. 233.)

h) *In Gebüsch an steinigen Orten.*

Geranium, XVI. Storchschnabel.

G. columbinum L., Tauben-Storchschnabel.

i) *Zwischen Gebüsch auf Sumpfwiesen.*

Calamagrostis, III. Reithgras.

C. Pseudophragmites Lk. (*Arundo Pseudophragmites Schrad.*), unächtes Rohr.

k) *Zwischen Gebüsch in Voralpen.*

(*Hesperis matronalis* s. May S. 233.)

l) *Zwischen Gebüsch in Wäldern.*

Pyrethrum, XIX. Bertramswurz.

P. corymbosum W. (*Chrysanthemum corymbosum L.*), doldentraubige Bertramswurz oder Wucherblume.

Zwischen Gebüsch an Waldhügeln.

Vicia, XVII. Wicke.

V. silvatica L., Wald-Wicke.

In sandigen Waldungen.

Corydalis, XVII. Helmbusch.

C. claviculata L. gabeltragender Helmbusch od. Lerchensporn.

In waldigem Gebüsch.

(*Asparagus tenuifolius* s. May S. 233.)

38) *In Gehauen.*

(*Pulmonaria azurea* s. May S. 233.)

In Gehauen der Laubwälder.

(*Lychnis diurna* s. May S. 234.)

39) *Unter Getreide.*

Avena, III. Hafer.

A. strigosa Schreb., Rauh-H., Purhafer, Sandhafer.

Lolium, III. Lolch.

L. temulentum L., betäubender L., Taumel-L., Taumelkorn, Schwindelhafer.

Unter Getreide.

Bupleurum, V. Hasenohr.

B. rotundifolium L., rundblättriges Hasenohr
oder Durchwachs.

Alsine, V. Miere.

A. segetalis L., Acker-Vogelmiere.

Saponaria, X. Seifenkraut.

S. Vaccaria L., Acker-Seifenkraut.

Silene, X. Leimkraut.

S. conoidea L., halbkegelförmiges Leimkraut.

Pisum, XVII. Erbse.

P. arvense L., Stockerbse.

Centaurea, XIX. Flockenblume.

C. Cyanus L., Korn-Fl., blaue Kornblume.

C. solstitialis L., Sommer-Flockenblume.

(*Bupleurum protractum*, *Caucalis dancoides*, *Euphorbia segetalis*, *Adonis aestivalis*, *Geranium dissectum*, *Vicia segetalis* s. May S. 234.)

40) *An und in Gräben.*a) *An Gräben.*

Veronica, II. Ehrenpreis.

V. Anagallis L., Wasser-Ehrenpreis.

V. maritima L., Meerstrands-Ehrenpreis.

Heleogiton, III. Grundbinse.

H. glaucum Rchb. (*Scirpus glaucus Sm.*), blau-
grüne Grundbinse.

Baldingera, III. Baldingere.

B. arundinacea Rchb. (*Ehalaris arundinacea L.*),
rohrartige B., rohrartiges Glanzgras.

Agrostis, III. Straussgras.

A. stolonifera L., wucherndes Str., wuchern-
der Windhalm.

An Gräben.

Calamagrostis, III. Reithgras.

C. lanceolata Rth. (*Arundo Calamagrostis L.*),
vielhalmiges R., Wiesenrohr.

Festuca, III. Schwingel.

F. inermis De C. (*Bromus inermis L.*), grannen-
loser Schwingel.

Scabiose, IV. Scabiose.

Sc. hybrida All., Bastard-Scabiose.

Verbascum, V. Wollkraut.

V. Blattaria L., Motten-Königskerze.

Juncus, VI. Simse.

J. campestris Jacq. (*J. bulbosus L.*), knollige S.

J. conglomeratus L., zusammengeknäulte Simse,
Knopfbirse.

J. effusus L., Flatter-Simse, Flatter-Birse.

Rumex, VI. Ampher.

R. aquaticus L., Wasser-Ampher.

Malachium, X. Weichmeier.

M. aquaticum Fries. (*Cerastium aquaticum L.*),
Wasser-W., Wasser-Hornkraut. (Zwischen
Gebüsch.)

Euphorbia, XI. Wolfsmilch.

E. pilosa L., behaarte Wolfsmilch.

Phlomis, XIV. Phlomis.

Phl. tuberosa L., knollige Phlomis.

Geranium, XVI. Storchschnabel.

G. palustre L., Sumpf-Storchschnabel.

(*Glyceria distans*, *Myosotis palustris*, *Samolus Valerandi*,
Chaerophyllum silvestre, *Convallaria multiflora*, *Stellaria*
neglecta, *Euphorbia palustris*, *E. virgata*, *Spiraea denudata*,
Sp. Ulmaria, *Geum intermedium*, *G. rivale*, *Ranunculus*
Flammula, *Nasturtium palustre*, *N. silvestre*, *Cochlearia Ar-*
moracia, *Vigna acuta*, *V. canescens*, *V. elongata*, *V. in-*
termedia, *V. paniculata*, *V. vulpina*, *Carex Pseudo-Cyperus*
s. May S. 234 ff.)

b) *In Gräben.***Callitriche, I.** Wasserstern.C. autumnalis *L.*, Herbst-W. B. tenuior.C. platycarpa *Ktzig.*, breitfruchtiger Wasserstern. B. stagnatilis.C. stagnalis *Scop.*, Sumpf-Wasserstern.**Veronica, II.** Ehrenpreis.V. Beccabunga *L.*, Quellen-E., Bachbungen, Wassersalat.**Utricularia, II.** Wasserschlauch.U. intermedia *Hayne*, mittlerer Wasserschlauch.**Glyceria, III.** Schwaden, Mannagras.Gl. fluitans *R. Br.* (*Festuca fluitans L.*), essbarer Schwingel.**Potamogeton, IV.** Laichkraut.P. gramineus *L.*, grasartiges L. oder Saamkraut.Var. δ . latifolius.**Oenanthe, V.** Rebendolde.O. fistulosa *L.*, röhrlige Rebendolde, Drüswurz, Tropfwurz.**Heliosciadium, V.** Sumpfdoldchen,H. nodiflorum *Koch.* (*Sium nodiflorum L.*), knochenblüthiges S., knochenblüthiger Merk.**Ranunculus, XIII.** Ranunkel, Hahnenfuss.R. hederaceus *L.*, epheublättriger R. oder H.**Stachys, XIV.** Ziest.St. palustris *L.*, Sumpf-Ziest.**Scutellaria, XIV.** Helmkraut.Sc. galericulata *L.*, gemeines H. od. Fieberkraut.**Nasturtium, XV.** Brunnenkresse.N. amphibium *R. Rr.* (*Sisymbrium amphibium L.*), gem. Wasserrauke, Wasserhederich, Wasserrettig.**Abutilon, XVI.** Sammetpappel.A. Avicennae *Gaertn.* (*Sida Abutilon L.*), gemeine Sida

In Gräben.

Ceratophyllum, XXI. Hörnerblatt.

C. apiculatum Cham., spitzfruchtiges H. oder Wasserhorn.

C. demersum L., rauhes H. oder Wasserhorn.

C. platyacanthus Cham., breitedorniges H.

(*Hippuris vulgaris*, *Callitriche verna*, *Lemna gibba*, *L. minor*, *L. polyrrhiza*, *L. trisulca*, *Iris Pseudacorus*, *Scirpus silvaticus*, *Potamogeton crispus*, *P. perfoliatus*, *Hottonia palustris*, *Larabrea uliginosa*, *Cerastium triviale*, *Potentilla Anserina*, *Caltha palustris*, *Ranunculus repens*, *R. sceleratus*, *Trixago latifolia* s. May S. 237 f.)

In ausgetrockneten Gräben.

Rumex, VI. Ampher.

R. pulcher L., schöner Ampher.

41) *Im Grase.*

Thymus, XIV. Thymian, Quendel.

Th. angustifolius Schreb. γ . *laxus* schmalblät-
teriger, schlaffer Thymian.

(*Veronica arvensis* s. May S. 238.)

In hohem Grase.

(*Polygonum aviculare* s. May S. 238.)

In kurzem Grase.

Prunella, XIV. Prunelle.

Pr. vulgaris L., gemeiner Brunnheil.

Cirsium, XIX. Kratzdistel.

C. acaule All. (*Cnicus acaulis Willd.*), stiel-
loses Kratzkraut.

(*Veronica serpyllifolia*, *Geranium pusillum*, *Medicago minima*, *Orchis Morio* s. May S. 238.)

42) *In Grasgärten.*

(*Muscari racemosum*, *Albuca nutans*, *Helleborus alti-
folius*, *H. niger* s. May S. 239.)

43) *An grasigen Orten.*

Salvia, II. Salbey.

S. Verbenaca L., orientalische Salbey.

Plantago, IV. Wegerich.

Pl. decumbens Bernh., niederliegender W.

Pl. major L., grosser Wegerich.

Pl. media L., mittlerer Wegerich.

Agrimonia, XI. Odermennig.

A. Eupatorium L., gemeiner O., Leberklette, Steinwurz.

Medicago, XVII. Schneckenklee.

M. maculata W. gefleckter Schneckenklee.

Achillea, XIX. Garbe.

A. Millefolium L., gemeine Schaafgarbe.

Gladiolus communis, *Iris biflora*, *I. germanica*, *I. graminea*, *Agrostis stolonifera*, *Poa bulbosa*, *Festuca pratensis*, *Bromus racemosus*, *Plantago lanceolata*, *Alchimilla vulgaris*, *Symphytum officinale*, *S. patens*, *Campanula Rapunculus*, *Polygonum aviculare*, *Ajuga reptans*, *Erodium ciconium*, *E. cicutarium*, *Trifolium pratense*, *Hieracium pratense*, *Taraxacum officinale*, *Listera ovata*, *Poterium glaucescens* s. May S. 239 ff.)

a) *Auf begrasten Plätzen an Felsen.*

(*Hieracium setigerum* s. May S. 242.)

b) *Auf Grasplätzen in Gebirgen und Voralpen.*

(*Habenaria albida* s. May S. 242.)

c) *An grasigen Orten auf Sandboden.*

(*Helianthemum retrofractum*, *Ranunculus illyricus* siehe May S. 242.)

d) *An grasigen Plätzen in Voralpengegenden.*

(*Habenaria albida*, *Vignea divisa* s. May S. 243.)

e) *Auf Grasplätzen in Waldgebirgen.*

Luzula, VI. Hainsimse.

L. maxima Desv. (*Juncus pilosus* d. Linn.), grosse Aftersimse, grosse Hainsimse, Waldsimse.

f) *Auf Grasplätzen in Waldungen.*
(*Thesium comosum* s. May S. 243.)

g) *Auf dürrer Grasplätzen.*
(*Catapodium loliaceum* s. May S. 241.)

h) *Auf feuchten Grasplätzen.*

Trifolium, XVII. Klee.

Tr. procumbens L., niederliegender Klee, gelber Feld-Klee.

i) *An sonnigen Grasplätzen auf Kalkhügeln.*
(*Poterium polygamum* s. May S. 241.)

k) *Auf steinigen Grasplätzen.*
(*Pollinia distachys* s. May S. 241.)

l) *Auf trocknen Grasplätzen.*

Sorghum, III. Sorghogras.

S. halepense Pers. (*Holcus halepensis* L.), aleppisches Pferdegras oder Bartgras.

Ervum, XVII. Erve, Linse.

E. tetraspermum L., viersaamige E. oder L.

Trifolium, XVII. Klee.

Tr. conicum Pers., kegelförmiger Klee.

Tr. incarnatum L., schönrother Kl., Incarnat-Kl.

(*Lotus corniculatus*, *Trifolium scabrum* s. May S. 241.)

Auf trocknen Grasplätzen der Kalkberge.

Astragalus, XVII. Traganth.

A. vesicarius L., weissliches Wirbelkraut.

m) *Auf grasigen Anhöhen.*

(*Potentilla canescens*, *Arabis sagittata* s. May S. 242)

Auf grasigen, steinigen Anhöhen.

(*Turritis glabra* s. May S. 242.)

n) *Auf Grashügeln.*

(*Ornithogalum pyrenaicum* s. May S. 242.)

o) *Unter üppigem Graswuchse.*

(*Veronica latifolia* s. May S. 243.)

44) *Auf Gries.*

a) *Der Alpenflüsse.*

Chondrilla, XIX. Knorpelsalat.

Ch. prenanthoides *H. Cass.* (*Prenanthes chondrilloides* *L.*), hasenlattigartiger Kn., knorpelsalatartiger Hasenlattig.

(*Saxifraga oppositifolia*, *Dryas octopetala*, *Acinos alpinus*, *Noccaea alpina* s. May S. 243.)

b) *Der Kalkgebirge und Voralpen.*

(*Arabis alpina*, *Polygala alpestris* s. May S. 244.)

c) *Der Urgebirgsalpen.*

Noccaea, XV. Noccäe.

N. brevicaulis *Rchb.* (*Lepidium brevicaule* *Hpp.*), kurzstielige Kresse.

45) *Auf Gypsfelsen.*

(*Helianthemum canum* s. May S. 244.)

46) *An Hecken.*

Ligustrum, II. Hartriegel.

L. vulgare *L.*, gem. H., Rainweide, Rheinweide.

Veronica, II. Ehrenpreis.

V. latifolia *L.*, breitblättriger Ehrenpreis.

Lycium, V. Bocksdom.

L. barbarum *L.*, chinesischer Bocksdom.

L. europaeum *L.*, europäischer Bocksdom.

Asparagus, VI. Spargel.

A. officinalis *L.*, gemeiner, gewöhnlicher Sp.

Rosa, XII. Rose.

R. affinis *Rau.*, verwandte Rose.

R. alba *L.*, weisse Rose.

An Hecken.

Rosa canina L., Hunds-Rose, Hecken-Rose, wilde Feldrose.

R. psilophylla Rau., geruchlose Schirmrose.

R. rotundifolia Richb., rundblättrige Rose.

R. sempervirens L., immergrüne Rose.

Rubus, XII. Himbeere, Brombeere.

R. caesius L., δ . *R. Pseudo-Idaeus* Lej., Kratzbeere.

(*Evonymus verrucosus*, *Sambucus nigra*, *Oxalis stricta*, *Philadelphus coronarius*, *Rosa arvensis*, *Fumaria capreolata*, *Tamus communis* s. May S. 245.)

47) *Auf Heiden.*

Erica, VIII. Heide.

E. cinerea L., graues Heidekraut.

Thymus, XIV. Thymian, Quendel.

Th. angustifolius Schreb., schmalblättriger Th.

Th. Serpyllum L., Feld-Thymian, Feldpoley, Quendel.

Polygala, XVII. Kreuzblume.

P. oxyptera Richb., scharfgeflügelte Kreuzbl.

(*Aira flexuosa*, *Galium rotundifolium*, *Tormentilla erecta*, *Ajuga pyramidalis*, *Alectorolophus minor*, *Leontodon hispidus*, *Orchis Morio* s. May S. 245 f.)

Auf sandigen Heiden.

(*Ulex europaeus* s. May S. 246.)

a) *Auf Heideboden.*

(*Galium silvestre* s. May S. 246.)

In Heideland.

(*Rubus fruticosus*, *R. suberectus* s. May S. 246.)

b) *Auf trocknen Heideplätzen.*

(*Carex binervis* s. May S. 247.)

c) *In Heidewäldern.*

Pyrola, X. Birnkraut.

P. chlorantha *Siv.*, rundblättriges Birnkraut.

Chimophila, X. Wintergrün.

Ch. umbellata *Nutt.* (*Pyrola umbellata* *L.*),
doldentragendes Wintergrün.

Orobanche, XIV. Ervenwürger.

O. variegata *Wallr.*, bunter Ervenwürger (Auf
Spartium scoparium schmarotzend.)

Cytisus, XVII. Bohnenstrauch.

C. nigricans *L.*, schwärzlicher B. od. Geissklee.

Hypericum, XVIII. Hartheu.

H. pulchrum *L.*, hübsches Johanniskraut.

Arnica, XIX. Wolverley, Wohlverleih.

A. montana *L.*, ächte, wahre W., Berg-W.

(*Vaccinium Myrtillus*, *Teesdalia nudicaulis*, *Spartium scoparium*, *Genista pilosa* s. May S. 247.)

In Heidewäldern an sonnigen Hügeln.

(*Scorzonera glastifolia* s. May S. 247.)

In Heidewaldungen auf Moorboden.

(*Genista anglica* s. May S. 247.)

In Heidewäldern auf schwammigem Moorboden.

Polygala, XVII. Kreuzblume.

P. serpyllacea *Weih.*, quendelartige Kreuzbl.

In schattigen Heidewäldern.

(*Maianthemum bifolium* s. May S. 247.)

In trocknen Heidewäldern.

(*Scorzonera plantaginea* s. May S. 247.)

48) *Auf Hochebenen.*

(*Hierochloë borealis* s. May S. 248.)

49) *Auf Holzerde.*

(*Arenaria trinervia* s. May S. 248.)

50) *Auf Hügeln.*

(Vergl. Kalkhügel, Sandhügel.)

Veronica, II. Ehrenpreis.*V. officinalis L.*, gemeiner, gebräuchlicher E.**Salvia, II. Salbey.***S. verticillata L.*, quirlförmige Salbey.**Agrostis, III. Straussgras.***A. canina L.*, Hunds-Straussgras, Haargras.**Stipa, III. Pfriemengras.***St. capillata L.*, haarförmiges Pfriemengras.**Dactylis, III. Knauelgras.***D. glomerata L.*, gemeines K, Hundsgras.**Lolium, III. Lolch.***L. perenne L.*, ausdauernder Lolch, Tauben-
korn, englisches Raygras.**Agropyrum, III. Queckengras.***A. rigidum R. S.* (*Triticum rigidum Schrad.*),
steifer Weizen.**Plantago, IV. Wegerich.***Pl. maritima L.*, Meerstrands-W. *α. leptophylla.***Galium, IV. Labkraut.***G. verum L.*, ächtes Labkraut, Bettstroh.**Verbascum, V. Wollkraut.***V. australe Schrad.*, südliche Königskerze.*V. Blattaria L.*, Motten-Königskerze.*V. collinum Schrad.*, Hügel-Königskerze.*V. Lychnitis L.*, lichtblumenartige Königskerze.*V. nemorosum Schrad.*, Hain-Königskerze.*V. nigrum L.*, schwarze Königskerze.*V. nigro-austriacum Richb.**V. thapsoides L.*, schmalblättrige Königskerze.**Polemonium, V. Sperrkraut.***P. coeruleum L.*, blaues Sperrkraut.

An Hügeln.

Eryngium, V. Mannstreu.

E. campestre L., Feld-Mannstreu.

Pimpinella, V. Pimpinelle.

P. Saxifraga L., Stein-Bibernell, Pfefferwurz.

Linum, V. Lein.

L. perenne L., ausdauernder, sibirischer Lein.

Oenothera, VIII. Nachtkerze.

O. biennis L., gemeine N., gelbe Rapunzel, Rhapontica.

Agrimonia, XI. Odermennig.

A. Eupatorium L., gemeiner O., Leberklette, Steinwurz.

Myrtus, XII. Myrte.

M. communis L., gemeine Myrte.

Rosa, XII. Rose.

R. pimpinellifolia L., pimpinellenblättrige Rose.

R. rubiginosa L., rostfarbige Rose, Wein-Rose.

R. tomentosa Sm., filzige Rose.

Potentilla, XII. Fingerkraut.

P. argentea L., silberweisses Fingerkraut.

P. Wiemanniana Günther et Schumm., Wiemannisches Fingerkraut.

Acinos, XIV. Basilienthym.

A. thymoides Mnch. (*Thymus Acinos L.*), blauer Bergthymian, Steinquendel.

Prunella, XIV. Prunelle.

Pr. vulgaris L., gemeiner Brunnheil.

Orobanche, XIV. Ervenwürger.

O. elatior Sutt., hoher E., hohe Sommerwurz. (Auf *Medicago falcata* und *sativa*.)

O. variegata Wallr., bunter Ervenwürger, bunte Sommerwurz. (Auf *Spartium scoparium*.)

Geranium, XVI. Storchschnabel.

G. columbinum L., Tauben-Storchschnabel.

• *An Hügeln.*

Althaea, XVI. Eibisch.

A. pallida W. Kit., bleicher Eibisch.

Genista, XVII. Ginster.

G. ovata W. Kit., eyförmiger Ginster.

G. tinctoria L., Färbe-Ginster.

Vicia, XVII. Wicke.

V. angustifolia Riv. (*Vicia sativa* β . *nigra L.*),
schmalblättrige Wicke.

V. hybrida L., Bastard-Wicke.

Cytisus, XVII. Bohnenstrauch.

C. nigricans L., schwärzlicher B. od. Geissklee.

Astragalus, XVII. Traganth.

A. asper Jacq., scharfes Wirbelkraut.

Trifolium, XVII. Klee.

Tr. filiforme L., fadenförmiger Klee.

Coronilla, XVII. Kronwicke.

C. varia L., bunte Kr., Schaaflinse.

Hypericum, XVIII. Hartheu.

H. hirsutum L., haariges H. od. Johanniskraut.

H. montanum L., Berg-Johanniskraut.

Barkhausia, XIX. Barkhausie.

B. graveolens Rchb. (*Crepis*), starkkriechende B.

Micropus, XIX. Falzblume.

M. erectus L., aufrechte Falzblume.

Achillea, XIX. Garbe.

A. Millefolium L., gemeine Schaafgarbe.

Centaurea, XIX. Flockenblume.

C. Crupina L., feinblättrige Flockenblume.

C. Jacea L., gemeine Flockenblume.

(*Veronica arvensis*, *V. prostrata*, *V. serpyllifolia*, *Salvia pratensis*, *Iris graminea*, *Pollinia Gryllus*, *Agrostis vulgaris*, *Festuca ovina*, *F. pannonica* *F. valesiaca*, *Sclerochloa rigida*, *Plantago graminea*, *Pl. sericea*, *Pl. serpentina*, *Galium lucidum*, *Moenchia erecta*, *Cynoglossum pictum*, *Verbascum phoeniceum*, *Campanula Rapunculus*, *Rhamnus catharticus*,

An Hügeln.

Rh. infectorius, Evonymus europaeus, Viola canina, Thesium comosum, Cynanchum Vincetoxicum, Bunium Bulbocastanum, Torilis nodosa, Lychnis Viscaria, Euphorbia Gerardiana, Sorbus torminalis, Rosa cinnamomea, R. collina, Potentilla collina, Helianthemum pulverulentum, Thalictrum flexuosum, Ranunculus bulbosus, R. illyricus, Orobanche Rapum, Teesdalia nudicaulis, Biscutella ciliata, Erysimum diffusum, Sisymbrium pannonicum, Erodium cicutarium, Spartium scoparium, Genista germanica, Ulex europaeus, Cytisus purpureus, C. sessilifolius, Lotus corniculatus, Astragalus Cicer, Trifolium montanum, Medicago lupulina, M. minima, Hieracium cymigerum, H. piloselloides, H. Vaillantii, Geracium praemorsum, Tragopogon floccosus, Orchis Morio, Poterium glaucescens s. May S. 248—53.)

a) *Auf Hügeln an Flussufern.*

Verbascum, V. Wollkraut.

V. ramigerum Lk., ästige Königskerze.

b) *An Hügeln in Gebüsch.* (Vergl. Nr. 37.)

Verbascum austriacum Schott., österreichische Königskerze.

Lathyrus, XVII. Platterbse.

L. latifolius L., breitblättrige Platterbse.

(Crataegus Azarolus, Rosa agrestis, Cytisus hirsutus s. May S. 253.)

c) *An Hügeln in Kalkgebirgen.*

Astragalus, XVII. Traganth.

A. hypoglottis L., Wiesen-Wirbelkraut.

(Alyssum montanum s. May S. 253.)

d) *An Hügeln in Nadelwäldern.*

(Genista sagittalis s. May 254.)

e) *An Hügeln in Sandgegenden.*

(Agropyrum intermedium, Berteroa incana s. May S. 254.)

f) *An Hügeln in Vorhötzern.*

Cytisus hirsutus (s. oben unter b.)

g) *Auf buschigen Hügeln.*

(*Euphorbia angulata* s. May S. 254.)

h) *Auf dünnen Hügeln.*

Scleranthus, X. Knaul.

Scl. perennis L., Winter-Knaul, Sand-Knörich.

Rosa, XII. Rose.

R. spinosissima L., Stachel-Rose.

(*Gypsophila rigida* s. May S. 255.)

i) *Auf felsigen Hügeln.*

Ononis, XVII. Hauhechel.

O. minutissima L., kleinste Hauhechel.

Helichrysum, XIX. Immortelle.

H. Stoechas Mnch. (*Gnaphalium Stoechas* L.),
buschiges Ruhrkraut, Sonnengoldblume, gelbe
Katzenpfötchen.

k) *Auf grasigen Hügeln.*

Helianthemum, XII. Ciströschen.

H. guttatum Mill. (*Cistus guttatus* L.), getüpfel-
tes C. oder Sonnenröschen.

Thalictrum, XIII. Wiesenraute.

Th. majus L., grosse Wiesenraute.

Ervum, XVII. Erve, Linse.

E. gracile De C. schlanke Erve oder Linse.

Trifolium, XVII. Klee.

Tr. angustifolium L., schmalblättriger Klee.

(*Salvia austriaca*, *Iris variegata*, *Chilochloa Boehmeri*,
Campanula persicifolia, *Ajuga montana*, *Vignea divisa*, *Carex*
punctata s. May S. 255.)

An kurzbegrasten Hügeln.

(*Bellis perennis* s. May S. 256.)

An grasigen, sonnigen Hügeln.

Agrostemma, X. Rade.

A. Coronaria L., gekrönte Rade, Garten-Rade,
Vexirnelke.

l) *Auf kalkigen Hügeln.*

Dianthus, X. Nelke.

D. prolifer L., sprossende Nelke, Kopfnelke.

(*Scorzonera purpurea* s. May S. 256.)

m) *Auf lichten Hügeln.*

(*Viola canina* s. May S. 256.)

n) *Auf sandigen Hügeln.*

Agropyrum, III. Queckengras.

**A. glaucum R. S. (*Triticum glaucum Desf.*),
blaugrünes Queckengras, blaugrüner Weizen.**

Dianthus prolifer (s. oben unter l.)

Scorzonera purpurea (s. oben unter l.)

(*Gypsophila rigida*, *Dianthus diutinus*, *Achillea odorata* s. May S. 256.)

o) *An schattigen Hügeln in Bergwaldungen.*

Verbascum, V. Wollkraut.

**V. cuspidatum Schrad., Königskerze mit borstig-
zugespitzten Blättern.**

p) *An sonnigen Hügeln.*

Rhus, V. Sumach.

**Rh. Cotinus L., Perücken-S., Perückenstrauch,
Gelbholz-Sumach.**

Agrostemma Coronaria (s. oben unter k).

Anthericum, VI. Zaunlilie.

A. Liliago L., astlose Z. oder Graslilie.

Dianthus prolifer (s. oben unter l.).

Rubus, XII. Himbeere, Brombeere.

R. rudis Weihe.

Iberis, XV. Schleifenblume.

I. umbellata L., doldentragender Bauernsenf.

Genista, XVII. Ginster.

G. scariosa Vio., trockenblättriger Ginster.

An sonnigen Hügeln.

Trifolium, XVII. Klee.

Tr. stellatum L., sternförmiger Klee.

Scorzonera, XIX. Haferwurz.

Sc. muricata Bulb., kurzstachelige Haferwurz od. Schwarzwurzel.

(*Veronica latifolia, V. Teucrium, Convolvulus cantabrica, Dianthus Armeria, Silene nutans, Sabulina verna, Rosa gallica, Alyssum calycinum, Spartianthus junceus, Genista pilosa, Medicago Gerardi, Hieracium echiodes, Scorzonera plantaginea, Carex supina* s. May S. 256 ff.)

An sonnigen, steinigen Hügeln.

(*Potentilla chrysantha* s. May S. 258.)

Auf sonnigen, trocknen Hügeln.

(*Iris biflora, Trifolium striatum* s. May S. 258.)

q) *Auf steinigen Hügeln.*

Galium, IV. Labkraut.

G. purpureum L., purpurfarbiges Labkraut.

Asperula, IV. Waldmeister.

A. montana Kit., Berg-Waldmeister.

Verbascum, V. Wollkraut.

V. pulverulentum Vill., bestäubte Königskerze.

Anthemis, XIX. Chamille.

A. austriaca L., österreichische Chamille.

(*Gypsophila rigida, Euphorbia hiberna, Digitalis ferruginea, Nasturtium lippizense, Barkhausia rhoeadifolia* siehe May S. 258 f.)

r) *An trocknen Hügeln.*

Asterolinum, V. Stern-Lein.

A. stellatum (Lisimachia Linum stellatum L.), kleinblättrige Lysimachie.

Anthericum Liliago L. (s. oben unter p).

Anthyllis, XVII. Wundklee.

A. alpestris Rchb., Alpen-Wundklee.

An trocknen Hügeln.

Cytisus, XVII. Bohnenstrauch.

C. capitatus Jacq., kopfförmiger B. od. Geisklee.
(In Gebüsch.)

Trigonella, XVII. Trigonelle.

Tr. monspeliaca L., französischer Kuhhornklee.

Barkhausia, XIX. Barkhausie.

B. foetida De C. (*Crepis foetida L.*), stinkender Pippau.

(*Rosa hybrida*, *R. pumila*, *Hieracium praealtum*, *Lactuca perennis*, *Poterium Sanguisorba* s. May S. 259.)

s) *Auf Hügelwiesen.*

Linum, V. Lein.

L. narbonense L., französischer Lein.

51) *Auf Kalkalpen.*

Campanula, V. Glockenblume.

C. alpina L., Alpen-Glockenblume.

Ligusticum, V. Ligustik.

L. Seguieri Koch. (*Selinum Seguieri L.*), Seguiers Silge.

Saxifraga, X. Steinbrech.

S. crustata Vest., langblättriger Steinbrech.

Pulsatilla, XIII. Küchenschelle.

P. Burseriana (*Anemone Burseriana Scop.*),
Burser'sche Küchenschelle.

Arabis, XV. Gänsekraut.

A. ciliata R. Br., gefranztes, gewimpertes
Gänsekraut.

Gymnadenia, XX. Nacktdrüse.

G. suaveolens Rchb. (*Orchis suaveolens Vill.*),
wohlriechendes Knabenkraut.

(*Wulfenia carinthiaca*, *Draba elongata*, *Arabis vohinensis*, *Salix silesiaca* s. May S. 259.)

a) *Auf Kalkalpen an grasigen Abhängen.*

Luzula, VI. Hainsimse.

L. glabrata Deso. (*Juncus glabratus Hoppe*),
glatte Hainsimse oder Simse.

b) *Auf Kalkalpen an Felsen.*

Saxifraga, X. Steinbrech.

S. recta Lap., gerader Steinbrech.

Helianthemum, XIII. Ciströschen.

H. alpestre Rchb. (*Cistus alpestris Scop.*), Alpen-
Ciströschen, Alpen-Sonnenröschen.

An bewachsenen Felsen.

Aronia, XII. Beermispel.

A. Chamaemespilus Pers. (*Mespilus Chamae-
mespilus L.*), niedrige Mispel.

In nassen Felsritzen.

Luzula glabrata (s. oben unter a).

c) *Auf Gerölle der Kalkalpen.*

Lloydia, VI. Lloydie

L. serotina Rchb. (*Anthericum serotinum L.*),
späte Zaunblume.

Dryas, XII. Dryade.

Dr. octopetala L., Alpen-Dryas, gamanderblät-
terige Dryas.

Am Gries.

(*Noccaea alpina* s. May S. 259.)

d) *Auf Kalkalpen an sandig-steinigen Orten.*

Senecio, XIX. Kreuzkraut.

S. abrotanifolius L., stabwurzblättriges Kr.

e) *Auf Kalkalpen-Triften.*

Potentilla, XII. Fingerkraut.

P. minima Hall. fil., kleinstes Fingerkraut.

Auf Kalkalpen-Triften.

Oxytropis, XVII. Spitzfahne.

O. montana De C. (*Astragalus montanus* L.),
Berg-Sp., Berg-Wirbelkraut.

f) *Auf Kalkalpenwiesen.*

Betonica, XIV. Betonie.

B. Alopecurus L., gelbweisse Betonie.

Auf niedrigen Kalkalpenwiesen.

Crepis, XIX. Pippau.

Cr. alpestre Rchb., Voralpen-Pippau, Voralpen-
Habichtskraut.

g) *Auf hohen Kalkalpen.*

Saxifraga, X. Steinbrech.

S. stenopetala Gaud., blattloser Steinbrech.

Saponaria, X. Seifenkraut.

S. ocymoides L., rundblättriges Seifenkraut.

Auf höhern Kalkalpen an felsigen Orten.

Arabis, XV. Gänsekraut.

A. scabra All., scharfes Gänsekraut.

52) In Kalkalpengegenden.

An sandig-steinigen Orten.

Senecio abrotanifolius L. (s. Seite 458 unter d.)

In Kalkalpenthälern.

(*Helleborus altifolius*, *H. niger* s. May S. 260.)

In Kalkalpenthälern an felsigen Abhängen.

(*Silene rupestris* s. May S. 260.)

53) An und auf Kalkbergen.

Rubus, XII. Himbeere, Brombeere.

R. pubescens Weihe, weichhaarige Brombeere.

Origanum, XIV. Dosten.

O. vulgare L., wilde D. *β. thymiflorum* Rchb.

An und auf Kalkbergen.

Erysimum, XV. Hederich.

E. virgatum Rth., ruthenförmiger Hederich.

Polygala, XVII. Kreuzblume.

P. amblyptera Rchb., stumpfflügelige Kreuzbl.

Carduus, XIX. Distel.

C. defloratus L., Wald-Distel, Berg-Distel.

(*Hieracium collinum*, *Tragopogon major* s. May S. 260.)

a) *An Kalkbergen in Gebüsch.*

Coronilla, XVII. Kronwicke.

C. montana Riv., Berg-Kronwicke

b) *Auf Kalkbergen an sonnigen Grasplätzen.*

(*Poterium polygamum* s. May S. 261.)

Auf trocknen Grasplätzen.

Astragalus, XVII. Traganth.

A. vesicarius L., weissliches Wirbelkraut.

c) *Auf Hügeln und Triften der Kalkberge.*

Astragalus hypoglottis L., Wiesen-Wirbelkraut.

d) *Auf Wiesen der Kalkberge.*

Astragalus Onobrychis L., langfahniges W.

(*Polygala amara*, *P. austriaca* s. May S. 261.)

e) *An sonnigen Kalkbergen.*

Linum, V. Lein.

L. hirsutum L., haariger Lein.

Centaurea, XIX. Flockenblume.

C. stricta W. Kit., steifaufrechte Flockenblume.

(*Campanula sibirica*, *Daphne Cneorum* s. May S. 261.)

54) *Auf Kalkboden.*

Salvia, II. Salbey.

S. verticillata L., quirlförmige Salbey.

Auf Kalkboden.

Campanula, V. Glockenblume.

C. lunariaefolia W., mondveilblättrige Gl.

C. simplex De C., einfache Glockenblume.

Scleranthus, X. Knauel.

Scl. perennis L., Winter-Kn., Sand-Knörich.

Rosa, XII. Rose.

R. tomentosa Sm., filzige Rose.

Glaucium, XIII. Hornmohn.

Gl. corniculatum P. (*Chelidonium corniculatum L.*), bleichrother Hornmohn.

Rapistrum, XV. Rapsdotter.

R. perenne All. (*Myagrum perenne L.*), ausdauernder Dotter.

Vicia, XVII. Wicke.

V. tenuifolia Rth., feinblättrige Wicke.

Coronilla, XVII. Kronwicke.

C. varia L., bunte Kr., Schaaflinse.

Barkhausia, XIX. Barkhausie.

B. foetida De C. (*Crepis foetida L.*), stinkender Pippau.

(*Stipa pennata*, *Nonnea pulla*, *Reseda lutea*, *Thalictrum flexuosum*, *Isatis tinctoria*, *Neslia paniculata*, *Hieracium glaucum*, *Scorzonera glastifolia* s. May S. 261 f.)

a) *Auf Kalkboden an sonnigen Anhöhen.*

Teucrium, XIV. Gamander.

T. Botrys L., Trauben-Gamander.

b) *Auf Kalkboden an Rändern der Bergwälder.*

Rosa, XII. Rose.

R. alpina L., Alpen-Rose.

c) *Auf Kalkboden an Felsen in Berggegenden*

Rosa sepium Thuill., Zaun-Rose.

Auf Kalkboden an sonnigen, felsigen Plätzen.

Thymus, XIV. Thymian, Quendel.

Th. humifusus *Bernh.*, gestreckter Th. od. Q.

d) *Auf Kalkboden an Flussufern.*

(*Euphorbia Gerardiana* s. May S. 262.)

e) *Auf Kalkboden in höheren Gegenden.*

Campanula, V. Glockenblume.

C. crenata *Lk.*, gekerbte Glockenblume.

f) *Auf Kalkboden an sonnigen Hügeln.*

(*Veronica Teucrium*, *Dianthus Armeria* s. May S. 262.)

g) *Auf Kalkboden in felsigen Wäldern.*

Geranium, XVI. Storchschnabel.

G. sanguineum *L.*, blutrother St., rothe Hühnerwurz, Blutkraut.

h) *Auf Kalkboden an Wegen.*

Glaucium, XIII. Hornmohn.

Gl. rubrum *Sibth. Sm.*, rother Hornmohn.

i) *Auf trocknen Kalkboden.*

Asperula, IV. Waldmeister.

A. cynanchica *L.*, Hügel-W., Bräunewurzel.

55) *An Kalkfelsen.*

Stipa, III. Pfriemengras.

St. capillata *L.*, haarsaamiges Pfriemengras.

Sedum, X. Fetthenne.

S. Forsterianum *Sm.*, Forster'scher Fetthenne, Forster'scher Knörpel.

Teucrium, XIV. Gamander.

T. montanum *L.*, Berg-Gamander.

Onobrychis, XVII. Esparsette, Hahnenkopf.

O. sativa *Lam.* (*Hedysarum Onobrychis*), gemeiner H., Schweizer-Klee, Esper.

*An Kalkfelsen.***Hieracium, XIX.** Habichtskraut.*H. saxatile Jacq.*, Stein-Habichtskraut.**Crepis, XIX.** Pippau.*Cr. lacera Ten.*, geschlitzter Pippau.**Senecio, XIX.** Kreuzkraut.*S. rupestris W. Kit.*, Felsen-Kreuzkraut.**Centaurea, XIX.** Flockenblume.*C. variegata Lam.*, bunte Flockenblume.

(*Festuca guestfalica*, *Onosma stellulatum*, *Saxifraga Sternbergii*, *Arenaria grandiflora*, *Potentilla recta*, *Helianthemum canum*, *H. vineale*, *Alyssum edentulum*, *Vesicaria utriculata*, *Biscutella saxatilis*, *Erysimum carniolicum*, *Geranium phaeum*, *Genista silvestris*, *Lactuca perennis* siehe May s. 263 f.)

a) *Auf Kalkfelsen an Flussufern.*

(Erysimum Cheiranthus s. May S. 264.)

b) *An Kalkfelsen zwischen Gebüsch.***Arabis, XV.** Gänsekraut.*A. brassicaeformis Wallr.* (*Brassica alpina L.*), kohlformiges Gänsekraut, Alpenkohl.c) *An Kalkfelsen in Voralpen.***Hieracium, XIX.** Habichtskraut.*H. villosum L.*, zottiges Habichtskraut.d) *An bewachsenen, sonnigen Kalkfelsen***Herniaria, V.** Bruchkraut.*H. incana Lam.*, graues Bruchkraut.

(Dictamnus Fraxinella s. May S. 264.)

e) *An sonnigen Kalkfelsen.***Dianthus, X.** Nelke.*D. plumarius L.*, Feder-Nelke, Pfingst-Nelke.**Sabulina, X.** Sändling.*S. verna* (*Arenaria verna Jacq.*), Frühlings-S.

(*Ornithogalum comosum*, *Ruta divaricata*, *Sabulina setacea*, *Euphorbia saxatilis*, *Hypericum elegans* s. May S. 265.)

An sonnigen, bewachsenen Kalkfelsen.

Dictamnus Fraxinella (s. oben unter *d*).

f) Auf den höchsten Kalkfelsen.

Saxifraga, X. Steinbrech.

S. Burseriana L., Burser's Steinbrech.

g) An kalkfelsigen Orten der Voralpen.

Heracleum, V. Bärenklau.

H. austriacum L., österreichischer Bärenklau,
österreichisches Heilkraut.

56) Auf Kalkgebirgen.

Aconitum, XIII. Eisenhut.

A. Vulparia Rchb., Fuchstod-Eisenhut.

Epipactis, XX. Sumpfwurz.

E. atrorubens Hoffm., schwarzrothe Sumpfwurz.

a) Auf hohen Kalkgebirgen.

Saxifraga, X. Steinbrech.

S. oppositifolia L., paarblättriger, blauer St.

Pedicularis, XIV. Läusekraut.

P. asplenifolia Gloerke, streifenfarnblättriges L.

*b) In Kalkgebirgen auf Bergwiesen und
Weideplätzen.*

(*Ranunculus Thora* s. May S. 265)

c) In Kalkgebirgen an Felsen.

Digitalis, XIV. Fingerhut.

D. grandiflora Lam., grossblumiger Fingerhut.

D. purpurea L., purpurrother Fingerhut.

(*Alyssum montanum*, *Arabis alpina*, *Hippocrepis comosa*
s. May S. 265.)

*d) In Kalkgebirgen an Felsvorsprüngen unter
Gebüsch.*

Echinospermum, V. Igelrüßchen.

E. deflexum Lehm. (*Myosotis deflexa Whlb.*), hänge-
früchtiger Igelsaame, hängefrucht. Vergissmeinnicht.

e) *In Kalkgebirgen auf Gries.*

Arabis alpina (s. oben unter c).

f) *In Kalkgebirgen zwischen üppigem Graswuchs.*
(*Veronica latifolia* s. May S. 266.)

g) *In Kalkgebirgen an schattigen, etwas feuchten Plätzen.*

Aconitum, XIII. Eisenhut.

A. *Myoetionum* *Rchb.*, Mäusetod-Eisenhut.

h) *In Kalkgebirgswäldern.*

Aquilegia, XIII. Akeley.

A. *vulgaris* *L.*, gemeine A., Glockenblume.

i) *In Kalkgebirgen auf Waldwiesen.*

(*Trifolium rubens* s. May S. 266.)

k) *In Kalkgebirgen auf Wiesen.*

(*Orchis fusca* s. May S. 266.)

57) *In Kalkgegenden.*

(*Barkhausia pinguis* s. May S. 266.)

a) *Auf kalkhaltigen Aeckern.*

Sonchus, XIX. Distelsalat.

S. *arvensis* *L.*, Acker-Gänsedistel, Saudistel.

b) *Auf Bergwiesen.*

(*Phyteuma orbiculare* s. May S. 266.)

c) *Auf Kalkhügeln.*

Helianthemum, XII. Ciströschen.

H. *Fumana* *Mill.* (*Cistus Fumana* *Jacq.*), heidekrantblättriges C. oder Sonnenröschen.

Dorycnium, XVII. Bartklee.

D. *pentaphyllum* *Scop.* (*Lotus Dorycnium* *Suffr.*), fünfblättriger Bartklee.

Astragalus, XVII. Traganth.

A. *microphyllus* *L.*, kleinblättriges Wirbelkrt.

Auf Kalkhügeln.

(Globularia cordifolia, Rhamnus saxatilis, Biscutella laevigata, Cytisus austriacus, C. falcatus, Astragalus austriacus, Pinus austriaca s. May S. 267.)

Auf sonnigen Kalkhügeln.

Onosma, V. Lotwurz.

O. echioides L., natterkopffartige Lotwurz.

Linum, V. Lein.

L. tenuifolium L., feinblättriger Lein.

Genista, XVII. Ginster.

G. procumbens W. Kit., liegender Ginster.

Anthyllis, XVII. Wundklee.

A. montana L., Berg-W., Berg-Wollblume.

(Trinia pumila, Dracocephalum austriacum, Ononis Columnae s. May S. 267.)

An steinigen, trocknen Kalkhügeln.

Coronilla, XVII. Kronwicke.

C. vaginalis Lam., scheidige Kronwicke.

An trocknen Kalkhügeln.

(Scleranthus verticillatus, Burgsdorfia montana s. May S. 268.)

Auf waldigen Kalkhügeln.

(Orchis hybrida s. May S. 268.)

58) *Auf Kalkvoralpen.*

Carex, XXI. Riedgras.

C. Mielichhoferi Schk., Mielichhofers Riedgras.

(Trinia glauca, Buphthalmum salicifolium s. May S. 268.)

a) *Auf Kalkvoralpen an feuchten Plätzen.*

(Petasites niveus, Bellidiastrum Michelii s. May S. 268.)

b) *Auf Kalkvoralpen an sonnigen Felsen.*

(Potentilla caulescens s. May S. 268.)

c) *Auf Kalkvoralpen auf Triften.*

Potentilla, XII. Fingerkraut.

P. minima Hall. fil., kleinstes Fingerkraut.

d) *Auf Kalkvoralpen an waldigen Plätzen.*

(*Veronica urticaefolia* s. May S. 269.)

e) *Auf Kalkvoralpen auf Wiesen.*

Bellidiastrum Michellii (s. oben unter a).

f) *In Kalkvoralpengegenden.*

An Bergströmen und Quellen.

Adenostyles, XIX. Drüsengriffel.

A. alpina (*Cacalia alpina* L.), Alpen-Drüsengriffel, Alpenpestwurz.

An Mauern.

Potentilla caulescens (s. oben unter b).

59) *In Kieferwäldungen.*

Monotropa, X. Ohnblatt.

M. Hypopithys L., Fichten-O., Fichten-Spargel, Waldwurz. (Unter *Pinus silvestris*.)

60) *In Lachen.*

(*Callitriche verna* s. May S. 269.)

61) *Auf Lauberde.*

(*Arenaria trinervia* s. May S. 269.)

62) *In Laubwäldern.*

Dactylis, III. Knauelgras.

D. glomerata L., gemeines K., Hundsgras.

Galium, IV. Labkraut.

G. silvaticum L., Wald-Labkraut.

Luzula, VI. Hainsimse.

L. albida De C. (*Juncus pilosus* e. Linn.), weissliche Hainsimse oder Aftersimse.

In Laubwäldern.

Rumex, VI. Ampher.

R. pratensis M. K., Wiesen-Ampher.

Orobus, XVII. Walderbse.

O. tristis Lang.

(Miliun effusum, Melica nutans, Phyteuma spicatum, Campanula Cervicaria, Allium ursinum, Pyrola rosea, Vignea brizoides, Arum maculatum s. May S. 269 f.)

a) *In Laubwäldern an feuchten, schattigen Orten.*

(Ranunculus lanuginosus s. May S. 271.)

b) *In Laubwäldern an grasigen Hügeln und Bergen.*

(Campanula persicifolia, s. May S. 271.)

c) *In Laubwäldern der niedern Gebirge in lockerem, steinigem Boden.*

(Trientalis europaea s. May. S. 271.)

d) *In feuchten Laubwäldern.*

Iris, III. Schwertel.

I. foetidissima L., stinkende Schwertlilie.

(Prunus Padus s. May S. 272.)

In feuchten, schattigen Laubwäldern.

Bromus, III. Trespe.

Br. giganteus L., Riesen-Tr., hohe Wald-Tr.

(Neottia Nidus avis s. May S. 272.)

e) *In lichten Laubwäldern.*

Pyrola, X. Birnkraut.

P. rotundifolia L., rundblättriges Birnkraut od. Wintergrün.

f) *In schattigen Laubwäldern.*

Bromus giganteus (s. oben unter d).

Brachypodium, III. Kurzstielchen.

Br. gracile P. B. (Bromus gracilis Weig.), schlanke Trespe.

In schattigen Laubwäldern.

Mycelis, XIX. Mauersalat.

M. muralis (*Prenanthes muralis* L.), gelber Hasenlattig, Mauersalat, gem. Hasenstrauch.

Neottia Nidus avis (s. oben unter *d*).

Urtica, XXI. Nessel.

U. dioica L., zweihäusige, grosse Brenn-Nessel.

(*Veronica montana*, *Maianthemum bifolium*, *Sanicula europaea*, *Convallaria majalis*, *Paris quadrifolia*, *Pyrola secunda*, *Stellaria nemorum*, *Isopyrum thalictroides*, *Anemone trifolia* s. May S. 272 f.)

g) In trocknen Laubwäldern.

Silene nutans, *Potentilla alba* s. May S. 274.)

63) Auf Lehm Boden.

Spergula, X. Spark.

Sp. vulgaris Bnng., gemeiner Sp., Watergeil.

(*Hieracium Auricula*, *H. Bauhini*, *Potentilla Neumanniana*, *Fragaria collina*, *Myosurus minimus* s. May S. 274.)

Auf lehmhaltigen Aeckern.

Sonchus, XIX. Distelsalat.

S. arvensis L., Acker-Gänsedistel, Saudistel.

64) Auf Leinäckern.

Lolium, III. Lolch.

L. arvense With., Acker-Lolch.

L. robustum Rchb.

Silene, X. Leimkraut.

S. linicola Gm., steifes Leimkraut.

Spergula, X. Spark.

Sp. maxima Weihe, grosser Spark.

Camelina, XV. Dötter.

C. dentata Pers. (*Myagrum dentatum* W.), gezählter Leindotter.

65) *Am südlichen Litorale.*

Schoenus, III. Knopfgras.

Sch. mucronatus *L.*, spitziges Knopfgras.

Phleum, III. Lieschgras.

Phl. tenue *Schrad.*, zartes Lieschgras.

Polypogon, III. Bürstengras.

P. monspeliensis *Desf.* (*Alopecurus monspeliensis L.*), fennichartiger Windhalm.

Brachypodium, III. Kurzstielchen.

Br. Hostii *Lk.* (*Bromus ramosus Host.*), ästige Trespe.

Dactylis, III. Knauelgras.

D. maritima *Suffr.*, Meerstrands-Knauelgras.

D. hispanica *Roth.*, spanisches Knauelgras.

Cerinth, V. Wachsblume.

C. major *L.*, grosse Wachsblume.

Anchusa, V. Ochsenzunge.

A. paniculata *Ait.*, rispenblüthige Ochsenzunge

Convolvulus, V. Winde.

C. siculus *L.*, sicilianische Winde.

Erythraea, V. Tausendguldenkraut.

E. lutea *Bertol.* (*Gentiana pumila Gou.*), gelbes Tausendguldenkraut.

Linum, V. Lein, Flachs.

L. corymbulosum *Rchb.*, doldentraubiger L. od. F.

L. narbonense *L.*, französischer L. oder Flachs.

Asphodelus, VI. Affodill.

A. albus *L.*, weisser Affodill.

Polygonum, VIII. Knöterig.

P. maritimum *L.*, Meerstrands-Knöterig.

Dianthus, X. Nelke.

D. velutinus *Guss.*

Silene, X. Leimkraut.

S. inaperta *L.*, ungeöffnetes Leimkraut.

Am südlichen Litorale.

Euphorbia, XI. Wolfsmilch.

E. Peplis *L.*, Meerstrands-Wolfsmilch.

Delphinium, XIII. Rittersporn.

D. Staphysagria *L.*, scharfer Rittersporn.

Ranunculus, XIII. Ranunkel, Hahnenfuss.

R. ophioglossifolius *Vill.*, natterzungenblättriger
Ranunkel oder Hahnenfuss.

Stachys, XIV. Ziest.

St. spinulosa *Sm.*, stacheliger Ziest.

Micromeria, XIV. Bart-Saturey.

M. Juliana *Benth.* (*Satureja juliana* *L.*), julia-
nisches Pfefferkraut.

Iberis, XV. Schleifenblume.

I. pinnata *Gou.*, gefiederte Schl., gefiederter
Bauernsenf.

Koniga, XV. Koniga.

K. maritima *R. Br.* (*Clypeola maritima* *L.*),
Meerstrands-Felsenkraut.

Rapistrum, XV. Rapsdotter.

R. glabrum *Host.* (*Myagrum*), glatter Rapsdotter.

Genista, XVII. Ginster.

G. sibirica *L.*, sibirischer Ginster.

Lotus, XVII. Hornklee.

L. ciliatus *Ten.*, gefranzter, gewimperter H.

Trifolium, XVII. Klee.

Tr. tomentosum *L.*, filziger Klee.

Pterotheca, XIX. Köchersalat.

Pt. nemausensis *H. Cass.* (*Hieracium sanctum* *L.*),
nimesischer K., leierblättriger Pippau.

Bellis, XIX. Masliebe.

B. silvestris *Cyr.*, wilde Masliebe.

Inula, XIX. Alant.

I. Bubonium *Murr.* (*Inula spiraeifolia* *L.*), knor-
pelartiger Alant.

*Am südlichen Litorale.***Centaurea, XIX. Flockenblume.***C. sordida* W., schmutzige Flockenblume.*C. rupestris* L., Felsen-Flockenblume.**Aristolochia, XX. Osterluzey.***A. Clematitis* L., gemeine O., Fieberwurzel, falsche Hohlwurz.**Andrachne, XXI. Andrachne.***A. telephioides* L., krautartige Andrachne.

(*Phillyrea angustifolia*, *Salvia clandestina*, *S. multifida*, *Fraxinus Ornus*, *Iris pallida*, *Psilurus nardoides*, *Alopecurus utriculatus*, *Phalaris aquatica*, *Echinaria capitata*, *Chilochloa cuspidata*, *Aira capillaris*, *Vulpia Myuros*, *V. uniglumis*, *Bromus confertus*, *Aegilops triaristata*, *A. triuncialis*, *Asterocephalus ucranicus*, *Plantago subulata*, *Vaillantia hispida*, *Anchusa angustifolia*, *A. undulata*, *Lonicera etrusca*, *Rhamnus pumilus*, *Tamarix gallica*, *Linum gallicum*, *Statice angustifolia*, *St. furfuracea*, *St. reticulata*, *Ruta bracteosa*, *Dianthus virgineus* β . *elatior*, *Cistus incanus*, *C. Ledon*, *C. villosus*, *Ranunculus muricatus*, *R. verrucosus*, *Burgsdorfia romana*, *Linaria litoralis*, *Berteroa viridis*, *Peltaria alliacea*, *Erysimum odoratum*, *Pteroneurum maritimum*, *Matthiola incana*, *M. varia*, *Genista tridentata*, *Lathyrus annuus*, *L. cytisoides*, *Trifolium subterraneum*, *Bonaveria securidacea*, *Medicago litoralis*, *M. marina*, *M. mollissima*, *Barkhausia cernua*, *Vignea divisa* s. May S. 274 — 80.)

66) Auf lockerem Boden.

(Arenaria trinervia, Alliaria officinalis s. May S. 280.)

67) An und auf Mauern.**Jasminum, II. Jasmin.***J. officinale* L., gemeiner, gebräuchlicher J.**Centranthus, III. Spornblume.***C. ruber* De C. (*Valeriana rubra* L.), rothe Sp., rother Baldrian.

An und auf Mauern.

Iris, III. Schwertel.

I. sambucina L., fliederduftender Schwertel.

Poa, III. Rispengras.

P. nemoralis L., Hain-Rispengras. *Var. f. Poa coarctata Hall. fil.*

Sclerochloa, III. Hartgras.

Scl. rigida Panz. (*Poa rigida L.*), steifes Rispengras.

Bromus, III. Trespe.

Br. sterilis L., unfruchtbare Trespe.

Hordeum, III. Gerste.

H. murinum L., Mäuse-G., Mauer-G., taube G.

Agropyrum, III. Queckengras.

A. rigidum R. S. (*Triticum rigidum Schrad.*), steifes Queckengras, steifer Weizen.

Parietaria, IV. (XXIII.) Wandkraut, Glaskraut.

P. diffusa M. K. ausgebreitetes, niederliegendes Wandkraut oder Glaskraut.

Hyoscyamus, V. Bilsenkraut.

H. canariensis Ker., canarisches Bilsenkraut.

Verbascum, V. Wollkraut.

V. phlomoides L., windblumenartige Königskerze.

Campanula, V. Glockenblume.

C. pusilla Haenk., kleine Glockenblume.

Sedum, X. Fetthenne.

S. acre L., scharfer Knörpel oder Mauerpfeffer.

S. album L., weisser Knörpel oder Tripmadam.

S. anglicum L., *Huds.*, englischer Knörpel.

S. annuum L., einjähriger Knörpel.

S. boloniense Lois., boulogner Knörpel.

S. dasyphyllum L., bereifter Knörpel.

S. hispanicum L., spanischer Knörpel.

S. purpureum Andr. (*Sedum Telephium β. purpureum L.*), purpurrother Knörpel.

S. sexangulare L., sechseckiger Knörpel.

An und auf Mauern.

Sedum Telephium L., breitblättriger Knörpel,
fette Henne, Bohnen-Fetthenne, Schmeerwurz.

Cerastium, X. Hornkraut.

C. triviale Lk. (*Cerastium viscosum* α. L.),
gemeines, klebriges Hornkraut.

Lychnis, X. Lichtnelke.

L. dioica L. (*Lychnis vespertina* Sibth.), Wiesen-
Lichtröschen, Abend-L., weisses Marienröschen.

Potentilla, XII. Fingerkraut.

P. argentea L., silberweisses Fingerkraut.

Nepeta, XIV. Katzenmünze.

N. citriodora Balb., citronenduftige K.

Hyssopus, XIV. Ysop.

H. officinalis L., gemeiner Hysop oder Ysop.

Antirrhinum, XIV. Löwenmaul.

A. majus L., grosses L., grosser Dorant.

Erysimum, XV. Hederich.

E. virgatum Rth., ruthenförmiger Hederich.

Sisymbrium, XV. Rauke.

S. polyceratum L., vielschotige Rauke.

Diplotaxis, XV. Rampe.

D. tenuifolia De C. (*Sisymbrium tenuifolium* L.),
dünnblättrige Rampe oder Rauke.

Hieracium, XIX. Habichtskraut.

H. Lachenalii Gmel., Lachenals-Habichtskraut.

H. saxatile Jacq., Stein-Habichtskraut.

Mycelis, XIX. Mauer-Salat.

M. muralis Rchb. (*Prenanthes muralis* L.), gelber
Hasenlattig, Mauer-Salat, gem. Hasenstrauch.

Crepis, XIX. Pippau.

Cr. tectorum L., Dach-Pippau.

Chondrilla, XIX. Knorpelsalat.

Ch. juncea L., binsenartiger Knorpelsalat, gelbe
Wegwarte, gelber Sonnenwirbel.

*An und auf Mauern.***Senecio, XIX. Kreuzkraut.***S. rupestris W. Kit.*, Felsen-Kreuzkraut.*S. squalidus L.*, schmutziges Kreuzkraut.*S. viscosus L.*, klebriges Kreuzkraut.**Diplopappus, XIX. Doppelkrone.***D. annuus H. Cass.* (*Aster annuus L.*), jährige Doppelkrone oder Aster oder Sternblume.**Urtica, XXI. Nessel.***U. urens L.*, kleine Brenn-Nessel.**Andrachne, XXI. Andrachne.***A. telephioides L.*, krautartige Andrachne.

(*Veronica arvensis*, *Iris germanica*, *Vulpia pseudomyuros*, *V. sciuroides*, *Bromus madritensis*, *Br. mollis*, *Br. tectorum*, *Lagurus ovatus*, *Moenchia erecta*, *Cynoglossum officinale*, *Campanula rotundifolia*, *Roucela Erinus*, *Sambucus nigra*, *Sternbergia lutea*, *Gypsophila rigida*, *Chelidonium majus*, *Capparis spinosa*, *Linaria Cymbalaria*, *Camelina microcarpa*, *Alyssum calycinum*, *Berteroa incana*, *Lepidium campestre*, *L. ruderales*, *Erysimum diffusum*, *E. repandum*, *Brassica cheiranthiflora*, *Sisymbrium Columnae*, *S. Irio*, *S. Loeselii*, *S. multisiliquosum*, *S. officinale*, *S. Sophia*, *Diplotaxis muralis*, *Cheiranthus Cheiri*, *Erodium malacoides*, *Geranium lucidum*, *G. molle*, *G. pusillum*, *Corydalis lutea*, *Hieracium collinum*, *H. fallax*, *H. murorum*, *H. obscurum*, *H. praealtum*, *Erigeron acris* s. May S. 280 — 84.)

68) Am Meerstrande.**Veronica, II. Ehrenpreis.***V. maritima L.*, Meerstrands-Ehrenpreis.**Heleogiton, III. Grundbinse.***H. glaucum Rchb.* (*Scirpus glaucus Sm.*), blaugrüne Grundbinse.**Phleum, III. Lieschgras.***Phl. arenarium L.*, Sand-Lieschgras.**Elymus, III. Haargras.***E. arenarius L.*, Sand-H., Sandhafer, Helm, Rothwurz.

*Am Meerstrande.***Agropyrum, III. Queckengras.**

A. acutum R. S. (*Triticum acutum* De C.), spitziges Queckengras, spitziger Weizen.

A. glaucum R. S. (*Triticum glaucum* Desf.), blaugrünes Queckengras, blaugrüner Weizen.

A. pungens R. S. (*Triticum pungens* α. Pers.), stechendes Queckengras, stechender Weizen.

Plantago, IV. Wegerich.

Pl. maritima L., Meerstrands Wegerich. β. *squamata* und γ. *genuina*.

Linum, V. Lein, Flachs.

L. angustifolium Huds., schmalblättriger Lein.

Silene, X. Leimkraut.

S. maritima With. (*Cucubalus Behen.* Var. L.), Meerstrands-Leimkraut. (An Felsabhängen.)

Glaucium, XIII. Hornmohn.

Gl. luteum Scop. (*Chelidonium Glaucium* L.), gelber Hornmohn.

Orobus, XVII. Walderbse.

O. maritimus Rchb. (*Pisum maritimum* L.), Meerstrands-W., Meerstrands-Erbse.

Littorella, XXI. Strändling.

L. lacustris L., gemeiner Strändling.

Carex, XXI. Riedgras.

C. extensa Good., ausgedehntes R. (An Gräben.)

(*Festuca glauca*, *Lepturus incurvatus*, *Hordeum maritimum*, *Sagina procumbens*, *Steenhammeria maritima*, *Glaux maritima*, *Polygonum aviculare*, *Honckenia peploides*, *Cochlearia officinalis*, *Vignea divisa* s. May S. 284 f.)

a) *Am nördlichen Meerstrande.***Blysmus, III. Quellriet.**

Bl. rufus Panz. (*Scirpus rufus* Schrd.), braune Binse.

Juncus, VI. Simse.

J. maritimus Lam., Meerstrands-Simse.

Am nördlichen Meerstrande.

Anthyllis, XVII. Wundklee.

A. maritima Schægg., Meerstrands-Wundklee.

(*Hippuris maritima*, *Lepturus filiformis*, *Rosa baltica*, *Cochlearia anglica*, *Crambe maritima*, *Vignea salina*, siehe May S. 285.)

b) Am südlichen Meerstrande.

Spartina, III. Besengras.

Sp. stricta Rth. (*Dactylis stricta* Sol.), steifes

B. oder Knauelgras. (Auf Schlamm.)

Linum, V. Lein, Flachs.

L. strictum L., steifer Lein.

Euphorbia, XI. Wolfsmilch.

E. myrsinites L., südliche Wolfsmilch.

E. Paralias L., dickblättrige Wolfsmilch.

(*Lepturus cylindricus*, *Linum maritimum* s. May S. 285.)

69) Auf Mergelboden.

(*Trifolium striatum*, s. May S. 286.)

Auf Mergelschiefer.

(*Sabulina cespitosa* s. May S. 286.)

70) Auf Moorboden.

Schoenus, III. Knopfgras.

Sch. nigricans L., schwärzliches Knopfgras.

Blysmus, III. Quellriet.

Bl. compressus Panz. (*Schoenus compressus* L.,

Carex uliginosa L.), zusammengedrücktes

Knopfgras, seggenartige Binse.

Eriophorum, III. Wollriet.

E. alpinum L., Alpen-Wollgras.

Calamagrostis, III. Reithgras.

C. silvatica P. B. (*Agrostis arundinacea* L.),

rohrartiger Windhalm.

Auf Moorboden.

Aira, III. Schmiele.

A. cespitosa L., Rasen-Schmiele, Glanz-Schm.

Galium, IV. Labkraut.

G. boreale L., nördliches Labkraut.

Cornus, IV. Hornstrauch.

C. suecica L., schwedischer H. oder Hartriegel.

Tofieldia, VI. Tofieldie.

T. calyculata *Wahlb.* (*Anthericum calyculatum* L.), kelchfrüchtige Liliensimse.

Triglochin, VI. Dreizack.

Tr. palustre L., Sumpf-Dreizack.

Calla, VII. Schlangenkraut.

C. palustris L., Sumpf-Schl., Sumpf-Drachenzur, Wasser-Aron, rother Wasserpfeffer.

Thalictrum, XII. Wiesenraute.

Th. angustifolium L., schmalblättrige W. (Vorzüglich in Gebirgsgegenden auf Ebenen.)

Alectrolophus, XIV. Hahnenkamm.

A. major *Rchb.* (*Rhinanthus Crista galli* L.), grosser H., Ackerklapper, Ackerrodel.

Geracium, XIX. Sperberkraut.

C. paludosum (*Hieracium paludosum* L.), Sumpfsperberkraut, Sumpf-Habichtskraut.

Arnica, XIX. Wolverley, Wohlverleib.

A. montana L., Berg-W., ächte, wahre W.

Inula, XIX. Alant.

I. salicina L., weidenartiger Alant.

Herminium, XX. Herminium.

H. Monorchis *R. Br.* (*Ophrys monorchis* L.), einknollige Ragwurz.

Carex, XXI. Riedgras.

C. extensa *Good.*, ausgedehntes Riedgras.

(*Pinguicula flavescens*, *P. vulgaris*, *Chaetospora ferruginea*, *Limnochloa cespitosa*, *Eriophorum triquetrum*, *E. va-*

Auf Moorboden.

ginatum, *Poa pratensis*, *Hydrocotyle vulgaris*, *Convallaria multiflora*, *Scheuchzeria palustris*, *Vaccinium uliginosum*, *Polygonum Bistorta*, *Ledum palustre*, *Rubus Chamaemorus*, *Comarum palustre*, *Vignea acuta*, *Alnus viridis*, *Salix ambigua* s. May S. 286 ff.)

a) *Auf Moorboden in Heidewaldungen.*

(*Genista anglica* s. May S. 288.)

b) *Auf Moorboden in Sümpfen.*

Utrieularia, II. Wasserschlauch.

U. minor L., kleiner Wasserschlauch.

c) *Auf Moorboden der Voralpen.*

(*Primula farinosa* s. May S. 288.)

d) *Auf Moorboden in Waldgebüsch.*

Geum, XII. Benediktenkraut.

G. intermedium Ehrh., Bastard-Benediktenkraut.

G. rivale L., Bach-Benediktenkraut, Wasser-B.,
Bach-Nelkenwurz, Wasser-Nelkenwurz.

e) *Auf Moorboden an Wiesengräben.*

Nasturtium, XV. Brunnenkresse.

N. microphyllum Bnnggh., kleinblättrige Br.

f) *Auf festem Moorboden.*

Myosotis, V. Vergissmeinnicht.

M. strigulosa Rchb., gestriegeltes Vergissm.

g) *Auf schwammigem Moorboden in Heidewäldern.*

Polygala, XVII. Kreuzblume.

P. serpyllacea Weih., quendelartige Kreuzbl.

h) *Auf Moorbrüchen.*

Listera, XX. Listere.

L. cordata R. Br. (*Ophrys cordata* L.), herzblättrige Ragwurz.

(*Oxycoccus palustris* s. May S. 288.)

i) *Auf Moorgrund.***Betula, XXI.** Birke.

B. nana L., Zwerg-Birke.

(Salix myrtilloides s. May S. 289.)

*Auf Moorgrund oberhalb der Alpentriften.***Pinus, XXI.** Kiefer.

P. Mughus Scop., Berg-Fichte.

k) *Auf Moorwiesen.***Oenanthe, V.** Rebendolde.

O. fistulosa L., röhrlige R., Drüswurz, Tropfwurz.

Juncus, VI. Simse.

J. squarrosus L., sparrige Simse.

Orchis, XX. Knabenkraut.O. latifolia L., breitblättriges Kn., Händlein-
wurz, rother Wiesen-Kuckuck.

(Stellaria glauca, Ranunculus Flammula s. May S. 289.)

71) *Auf Moos in schattigen Waldungen.***Tormentilla, XII.** Tormentille.

T. reptans L., kriechende Rothwurz.

72) *Auf Morast.***Heliosciadium, V.** Sumpfdoldchen.H. inundatum Koch. (Sium inundatum Roth.),
Wasser-Sumpfdoldchen.(Eriophorum triquetrum, E. vaginatum, Scheuchzeria
palustris, Carex leucoglochis, C. limosa s. May S. 289.)73) *In Nadelwäldern.***Pyrola, X.** Birnkraut.

P. media Sw., mittleres Birnkraut.

(Aira flexuosa, Festuca ovina, Galium rotundifolium,
Vaccinium Myrtillus, Daphne Cneorum, Arctostaphylos Uva
ursi s. May S. 290.)

a) *An Nadelwäldern auf schattigen Abhängen.*

Hypericum, XVII. Hartheu.

H. pulchrum L., hübsches Johanniskraut.

b) *In Nadelwäldern an Hügeln.*

(*Genista sagittalis* s. May S. 290.)

c) *In trocknen Nadelwäldern.*

(*Silene nutans* s. May S. 291.)

74) *Auf nassem Boden.*

Hordeum, III. Gerste.

H. pratense Huds., Wiesen-Gerste.

Vignea, XXI. Segge.

V. acuta (*Carex acuta L.*), spitzige Segge, spitziges Riedgras, Schnittgras, Sauergras, Leuchel, Eisenpäther.

Carex, XXI. Riedgras.

C. Buxbaumii Wahlb., Buxbaums-Riedgras.

An nassen, sumpfigen Stellen.

Carex Pseudo-Cyperus L., Cyper-Riedgras, falsches Cypergras.

75) *In Obstgärten.*

Leucoium, VI. Knotenblume.

L. aestivum L., Sommer-Knotenblume.

76) *In Olivengärten.*

(*Phalaris paradoxa*, *Lagurus ovatus*, *Imperata cylindrica*, *Arthrolobium scorpioides* s. May S. 291 f.)

77) *In Pfützen.*

Callitriche, I. Wasserstern.

C. verna L., Frühlings-Wasserstern.

C. stagnalis Scop., Sumpf-Wasserstern.

In Pfützen.

Potamogeton, IV. Laichkraut.
P. gramineus L., grasartiges L. oder Saamkraut.
δ. latifolius.

An Pfützen.

Juncus, VI. Simse.
J. compressus Jacq., knollige Simse.

78) *An Planken.*

Bromus, III. Trespe.
Br. sterilis L., unfruchtbare Trespe.
Hordeum, III. Gerste.
H. murinum L., Mäuse-Gerste, Mauer-Gerste,
 taube Gerste.
 (Geranium molle, G. pusillum s. May S. 292.)

79) *An Quellen.*

Veronica, II. Ehrenpreis.
V. Beccabunga L., Quellen-E., Bachbungen,
 Wasser-Salat.
Chaerophyllum, V. Kälberkropf.
Ch. Cicutaria Vill., schierlingsartiger K.
Geranium, XVI. Storchschnabel.
G. palustre L., Sumpf-Storchschnabel.
 (Chrysosplenium oppositifolium, Nasturtium officinale,
 Cardamine amara s. May S. 292.)

a) *An Quellen in Gebirgsthälern.*

Ranunculus, XIII. Ranunkel, Hahnenfuss.
S. aconitifolius L. β . *R. platanifolius L.*, pla-
 tanenblättriger Ranunkel oder Hahnenfuss.
 (Ephemerum nemorum s. May S. 292.)

b) *An Quellen in Voralpen.*

Cirsium, XIX. Kratzdistel.
C. rivulare Rchb. (*Carduus rivularis Jacq.*),
 Bach-Kratzdistel.

c) *An Quellen zwischen Waldgebüsch in Berg-
gegenden.*

(*Thalictrum aquilegifolium* s. May S. 292.)

d) *An quelligen Orten.*

(*Montia fontana*, *Larabrea uliginosa* s. May S. 293.)

80) *Auf Ruinen.*

Antirrhinum, XIV. Löwenmaul.

A. majus L., grosses L., grosser Dorant.

(*Festuca glauca*, *Dianthus Caryophyllus*, *Geranium macrorrhizon*, *G. robertianum*, *Corydalis lutea* s. May S. 293.)

81) *Auf Saatäckern.*

Galium, IV. Labkraut.

G. spurium L., Bastard-Labkraut.

Prismatocarpus, V. Venusspiegel.

Pr. Speculum L. *Herit.* (*Campanula Speculum* L.),
Spiegel-Glockenblume, Frauenspiegel.

Linum, V. Lein, Flachs.

L. usitatissimum L., gemeiner Lein od. Flachs.

Silene, X. Leimkraut.

S. anglica L., englisches Leimkraut.

Neslia, XV. Neslie.

N. paniculata Deso. (*Myagrum paniculatum* L.),
rispenblüthiger Dotter, kleiner Leindotter.

Lathyrus, XVII. Platterbse.

L. Aphaca L., Acker-Pl., blattlose Platterbse.

Vicia, XVII. Wicke.

V. cordata Wulff., herzförmige Wicke.

(*Bromus commutatus*, *Br. patulus*, *Scleranthus annuus*,
Bunias Erucago, *Conringia austriaca* s. May S. 293 f.)

Unter der Saat von Kohlgewächsen.

Silene, X. Leimkraut.

S. noctiflora L., nachtblühendes, nächtliches L.

Unter der Saat auf Sandfeldern.

Hypochaeris, XIX. Ferkelkraut.

H. glabra L., glattes Ferkelkraut.

82) An Salinen und auf Salzboden.

a) An Salinen.

Glyceria, III. Schwaden, Mannagras.

Gl. festucaeformis Hayne (*Poa festucaeformis Host.*), schwingelförmiges Mannagras oder Rispengras.

Hordeum, III. Gerste.

H. pratense Huds., Wiesen-Gerste.

Plantago, IV Wegerich.

Pl. maritima L., Meerstrands-W. *α. leptophylla*.

Lepidium, XV. Kresse.

L. latifolium L., breitblättrige Kresse oder Pfefferkraut.

(*Hippuris vulgaris*, *Glaux maritima*, *Polygonum aviculare* *δ. polycnemum* s. May S. 294.)

b) Auf Salzboden.

Peucedanum, V. Haarstrang.

P. officinale L., gemeiner H., Schwefelwurz.

Triglochin, VI. Dreizack.

Tr. maritimum L., Meerstrands-Dreizack.

Carex, XXI. Riedgras.

C. extensa Good., ausgedehntes Riedgras (Am Meerstrande.)

(*Glyceria distans*, *Samolus Valerandi*, *Tetragonolobus siliquosus* s. May S. 294.)

Auf sehr dürrem Salzboden.

Polygonum aviculare *δ. polycnemum* (s. oben).

An salzigen, sumpfigen Orten.

(*Cochlearia officinalis* s. May S. 295.)

81) *Im Sand, auf Sandplätzen u. dergl.*a) *Im Sande.***Plantago**, IV. Wegerich.

Pl. major L., grosser Wegerich.

Hypocnemis, IV. Lappenblume.

H. litorale L., Meerstrands-Lappenblume. (Am adriatischen Meere.)

Verbascum, V. Wollkraut.

V. Blattaria L., Motten-Königskerze.

Herniaria, V. Bruchkraut.

H. incana Lam., graues Bruchkraut.

Drypis, V. Stechmiere.

D. spinosa L., dorniges Kronenkraut.

Silene, X. Leimkraut.

S. gallica L., französisches L. (In Berggegenden.)

Spergula, X. Spark.

Sp. vulgaris Benth., gemeiner Sp., Watergeil.

Thymus, XIV. Thymian, Quendel.

Th. angustifolius Schreb., schmalblättriger T. od. Q.

Orobancha, XIV. Ervenwürger.

O. arenaria Brkh., Sand-Ervenwürger. (Auf Artemisia campestris.)

(Veronica arvensis, Campanula sibirica, Reseda lutea, Thalictrum flexuosum s. May S. 295.)

b) *Auf Sandäckern.***Sagina**, IV. Mastkraut.

S. depressa Schulz.

Chondrilla, XIX. Knorpelsalat.

Ch. acanthophylla Borkh., bärenklaublättriger K.

(Sagina apetala, Silene conica s. May S. 295 f.)

c) *Auf sonnigen Sandbergen.***Centaurea**, XIX. Flockenblume.

C. stricta W. K., steifaufrechte Flockenblume.

d) *Auf Sandboden.*

Lappago, III. Klettengras.

L. racemosa W. (*Cenchrus racemosus L.*),
traubenblüthiges Stachelgras.

Corynephorus, III. Keulengras.

C. canescens P. B. (*Aira canescens L.*), graue
Schmiele, Silbergras, Bocksbart.

Arrhenaterum, III. Mann-Grannengras.

A. avenaceum P. B. Var. *b. nodosum* (*Avena
bulbosa W.*), zwiebeltragender Hafer.

Verbascum, V. Wollkraut.

V. ramigerum Lk., ästiges W. (An Flussufern.)

Monotropa, X. Ohnblatt.

M. Hypopithys L., Fichten-Ohnblatt, Fichten-
spargel, Waldwurz. (An schattigen Orten
unter *Pinus silvestris*.)

Dianthus, X. Nelke.

D. diminutus L., kleinblüthige N. (In Wäldern.)

Scleranthus, X. Knauel.

Scl. perennis L., Winter-Kn., Sandknörich.

Silene, X. Leimkraut.

S. Armeria L., Garten-Silene, Morgenröschen.
(An Felsen, Wald- und Ackerrändern.)

Spergula, X. Spark.

Sp. arvensis L., Acker-Spark, Futter-Spark.

Potentilla, XII. Fingerkraut.

P. Wiemanniana Günth. et Schumm., Wieman-
nisches Fingerkraut.

Papaver, XIII. Mohn.

P. Argemone L., Sand-M., keulenförmiger M.

P. Rhoeas L., Acker-Mohn, gemeine Klatschrose.

Glaucium, XIII. Hornmohn.

Gl. corniculatum P. (*Chelidonium cornicula-
tum L.*), bleichrother Hornmohn

Auf Sandboden.

Geranium, XVI. Storchschnabel.

G. sanguineum L., blutrother St., rothe Hühnerwurz, Blutkraut. (In felsigen Wäldern.)

Ononis, XVII. Hauhechel.

O. repens L., kriechende Hauhechel.

Vicia, XVII. Wicke.

V. angustifolia Rto. (*Vicia sativa* β . *nigra L.*), schmalblättrige Wicke.

V. cassubica L., cassubische W. (In Bergwäldern.)

V. tenuifolia Rth., feinblättrige Wicke.

Coronilla, XVII. Kronwicke.

C. varia L., bunte Kresse, Schaaflinse.

Andrachne, XXI. Andrachne.

A. telephioides L., krautartige Andrachne.

(*Nardus stricta*, *Sclerochloa dura*, *Galium pedemontanum*, *Herniaria glabra*, *Alsine rubra*, *Rumex Acetosella*, *Dianthus Armeria*, *Euphorbia Gerardiana*, *Ranunculus illyricus*, *Neslia paniculata*, *Astragalus Cicer*, *Ornithopus intermedius*, *O. perpusillus*, *Hieracium Auricula*, *Tragopogon floccosus*, *Scorzonera glastifolia*, *Vignea divisa*, *Pinus silvestris* s. May S. 296 ff.)

Auf sandigem Boden grosser Teiche und Landseen.

Sabulina, XV. Pfriemenkresse.

S. aquatica L., Wasser-Pfriemenkresse.

Auf bebautem, sandigen Boden.

Iberis, XV. Schleifenblume.

I. amara L., bittere Schl. oder Zungenblume, bitterer Bauernsenf.

Auf dürrem Sandboden.

Eragrostis, III. Liebesgras.

E. poaeformis Lk. (*Poa Eragrostis L.*), schönes Rispengras.

Auf feuchtem Sandboden.

Juncus, VI. Simse.

J. alpinus Vill., Alpen-Simse.

J. supinus Mnch. (*Juncus bulbosus L.*), knollige Simse.

(*Carex secalina* s. May S. 298.)

Auf steinigem, sandigen Boden.

Silene, X. Leimkraut.

S. inflata Sm., aufgeblasenes Leimkraut. In Gebirgen und Alpen die Varietäten *A. glabra* α . *S. vesicaria Schrad.*, β . *glauca* und ϵ . *chlorophylla*.

Auf trockenem Sandboden.

Plantago, IV. Wegerich:

Pl. maritima L., Meerstrands-W. α . *leptophylla*.

Asperula, IV. Waldmeister.

A. cynanchica L., Hügel-W., Bräunewurzel.

Auf trockenem, steinigem, sandigen Boden.

(*Trifolium repens* s. May S. 298.)

Auf überschwemmtem Sandboden.

Juncus (s. oben) *Tenageia Ehrh.*, Sandsimse.

Littorella, XXI. Strändling.

L. lacustris L., gemeiner Strändling.

Auf unfruchtbarem Sandboden.

Polycnemon, III. Knorpelkraut.

P. arvense L., gemeines Knorpelkraut.

(*Teesdalia nudicaulis* s. May S. 298.)

e) *Auf Sandebenen.*

Elymus, III. Haargras.

E. arenarius L., Sand-Haargras, Sandhafer, Helm, Rothwurzel.

*Auf Sandebenen.***Oenothera**, VIII. Nachtkerze.*O. biennis* L., gemeine N., gelbe Rapunzel, Rhapontica.**Orobanche**, XIV. Ervenwürger.*O. variegata* Wallr., bunter Ervenwürger. (Auf *Spartium scoparium*.)**Hypochaeris**, XIX. Ferkelkraut.*H. radicata* L., grosses, langwurzelliges F.(Sabulina viscosa, *Spartium scoparium*, *Carex hirta*, *C. Oederi* s. May S. 298.)f) *Auf Sandfeldern.***Hypochaeris** (s. oben) *glabra* L., glattes Ferkelkraut. (Unter der Saat.)(Koeleria glauca, *Festuca glauca* s. May S. 298 f.)g) *An sonnigen Sandfelsen.*(Ornithogalum comosum, *Sabulina verna*, *Hypericum elegans* s. May S. 299.)h) *Auf Sandgebirgen zwischen üppigem Graswuchse.*

(Veronica latifolia, s. May S. 299.)

i) *In Sandgegenden.***Calamagrostis**, III. Reithgras.*C. laxa* Host. (*Arundo Pseudophragmitis* Hall. fil.), schlaffes Reithgras, unächttes Rohr. (An Flussumfern.)**Agropyrum**, III. Queckengras.*A. intermedium* Rchb. (*Triticum intermedium* Host.), mittleres Queckengras. (An trocknen, steinigen Orten.)**Porrum**, VI. Porrey.*P. arenarium* (*Allium arenarium* L.), Sand-Lauch.

In Sandgegenden.

Oenothera, VIII. Nachtkerze.

O. biennis L., gemeine N., gelbe Rapunzel,
Rhapontica.

Thymus, XIV. Thymian, Quendel.

Th. angustifolius Schreb., schmalblättriger Thymian oder Quendel.

Th. Serpyllum L., Feld-Th., Feldpoley, Quendel.

Astragalus, XVII. Traganth.

A. arenarius L., Sand-Wirbelkraut.

(*Vaccinium* *Vitis idaea*, *Rubus fruticosus*, *R. suberectus* siehe May S. 299. — *Berteroa incana* s. May S. 300.)

*In Sandgegenden, welche im Winter vom
Secwasser überschwemmt sind.*

Agropyrum, III. Queckengras.

A. strictum Richb. (*Triticum strictum* Dethard.),
steifes Queckengras.

In sandigen Gegenden an Teichrändern.

Potentilla, XII. Fingerkraut.

P. norvegica L., norwegisches Fingerkraut.

In trocknen Sandgegenden.

(*Agropyrum cristatum* s. May S. 300.)

k) *Auf Sandhügeln.*

Agropyrum (s. oben) *glaucum* R. S. (*Triticum
glaucum* Deof.), blaugrünes Queckengras,
blaugrüner Weizen.

Chenopodium, V. Gänsefuss.

Ch. Botrys L., traubiger G., Traubenkraut.

Berteroa incana (s. oben).

Rapistrum, XV. Rapsdotter.

R. hirtum Host. (*Myagrum*)

Oxytropis, XVII. Spitzfahne.

O. pilosa De C. (*Astragalus pilosus* L.), haarige
Spitzfahne, haariges Wirbelkraut.

*Auf Sandhügeln.***Taraxacum, XIX.** Pfaffenröhrlein.**T. serotinum** *Rchb.* (*Leontodon serotinus* *W.K.*), spätes Pf., später Löwenzahn.

(Agropyrum intermedium, Daphne Cneorum, Biscutella laevigata, Astragalus austriacus s. May S. 300.)

*An sonnigen Sandhügeln.***Linum, V.** Lein, Flachs.**L. tenuifolium** *L.*, feinblättriger Lein oder Fl.*Auf trocknen Sandhügeln.*

(Burgsdorfia montana s. May S. 300.)

1) *Auf Sandplätzen.***Phleum, III.** Lieschgras.**Phl. arenarium** *L.*, Sand-Lieschgras.**Eragrostis, III.** Liebesgras.**E. megastachya** *Lk.* (*Briza Eragrostis* *L.*), grossähriges Rispengras.**Verbascum, V.** Wollkraut.**V. Thapsus** *L.*, gemeines W., gemeine, gelbe Königskerze, Wollblume.**V. thapsoides** *L.*, schmalblättrige Königskerze.**Chondrilla, XIX.** Knorpelsalat.**Ch. rigens** *Rchb.*, starrer Knorpelsalat.**Senecio, XIX.** Kreuzkraut.**S. rupestris** *W.Kit.*, Felsen-Kreuzkraut.

(Aira caryophylla, Koeleria cristata, Festuca valesiaca, Vulpia pseudomyuros, V. sciuroides, Vaillantia muralis, Moenchia erecta, Alyssum minimum s. May S. 300 f.)

Auf feuchten Sandplätzen.

(Carex tomentosa s. May S. 301.)

*An sandigen, steinigen Orten.***Anchusa, V.** Ochsenzunge.**A. leptophylla** *R. S.* kleinblättrige Ochsenzunge.

An sandigen, steinigen Orten.

Senecio, XIX. Kreuzkraut.

S. abrotanifolius L., stabwurzblättriges Kr. (In Kalkalpengegenden.)

(*Matthiola varia* s. May S. 301.)

An sandigen, trocknen Stellen.

Festuca, III. Schwingel.

F. amethystina Host., violetter Schwingel.

m) *An sonnigen Sandsteinbergen.*

Linum, V. Lein, Flachs.

L. hirsutum L., haariger Lein oder Flachs.

(*Campanula sibirica* s. May S. 302.)

n) *Auf Sandstrecken.*

Dianthus, X. Nelke.

D. arenarius L., Sand-Nelke.

(*Ajuga montana* s. May S. 302.)

o) *An sandigen Ufern.*

Armeria vulgaris s. May S. 301.)

p) *Auf feuchten Sandwiesen.*

Astragalus, XVII. Traganth.

A. asper Jacq., scharfes Wirbelkraut.

S4) *An schattigen Orten.*

Monotropa, X. Ohnblatt.

M. Hypopithys L., Fichten-Ohnblatt, Fichten-spargel, Waldwurz. (Unter *Pinus silvestris* und *Fagus silvatica*.)

Geum, XII. Benediktenkraut.

G. rivali-urbanum Rchb.

(*Veronica prostrata*, *Myosotis sparsiflora*, *Chaerophyllum temulum*, *Oxalis stricta*, *Alliaria officinalis*, *Geranium pyrenaicum* s. May S. 302.)

a) *Auf schattigen Plätzen an Felsen.*

(*Geranium lucidum* s. May S. 302.)

b) *An schattigen Orten in Gebirgswäldern.*

(*Asperula odorata* s. May S. 302.)

c) *An schattigen Orten in Wäldern.*

Geum, XII. Benediktenkraut.

G. urbanum L., wahres Benediktenkraut, gemeine Nelkenwurz.

d) *An schattigen, feuchten Orten.*

Festuca, III. Schwingel.

F. arundinacea Schreb., rohrartiger, hoher Schw.

Rubus, XII. Himbeere, Brombeere.

R. caesius L., kriechende, blaue Br., Bocksbere
α. umbrosus.

Aconitum, XIII. Eisenhut.

A. Myoetionum Rch., Mäusetod-E. (In Kalkgebirgen.)

Lepidium, XV. Kresse.

L. latifolium L., breitblättrige Kr. od. Pfefferkraut.

Geranium, XVI. Storchschnabel.

G. palustre L., Sumpf-Storchschnabel.

An schattigen, steinigen Orten.

(*Geranium robertianum* s. May S. 303.)

An schattigen, waldigen Orten.

(*Cardamine silvatica* s. May S. 303.)

S5) *Auf Schiefergebirge.*

Pedicularis, XIV. Läusekraut.

P. asplenifolia Floerke, streifenfarnblättriges L.

S6) *Auf Schlamm.*

Holoschoenus, III. Kugelriet.

H. Linnaei Rchb. (*Scirpus Holoschoenus* L.), knopfgrasartige Binse. (Auf Schlammboden, welcher im Sommer trocken ist.)

Auf Schlamm.

Spartina, III. Besengras.

Sp. stricta Rth. (*Dactylis stricta Sol.*), steifes Besengras oder Knauelgras. (Auf Schlamm am Seestrande.)

87) *Schmarotzend.*

Orobanche, XIV. Ervenwürger.

O. arenaria Brkh, Sand-E., Sand-Sommerwurz. (Auf *Artemisia campestris*.)

O. coerulea Vill., blauer E., blaue Sommerwurz. (Auf *Artemisia vulgaris*) und Var. *Orobanche Millefolii Rchb.* (Auf *Achillea Millefolium*.)

O. coerulescens Steph., bläulicher E., bläuliche Sommerwurz. (Auf *Medicago falcata*.)

O. elatior Sutt., hoher E., hohe Sommerwurz. (Auf *Medicago falcata* und *sativa*.)

O. Galii Dub., Labkraut-E., Labkraut-Sommerwurz. (An *Galium Mollugo*.)

O. gracilis Sm., schlanker E., schlanke Sommerwurz. (An *Lotus corniculatus* und *siliquosus*, *Hippocrepis comosa* u. *Dorycnium herbaceum*.)

O. ramosa L., ästiger E., ästige Sommerwurz, Hanfwürger. (Auf *Cannabis sativa* und *Nicotiana Tabacum*.)

O. Rapum Thuill. (Auf *Genista tinctoria* und *Spartium scoparium*.), rettigknolliger E.

O. variegata Wallr., bunter Ervenwürger. (Auf *Spartium scoparium*.)

88) *Auf Schutt.*

Salvia, II. Salbey.

S. Aethiopis L., ungarische Salbey.

*Auf Schutt.***Echium, V.** Natterwurz.E. vulgare *L.*, gemeiner Natterkopf.E. Wierzbeckii *Habrl.*, Wierzbecks Natterwurz.**Verbascum, V.** Wollkraut.V. pulverulentum *Vill.*, bestäubte Königskerze.V. sinuatum *Lam.*, buchtigblättrige Königskerze.V. Thapsus *L.*, gemeines Wollkraut, gemeine, gelbe Königskerze, Wollblume.V. thapsoides *L.*, schmalblättrige Königskerze.**Solanum, V.** Nachtschatten.S. nigrum *L.*, schwarzer Nachtschatten.**Physalis, V.** Schlutte.Ph. Alkekengi *L.*, gemeine Schl. od. Judenkirsche.**Conium, V.** Schierling.C. maculatum *L.*, gefleckter Sch., Garten-Sch.**Aethusa, V.** Gleise.A. Cynapium *L.*, gemeine Gl., kleiner Schierling, Hundspetersilie.**Foeniculum, V.** Fenchel.F. officinale *All.* (*Anethum Foeniculum L.*), gemeiner, grosser, süsser Fenchel.**Anthriscus, V.** Klettenkerbel.A. vulgaris *Pers.* (*Scandix Anthriscus L.*), gemeiner Klettenkerbel.**Rumex, V.** Ampfer.R. pulcher *L.*, schöner Ampfer.**Tribulus, X.** Burzeldorn.Tr. terrestris *L.*, gemeiner Burzeldorn.**Silene, X.** Leimkraut.S. inflata *Sm.*, aufgeblasenes L. Var. A. glabra
γ. oleracea *Fic.***Reseda, XI.** Wau.R. Luteola *L.*, gelblicher Wau, Färber-Wau, Gilbkraut.

*Auf Schutt.***Agrimonia, XI.** Odermennig.A. Eupatorium *L.*, gemeiner O., Leberklette,
Bruchwurz, Steinwurz.**Euphorbia, XI.** WolfsmilchE. canescens *L.*, grauliche Wolfsmilch.E. peploides *Gou.*, kleinste Wolfsmilch.**Glaucium, XIII.** Hornmohn.Gl. corniculatum *P.* (*Chelidonium corniculatum*
L.), bleichrother Hornmohn.Gl. fulvum *Sm.*, rothgelber Hornmohn.**Ranunculus, XIII.** Ranunkel, Hahnenfuss.R. muricatus *L.*, stachelsaamiger R. oder H.**Hyssopus, XIV.** Ysop.H. officinalis *L.*, gemeiner Hysop oder Ysop.**Iberis, XV.** Schleifenblume.I. amara *L.*, bittere Schl. oder Zungenblume,
gefiederter Bauernsenf.**Cardaria, XV.** Cardarie.C. Draba *Desv.* (*Cochlearia Draba L.*), hunger-
blumenartiges Löffelkraut, doldentragende
Kresse.**Erysimum, XV.** Hederich.E. cheiranthoides *L.*, levkojenartiger, klein-
blüthiger Hederich.E. virgatum *Rth.*, ruthenförmiger Hederich.**Diplotaxis, XV.** Rampe.D. tenuifolia *De C.* (*Sisymbrium tenuifolium L.*),
dünnblättrige Rampe oder Rauke.**Abutilon, XVI.** Sammetpappel.A. Avicennae *Gaertn.* (*Sida Abutilon L.*), ge-
meine Sida. (Im südlichen Gebiete.)**Althaea, XVI.** Eibisch.A. hirsuta *L.*, haariger Eibisch.

Auf Schutt.

Hibiscus, XVI. Hibiscus.

H. Trionum *L.*, Stunden-Ibisch.

Mycelis, XIX. Mauersalat.

M. muralis *Rchb.* (*Prenanthes muralis L.*), gelber Hasenlattig, Mauersalat, gem. Hasenstrauch.

Crepis, XIX. Pippau.

Cr. tectorum *L.*, Dach-Pippau.

Barkhausia, XIX. Barkhausie.

B. foetida *De C.* (*Crepis foetida L.*), stinkende Barkhausie, stinkender Pippau.

B. graveolens *Rchb.*, starkkriechender Pippau.

Helminthia, XIX. Wurmlattich.

H. echioides *Gaert.* (*Picris echioides L.*), scharfblättriger Wurmsalat.

Senecio, XIX. Kreuzkraut.

S. squalidus *L.*, schmutziges Kreuzkraut.

S. viscosus *L.*, klebriges Kreuzkraut.

Diplopappus, XIX. Doppelkrone.

D. annuus *H. Cass.* (*Aster annuus L.*), jährige Doppelkrone oder Aster oder Sternblume.

Urtica, XXI. Nessel.

U. dioica *L.*, zweihäusige Nessel, grosse Brenn-Nessel.

U. urens *L.*, kleine Brenn-Nessel.

(*Blitum Bonus Henricus*, *Veronica agrestis*, *V. arvensis*, *V. polita*, *Bromus tectorum*, *Lithospermum officinale*, *Asperugo procumbens*, *Cynoglossum officinale*, *Hyoscyamus niger*, *Anthriscus nodosa*, *Torilis nodosa*, *Chaerophyllum temulum*, *Sambucus nigra*, *Polygonum aviculare* α . *triviale*, *Reseda lutea*, *Euphorbia stricta*, *Chelidonium majus*, *Ranunculus parviflorus*, *Linaria minor*, *Alyssum sinuatum*, *Capsella Bursa pastoris*, *Lepidium campestre*, *L. ruderales*, *Laelia orientalis*, *Erysimum repandum*, *Sinapis alba*, *S. nigra*, *Sisymbrium Columnae*, *S. lrio*, *S. Loeselii*, *S. officinale*, *S. pannonicum*, *S. Sophia*, *Diplotaxis muralis*, *Erodium cicutarium*, *E. malacoides*, *E. moschatum*, *Geranium dis-*

Auf Schutt.

sectum, *G. molle*, *G. robertianum*, *Malva rotundifolia*, *Medicago lupulina*, *Lapsana communis*, *Erigeron acris*, *Senecio vulgaris* s. May S. 303 — 7.)

89) *An und in Seen.**An Seen.*

Blysmus, III. Quellriet.

Bl. rufus Panz. (*Scirpus rufus* Schrad.), braune Binse.

Alisma, VI. Froschlöffel.

A. parnassifolium L., parnassienblättriger Fr.

Euphorbia, XI. Wolfsmilch.

E. pilosa L., behaarte Wolfsmilch.

(*Crambe aspera* s. May S. 307.)

Auf Seen.

(*Trapa natans* s. May S. 307.)

In Seen.

Chara, I. Armleuchter.

Ch. flexilis L., biegsamer Armleuchter.

Potamogeton, IV. Laichkraut.

P. compressus L., zusammengedrücktes L. oder Saamkraut.

P. gramineus L., grasartiges L. oder Saamkraut.

Alisma parnassifolium (s. oben).

Sabulina, XV. Pfriemenkresse.

S. aquatica L., Wasser-Pf. (Auf sandigem Boden.)

Myriophyllum, XXI. Tausendblatt.

M. verticillatum L., quirlförmiges Tausendblatt.

Ceratophyllum, XXI. Hörnerblatt.

C. apiculatum Cham., spitzfrüchtiges Hörnerbl.

C. demersum L., rauhes Hörnerblatt.

C. platyacanthum Cham., breitdorniges H.

C. submersum L., stumpffrüchtiges Hörnerblatt.

In Seen.

Udora, XXII. Wasserquirl.

U. lithuanica Bess., litthauer Wasserquirl.

(*Hippuris vulgaris* s. May S. 307.)

Am Seestrunde s. Meerstrand Nr. 68.

90) An sonnigen Orten.

Prunella, XIV. Prunelle.

Pr. alba Pall., weisse Prunelle.

Lathyrus, XVII. Platterbse.

L. Cicera L., rothe Platterbse.

(*Veronica prostrata* s. May S. 307.)

An sonnigen, felsigen Orten.

Brachypodium, III. Kurzstielchen.

Br. pinnatum P. B. (*Bromus pinnatus L.*), gefiederte Trespe.

Thymus, XIV. Thymian, Quendel.

Th. humifusus Brnh., gestreckter Th. oder Q.
(Auf Kalkboden.)

An sonnigen, trocknen Orten.

Stachys, XIV. Ziest.

St. palustris Var. *Stachys segetum*, Saat-Ziest.

(*Veronica Chamaedrys* s. May S. 307.)

91) Um Städte.

Tilia, XII. Linde.

T. europaea L., gemeine Linde, Sommer-Linde.

92) An Steinbrüchen.

Verbascum, V. Wollkraut.

V. phlomoides L., windblumenartige Königskerze.

(*Syrenia cuspidata* s. May S. 308.)

93) *Auf Steinhäufen.*

Sedum, X. Fetthenne.

S. *Telephium* L., Bohnen-F., breitblättriger Knörpel, Schmeerwurz.

Rubus, XII. Himbeere, Brombeere.

R. *caesius* L., kriechende, blaue Br. β . *arvalis*.

94) *An steinigen Plätzen.*

Melica, III. Perlgras.

M. *ciliata* L., gefranztes, wolliges P., haariges Waldgras.

M. *Bauhini* All., Bauhin's Perlgras.

Agropyrum, III. Queckengras.

A. *glaucum* R. S. (*Triticum glaucum* Desf.), blaugrünes Queckengras, blaugrüner Weizen.

Cornus, IV. Hornstrauch.

C. *sanguinea* L., rother Hartriegel, Hundsbereenstrauch.

Linum, V. Lein, Flachs.

L. *angustifolium* Huds., schmalblättriger L. od. Fl.

Arenaria, X. Sandkraut.

A. *ciliata* L., gefranztes Sandkraut.

Spiraea, XII. Spiere.

Sp. *ulmifolia* Scop., ulmenblättrige Spierstaude.

Andrachne, XXI. Andrachne.

A. *telephioides* L., krautartige Andrachne.

(*Agropyrum cristatum*, *Chrysurus aureus*, *Galium ochroleucum*, *Vaillantia muralis*, *Rhamnus saxatilis*, *Cistus creticus*, *C. monspeliensis*, *C. salvifolius*, *Corydalis lutea* siehe May S. 308 f.)

a) *An steinigen Orten niederer Gebirge.*

Oxytropis, XVII. Spitzfahne.

O. *pilosa* De C. (*Astragalus pilosus* L.), haarige Spitzfahne, haariges Wirbelkraut.

An steinigen Orten in höhern Gebirgsthälern.
(*Geranium nodosum* s. May S. 309.)

b) *An steinigen Orten zwischen Gebüsch.*
Geranium, XVI. Storchschnabel.
G. columbinum L., Tauben-Storchschnabel.
(*Geranium macrorrhizon* s. May S. 309.)

c) *An steinigen Orten in Voralpengegenden.*
Corydalis, XVII. Helmbusch, Lerchensporn.
C. ochroleuca Koch., gelblichweisser Helmbusch.

In Wäldern.
(*Rubus idaeus* s. May S. 309.)

d) *An steinigen, feuchten Orten.*
Barbarea, XV. Barbenkraut.
B. stricta Andrz. (*Erysimum Barbarea* β . L.),
steifes Barbenkraut.

e) *An steinigen, lichten Orten.*
(*Cynanchum Vincetoxicum* s. May S. 309.)

f) *Auf steinigem, sandigen Boden.*
Silene, X. Leimkraut.
S. inflata Sm., aufgeblasenes Leimkraut. In Gebirgen: *S. inflata* Var. *A. glabra* α . *S. vesicaria* Schrad. und β . *glauca*. — In Voralpen: *A. glabra* ϵ . *chlorophylla*.
Sedum Telephium (s. oben S. 500.)

An steinigen, sandigen Orten in Gebirgsgegenden.
Mathiola, XV. Levkoy.
M. varia De C. (*Cheiranthus varius* Sib. et Sm.),
bunte Levkoye.

An steinigen, sandigen Orten in Kalkalpengegenden.
Senecio, XIX. Kreuzkraut.
S. abrotanifolius L., stabwurzblättriges Kr.

g) *An steinigen, schattigen Orten.*

(*Geranium robertianum* s. May S. 310.)

h) *An steinigen, trocknen Orten.*

(*Agropyrum intermedium*, *Silene nemoralis*, *Rosa gallica* s. May S. 310.)

95) *Auf Stoppeläckern.*

(*Polygonum aviculare* γ . *neglectum* s. May S. 310.)

96) *An Strassen.*

Anchusa, V. Ochsenzunge.

A. verrucosa Lam., warzige Ochsenzunge.

Cardaria, XV. Cardarie.

C. Draba Deso. (*Cochlearia Draba* L.), hungerblumenartiges Löffelkraut, doldentragende Kresse.

Barkhausia, XIX. Barkhausie.

B. graveolens Rchb., (*Crepis*) starkkriechende B.

In Strassen.

Tribulus, X. Burzeldorn.

Tr. terrestris L., gemeiner Burzeldorn.

(*Polygonum aviculare* α . *triviale* s. May S. 310.)

97) *An und in Sümpfen und sumpfigen Orten.*

a) *An Sümpfen.*

Veronica, II. Ehrenpreis.

V. Anagallis L., Wasser-E., Wasser-Gauchheil.

V. maritima L., Meerstrands-Ehrenpreis.

Cyperus, III. Cypergras.

C. glomeratus Host., knaulförmiges Cypergras.

Limnochloa, III. Pfuhlbinsse.

L. Baeothryon (*Scirpus Baeothryon* Ehrh.),

Torfbinse.

*An Sümpfen.***Baldingera, III.** Baldingere.*B. arundinacea Rchb.* (*Phalaris arundinacea L.*),
rohrartiges Glanzgras.**Allium, VI.** Lauch.*A. Schoenoprasum L.*, Schnittlauch.**Juncus, VI.** Simse.*J. conglomeratus L.*, zusammengeknaulte Simse,
Knopfbirse.*J. effusus L.*, Flatter-S., Flatterbirse.*J. glaucus Ehrh.*, bläuliche, blaugrüne Simse.*J. obtusiflorus Ehrh.* (*Juncus articulatus a. L.*),
stumpfblüthige Simse.**Rumex, VI.** Ampfer.*R. aquaticus L.*, Wasserampfer.**Malachium, X.** Weichmeier.*M. aquaticum Fries.* (*Cerastium aquaticum L.*),
Wasser-Hornkraut. "(Zwischen Gebüsch.)"**Geranium, XVI.** Storchschnabel.*G. palustre L.*, Sumpf-Storchschnabel.**Althaea, XVI.** Eibisch.*A. officinalis L.*, gemeiner Eibisch.**Melilotus, XVII.** Melote.*M. palustris W. Kit.*, Sumpf-Steinklee.**Cineraria, XIX.** Aschenpflanze.*C. palustris L.*, Sumpf-Aschenpflanze.

(*Eriophorum angustifolium*, *Glyceria distans*, *Larabrea uliginosa*, *Spiraea denudata*, *Spiraea Ulmaria*, *Ranunculus sceleratus*, *Nasturtium officinale*, *N. palustre*, *N. silvestre*, *Cochlearia Armoracia*, *Vigna acuta*, *V. paniculata*, *Carex Pseudo-Cyperus*, *C. riparia* s. May S. 310 f.)

b) *An sumpfigen Orten.***Agropyrum, III.** Queckengras.*A. rigidum R. S.* (*Triticum rigidum Schrad.*),
steifer Weizen.

*An sumpfigen Orten.***Hemerocallis**, VI. Taglilie.*H. flava* L., gelbe Tagblume.**Euphorbia**, XI. Wolfsmilch.*E. pilosa* L., behaarte Wolfsmilch.

(Ranunculus hirsutus, Cochlearia officinalis, Vigna capitata s. May S. 311 f.)

*c) In Sümpfen.***Utricularia** II. Wasserschlauch.*U. vulgaris* L., gemeiner Wasserschlauch.*U. intermedia* Hayne, mittlerer Wasserschlauch.*U. minor* L., kleiner W. (Auf Moorboden.)**Glyceria**, III. Schwaden, Mannagras.*G. fluitans* R. Br. (*Festuca fluitans* L.), Fluss-Rispengras, schwimmendes Rispengras, fluthendes Viehgras, Manna-Schwingel.**Spartina**, III. Besengras.*Sp. stricta* Rth. (*Dactylis stricta* Sm.), steifes Knauelgras.**Plantago**, IV. Wegerich*Pl. major* L., grosser Wegerich.**Galium**, IV. Labkraut.*G. palustre* L., Sumpf-Labkraut.**Naumburgia**, V. Naumburgie.*N. thyrsiflora* Richb. (*Lysimachia thyrsiflora* L.), büschelblüthige N. oder Lysimachie.**Oenanthe**, V. Rebendolde.*O. fistulosa* L., röhrlige Rebendolde, Drüswurz, Tropfwurz.**Acorus**, VI. Acorwurz, Calmus.*A. Calamus* L., gemeiner, ächter Calmus, Teich-Calmus.**Alisma**, VI. Froschlöffel.*A. ranunculoides* L., ranunkelartiger Fr.

In Sümpfen.

Calla, VII. (XXI.) Schlangenkraut.

C. palustris L., Sumpf-Schlangenkraut, Wasser-Aron, Wasser-Pfeffer.

Butomus, VII. Wasserviole.

B. umbellatus L., doldenblüthiger Wasserliesch, Blumenbinse.

Ranunculus, XIII. Ranunkel, Hahnenfuss.

R. ophioglossifolius Vill., natterzungenblättriger Ranunkel oder Hahnenfuss.

Scutellaria, XIV. Helmkraut.

Sc. galericulata L., gemeines H. oder Fieberkraut.

Nasturtium, XV. Brunnenkresse.

N. amphibium R. Br. (*Sisymbrium amphibium L.*), gemeine Wasser-Rauke, Wasser-Hederich, Wasser-Rettig.

Cirsium, XIX. Kratzdistel.

C. oleraceum All. (*Cnicus oleraceus L.*), gemüsartige oder gelbe Kratzdistel, Kohldistel, Wiesenkohl, Wasserkohl.

Inula, XIX. Alant.

I. salicina L., weidenblättriger Alant.

Carex, XXI. Riedgras.

C. Buxbaumii Wahlb., Buxbaums Riedgras.

Typha, XXI. Rohrkolbe.

T. angustifolia L., schmalblättrige Rohrkolbe.

T. elatior Bnngh., hohe Rohrkolbe.

T. latifolia L., breitblättrige Rohrkolbe.

(*Iris Pseudacorus*, *Heleocharis palustris*, *Hottonia palustris*, *Hydrocotyle Schkuhriana*, *H. vulgaris*, *Comarum palustre*, *Vignea vulpina*, *Carex filiformis*, *Salix myrtilloides* s. May S. 312.)

In beschatteten Sümpfen.

Carex (s. oben) leptostachys Ehrh., schlankähriges R.

(*Euphorbia coralloides* s. May S. 313.)

In torfigen Sümpfen.

Callitriche, I. Wasserstern.

C. autumnalis L. B. tenuior.

d) Auf Sumpfwiesen.

Valeriana, III. Baldrian.

V. officinalis L., gemeiner B. β. Var. exaltata Mik.

Holoschoenus, III. Kugelriet.

H. filiformis Richb. (Scirpus romanus b. Linn.), fadenförmiger Kugelriet.

Glyceria, III. Schwaden, Mannagras.

Gl. festucaeformis Heynh. (Poa festucaeformis Host.), schwingelförmiges M. oder Rispengras.

Plantago, IV. Wegerich.

Pl. altissima Jacq., höchster Wegerich.

Oenanthe, V. Rebendolde.

O. peucedanifolia Poll., haarstrangblättrige R.

O. silaifolia M. B., silaublättrige Rebendolde.

Triglochin, VI. Dreizack.

Tr. maritimum L., Meerstrands-Dreizack.

Lythrum, XI. Weidrich.

L. virgatum L., ruthenförmiger Weidrich.

Clematis, XIII. Waldrebe.

Cl. integrifolia L., einfache Waldrebe.

Thalictrum, XIII. Wiesenraute.

Th. flavum L., gelbe W., Feldrhabarber.

Pedicularis, XIV. Läusekraut.

P. Sceptrum L., scepterförmiges Läusekraut.

Geracium, XIX. Sperberkraut.

G. paludosum (Hieracium paludosum L.), Sumpf-Sperberkraut, Sumpf-Habichtskraut.

Willemetia, XIX. Willemetie.

W. apargioides Neck. (Crepis apargioides W.), pfaffenröhrleinartiger Pippau.

*Auf Sumpfwiesen.***Orchis, XX.** Knabenkraut.*O. angustifolia* *Lois.*, schmalblättriges Knabenkr.*O. haematodes* *Rchb.*, blutfarbenes Knabenkraut.**Vignea, XXI.** Segge.*V. axillaris* (*Carex axillaris* *Good.*), winkellährige Segge, winkellähriges Riedgras.*V. microstachya* (*Carex microstachya* *Ehrh.*), kleinährige Segge, kleinähriges Riedgras.(Gratiola officinalis, Menyanthes trifoliata, Scheuchzeria palustris, Euphorbia palustris, Polygala austriaca, Orchis laxiflora, *O. majalis*, *Vignea elongata* s. May S. 313.)*Auf Sumpfwiesen in den Alpen.***Eriophorum, III.** Wollriet.*E. capitatum* *Host.* (*Eriophorum Scheuchzeri* *Hpp.*), kopfförmiges Wollgras, Scheuchzers Wollgras.98) *An, auf und in Teichen.*a) *An Teichen.***Heleocharis, III.** Teichriet.*H. ovata* *Lestib.* (*Scirpus ovatus* *Rth.*), eiförmige Binse.**Heleogiton, III.** Grundbinse.*H. glaucum* *Rchb.* (*Scirpus glaucus* *Sm.*), blaugrüne Binse.**Limnochloa, III.** Pfuhlbinsse.*L. Baeothryon* (*Scirpus Baeothryon* *Ehrh.*), Torfbinsse.**Baldingera, III.** Baldingere.*B. arundinacea* *Rchb.* (*Phalaris arundinacea* *L.*), rohrartige Binse, rohrartiges Glanzgras.**Agrostis, III.** Straussgras.*A. canina* *L.*, Hunds-Straussgras, Haargras.**Myosotis, V.** Vergissmeinnicht.*M. cespitosa* *Schulz.*, rasenförmiges Vergissm.

An Teichen.

Helosciadium, V. Sumpfdoldchen.

H. nodiflorum Koch. (*Sium nodiflorum L.*),
knotenblüthiger Merk.

Potentilla, XII. Fingerkraut.

P. norvegica L., norwegisches Fingerkraut. (In
sandigen Gegenden.)

Nasturtium, XV. Brunnenkresse.

N. siifolium Rchb., merkblättrige Brunnenkresse.

Littorella, XXI. Strändling.

L. lacustris L., gemeiner Strändling.

(*Iris Pseudacorus*, *Scirpus silvaticus*, *Sclerochloa dura*,
Samolus Valerandi, *Potentilla Anserina*, *P. supina*, *Ranunculus Flammula*, *R. sceleratus*, *Vignea acuta*, *V. canescens*,
V. elongata, *V. intermedia*, *V. vulpina*, *Carex Oederi*, *C. Pseudo-Cyperus* s. May S. 314 f.)

An grasigen Teichrändern.

Cardamine, XV. Schaumkraut.

C. parviflora L., kleinblüthiges Schaumkraut.

An sandigen Teichrändern.

(*Carex hirta* s. May S. 315.)

b) *Auf Teichen.*

(*Trapa natans* s. May S. 315.)

c) *In Teichen.*

Chara, I. Armleuchter.

Ch. flexilis L., biegsamer Armleuchter.

Callitriche, I. Wasserstern.

C. autumnalis L. Var. *B. tenuior*.

C. platycarpa Ktzig., breitfrüchtiger W. Var. *B. stagnatilis*.

Glyceria, III. Schwaden, Mannagras.

Gl. fluitans R. Br. (*Festuca fluitans L.*), Fluss-
Rispengras, schwimmendes Rispengras, fluthen-
des Viehgras, Mannaschwingel.

*In Teichen.***Potamogeton, IV.** Laichkraut.*P. trichoides Cham.*, haarförmiges Laichkraut oder Saamkraut.**Myriophyllum, XXI.** Tausendblatt.*M. verticillatum L.*, quirlförmiges Tausendblatt.**Ceratophyllum, XXI.** Hörnerblatt.*C. apiculatum Cham.*, spitzfrüchtiges Hörnerbl.*C. demersum L.*, rauhes Hörnerblatt.*C. platyacanthum Cham.*, breitedorniges H.*C. submersum L.*, stumpffrüchtiges Hörnerblatt.**Typha, XXI.** Rohrkolbe.*T. angustifolia L.*, schmalblättrige Rohrkolbe.*T. elatior Bnng.*, hohe Rohrkolbe.*T. latifolia L.*, breitblättrige Rohrkolbe.(Hippuris vulgaris, Heleocharis palustris, Potamogeton crispus, *P. perfoliatus* s. May S. 315 f.)*In grossen Teichen auf sandigem Boden.***Subularia, XV.** Pfriemenkresse.*S. aquatica L.*, Wasser-Pfriemenkresse.*In tiefen Teichen im Schlamm.*

(Scirpus lacustris s. May S. 316.)

99) In Thälern.**Rubus, XIII.** Himbeere, Brombeere.*R. hirtus Waldst. Kit.*, rauhe Brombeere.*In Thälern der Gebirge und Voralpen an schattigen Anhöhen zwischen Gebüsch.***Lunaria, XV.** Mondveil.*L. rediviva L.*, spitzfrüchtige, dauernde Mondviole, Winter-Mondviole.*In Thälern der Hochalpen auf Gerölle.***Silene, X.** Leimkraut.*S. acaulis L.*, stielloses Leimkraut.

In feuchten, schattigen Thälern der Gebirge und Voralpen in feiner Lauberde.

Viola, V. Veilchen.

V. biflora L., zweiblüthiges Veilchen.

In waldigen Thälern auf nassen Wiesen.

Trifolium, XVII. Klee.

Tr. spadiceum L., castanienbrauner Klee.

100) *Auf Thonboden.*

Sonchus, XIX. Distelsalat.

S. arvensis L., Acker-Gänse-distel, Saudistel.

Taraxacum, XIX. Pfaffenröhrlein.

T. scrobinum Rchb., spätblühendes Pfaffenröhrl.

(*Dianthus Armeria*, *Trifolium striatum*, *Hieracium glaucescens* s. May S. 316.)

101) *Auf Torf.*

Heleocharis, III. Teichriet.

H. uniglumis Lk. (*Scirpus tenuis Schreb.*), einspelzige Binse.

Sedum, X. Fetthenne.

S. villosum L., haariger Knörpel, Wiesenknörpel.

Sturmia, XX. Sturmia.

St. Loeselii Rchb. (*Ophrys Loeselii L.*), Lösels-Ragwurz. (Im Grase versteckt.)

(*Rhynchospora fusca*, *Heleocharis palustris*, *Lonicera coerulea*, *Vigna chordorrhiza*, *Carex leucoglochis*, *Betula pubescens* s. May S. 316 f. — *Eriophorum angustifolium* s. May S. 317.)

Auf feuchtem Torfboden.

Juncus, VI. Simse.

J. filiformis L., fadenförmige Simse.

Auf schwammigem Torfboden.

Carex, XXI. Riedgras.

C. spicata Schk., ährenförmiges Riedgras.

*In Torflachen.***Callitriche, I. Wasserstern.***C. autumnalis L., Var B. tenuior.**C. platycarpa Ktzig., breitfrüchtiger W. Var. β. stagnatilis.**In Torfmoor.***Utricularia, II. Wasserschlauch.***U. neglecta Lehm., vernachlässigter W.**(Sabulina stricta s. May S. 317.)**Auf Torfmoos.***Wahlenbergia, V. Wahlenbergie.***W. hederacea Rchb. (Campanula hederacea L.), epheublätterige Glockenblume.**Auf Torfwiesen.**(Taraxacum glaucescens s. May S. 317.)**Auf salzhaltigen Torfwiesen.***Oenanthe, V. Rebendolde.***O. Lachenalii Gm., Lachenals Rebendolde.***102) Auf Triften.****Hordeum, III. Gerste.***H. pratense Huds., Wiesen-Gerste.***Cynosurus, III. Kammgras.***C. cristatus L., gemeines Kammgras.***Pimpinella, V. Pimpinelle.***P. Saxifraga L., Stein-Bibernell, Pfefferwurz.***Daucus, V. Möhre.***D. Carota L., gemeine Möhre, gelbe Rübe.***Linum, V. Lein, Flachs.***L. catharticum L., Purgir-Lein.***Dianthus, X. Nelke.***D. deltoides L., deltafleckige N., Wiesen-Nelke.*

*Auf Triften.***Agrimonia**, XI. Odermennig.A. Eupatorium *L.*, gemeiner O., Leberklette, Steinwurz.**Rubus**, XII. Himbeere, Brombeere.R. silvaticus *Weihe*, Wald-Brombeere.**Potentilla**, XII. Fingerkraut.P. Anserina *L.*, Gänse-F., Gänserich, gelbe Gänseblume.**Vicia**, XVII. Wicke.V. Bobartii *Forst.*, Bobarts-Wicke.**Trifolium**, XVII. Klee.Tr. filiforme *L.*, fadenförmiger Klee.Tr. procumbens *L.*, niederliegender Klee, gelber Feld-Klee.**Coronilla**, XVII. Kronwicke.C. varia *L.*, bunte Kronwicke, Schaaflinse.**Barkhausia**, XIX. Barkhausie.B. graveolens *Rchb.* (*Crepis*), starkkriechende B.

(*Aira caryophylla*, *Koeleria cristata*, *Festuca duriuscula*, *F. ovina*, *Bromus mollis*, *Myosotis versicolor*, *Gentiana acaulis*, *Armeria vulgaris*, *Stellaria graminea*, *Cerastium triviale*, *Ranunculus bulbosus*, *Alectorolophus minor*, *Arabis sagittata*, *Bonjeanea hirsuta*, *Trifolium repens*, *Leontodon hastilis*, *L. hispidus*, *Bellis perennis* s. May S. 317 ff.)

a) *Auf Triften der Alpen und Voralpen.***Horminum**, XIV. Horminum.H. pyrenaicum *L.*, pyrenäische Melisse.b) *Auf Gebirgstriften.***Arnica**, XIX. Wolverley, Wohlverleih.A. montana *L.*, Berg-W., ächte, wahre W.c) *Auf Triften der Kalkberge.***Astragalus**, XVII. Traganth.A. hypoglottis *L.*, Wiesen-Wirbelkraut.

d) *Auf Triften der Voralpen.*

Linum, V. Lein, Flachs.

L. viscosum L., klebriger Lein.

Betonica, XIV. Betonie.

B. hirsuta L., haarige Betonie.

e) *Auf dürrer Triften.*

Eryngium, V. Mannstreu.

E. campestre L., Feld-Mannstreu.

(*Nardus stricta* s. May S. 319.)

f) *Auf feuchten Triften.*

Thrincia, XIX. Thrincie.

Thr. hirta Rth. (*Leontodon hirtum L.*), ausdauernde Thr., rauhhhaariger Löwenzahn.

(*Myosotis strigulosa* s. May S. 319.)

g) *Auf kurz begrastem Triften.*

Hypochaeris, XIX. Ferkelkraut.

H. radicata L., grosses, langwurzeliges F.

h) *Auf lichten Triften.*

(*Viola canina* s. May S. 320.)

i) *Auf sandigen Triften.*

(*Cerastium vulgatum*, *Euphorbia Esula*, *Anthyllis Vulneraria* s. May S. 320.)

k) *Auf sonnigen Triften.*

Helianthemum, XIII. Ciströschen, Sonnenröschen.

H. vulgare Gärt. (*Cistus Helianthemum L.*), gemeines Ciströschen oder Sonnenröschen.

(*Helianthemum grandiflorum*, *Genista decumbens*, *Astragalus exscapus* s. May S. 320.)

l) *Auf trocknen Triften.*

Orobanche, XIV. Ervenwürger.

O. coerulea Vill., Var. *O. Millefolii Rchb.*, blauer E. (Auf *Achillea Millefolium*.)

Auf trocknen Triften.

Trifolium, XVII. Klee.

Tr. ochroleucum L., bleichgelber Klee.

(*Viola tricolor*, *Saxifraga bulbifera*, *Stellaria anomala*,
St. media, *Arabis hirsuta* s. May S. 321.)

103) *An trocknen Orten.*

Veronica, II. Ehrenpreis.

V. latifolia L., breitblättriger Ehrenpreis.

Hordeum, III. Gerste.

H. pratense Huds.

Agropyrum, III. Queckengras.

A. rigidum R. S. (*Triticum rigidum Schrad.*),
steifer Weizen.

Cynosurus, III. Kammgras.

C. cristatus L., gemeines Kammgras.

Verbascum, V. Wollkraut.

V. floccosum W. Kit., flockiges Wollkraut,
flockige Königskerze.

Melilotus, XVII. Melote.

**M. Petitpierreana W. (*Trifolium Petitpierre-*
anum Hayne),** Petitpierrische Melote.

An trocknen, sandigen Stellen.

Festuca, III. Schwingel.

F. amethystina Host., violetter Schwingel.

An trocknen, steinigen Orten.

(*Agropyrum intermedium*, *Silene nemoralis*, *Rosa gal-*
lica s. May S. 321.)

104) *In Tümpeln.*

Chara, I. Armleuchter.

Ch. flexilis L., biegsamer Armleuchter.

105) Ueberall.

Setaria, III. Borstengras.

S. viridis P. B. (*Panicum viride* L.), grüne, wilde Hirse, wilder Fennich.

Holcus, III. (XXIII.) Pferdegras.

H. lanatus L., wolliges Pf. oder Darrgras.

Festuca, III. Schwingel.

F. inermis De C. (*Bromus inermis* L.), grannenloser Schwingel, wehrlose Trespe

Bromus, III. Trespe.

Br. mollis L., weiche Trespe, Futter-Trespe, Feld-Trespe.

Lolium, III. Lolch.

L. perenne L., ausdauernder L., Taubenkorn, englisches Raygras.

Hordeum, III. Gerste.

H. murinum L., Mäuse-Gerste, Mauer-Gerste, taube Gerste.

Echium, V. Natterwurz.

E. vulgare L., gemeiner Natterkopf.

Campanula, V. Glockenblume.

C. patula L., ausgebreitete Glockenblume.

C. Rapunculus L., Rapunzel-Glockenblume.

C. rotundifolia L., rundblättrige Glockenblume.

Solanum, V. Nachtschatten.

S. nigrum L., schwarzer Nachtschatten.

Pimpinella, V. Pimpinelle.

P. magna L., grosse Bibernell.

P. Saxifraga L., Stein-Bibernell, Pfefferwurz.

Bunium, V. Knolldolde.

B. Bulbocastanum L., gemeine, essbare Erdnuss, Wurzelcastanie.

Sambucus, V. Hollunder, Flieder.

S. nigra L., gemeiner, schwarzer Hollunder.

Ueberall.

Oenothera, V. **Nachtkerze.**

O. biennis L., gemeine N., gelbe Rapunzel,
Rhapontica.

Spergula, X. **Spark.**

Sp. arvensis L., Acker-Spargel, Futter-Spargel.

Rubus, XII. **Himbeere, Brombeere.**

R. caesius L., kriechende, blaue Br., Bocksbeere.

R. fruticosus L., gemeiner Brombeerstrauch.

Potentilla, XII. **Fingerkraut.**

P. Anserina L., Gänse-Fingerkraut, Gänserich,
gelbe Gänseblume.

Tormentilla, XII. **Tormentille.**

T. erecta L., aufrechte Rothwurz.

Geum, XII. **Benediktenkraut.**

G. urbanum L., wahres Benediktenkraut, ge-
meine Nelkenwurz.

Alyssum, XV. **Steinkraut.**

A. calycinum L., kelchfrüchtiges Steinkraut.

Berteroa, XV. **Berteroa.**

B. incana De C. (*Alyssum incanum* L.), graues
Steinkraut.

Leontodon, XIX. **Löwenzahn.**

L. hispidus L., gabelhaariger Löwenzahn.

Achillea, XIX. **Garbe.**

A. Millefolium L., gemeine Schaafgarbe, Feld-
garbe, Schaafrippe.

Urtica, XXI. **Nessel.**

U. dioica L., zweihäusige N., grosse Brenn-N.

U. urens L., kleine Brenn-Nessel.

(*Veronica agrestis*, *V. arvensis*, *V. hederacifolia*, *Antho-
xanthum odoratum*, *Nardus stricta*, *Alopecurus pratensis*,
Poa annua, *Bromus sterilis*, *Br. tectorum*, *Dactylis glome-
rata*, *Agropyrum repens*, *Plantago major*, *Pl. media*, *Pl. lan-
ceolata*, *Lithospermum arvense*, *L. officinale*, *Anchusa of-
ficinalis*, *Lycopsis arvensis*, *Viola tricolor*, *Chaerophyllum*

Ueberall.

silvestre, Aegopodium Podagraria, Luzula campestris, Rumex Acetosella, Polygonum aviculare, P. Persicaria, Stellaria media, Arenaria serpyllifolia, Cerastium arvense, C. triviale, C. vulgatum, Sorbus Aucuparia, Rubus Idaeus, Chelidonium majus, Capsella Bursa pastoris, Alliaria officinalis, Barbarea vulgaris, Erodium cicutarium, Trifolium pratense, Tr. repens, Taraxacum officinale, Senecio vulgaris, Bellis perennis, Carex hirta s. May S. 322 — 25.)

106) *An überschwemmten Orten.*

Callitriche, I. Wasserstern.

C. stagnalis Scop., Sumpf-Wasserstern.

Heleocharis, III. Teichriet.

H. ovata Lestib. (Scirpus ovatus Rth.), eiförmige Binse.

Limnochloa, III. Pfuhlbinsse.

L. Baeothryon (Scirpus Baeothryon Ehrh.), Torfbinsse.

Beckmannia, III. Beckmannie.

B. erucaeformis Host (Phalaris erucaeformis L.), raukenförmige Beckmannie.

Glyceria, II. Schwaden, Mannagras.

Gl. fluitans R. Br. (Festuca fluitans L.), essbarer Schwingel, Mannaschwingel, Mannaschwaden.

Juncus, VI. Simse.

J. bufonius L., Kröten-S., gem. Krötengras.

J. capitatus Weig., kopfförmige Simse.

(Ranunculus hirsutus, R. sceleratus, Carex Oederi siehe May S. 325.)

Auf überschwemmtgewesenen Orten.

Potentilla, XII. Fingerkraut.

P. supina L., niederliegendes Fingerkraut.

(Callitriche verna, Nasturtium anceps, N. palustre siehe May S. 325.)

107) *An Ufern* (Vergl. an Flüssen).

Eryngium, V. Mannstreu.

E. planum L., flachblättrige Mannstreu.

Spergula, X. Spark.

Sp. arvensis L., Acker-Spark, Futter-Spark.

An sandigen Ufern.

Cyperus, III. Cypergras.

C. patulus Host., ausgebreitetes Cypergras.

Orobanche, XIV. Ervenwürger.

O. coerulescens Steph., bläulicher E. (Auf *Medicago falcata*.)

Auf Uferwiesen.

Camelina, XIV. Dötter.

C. austriaca Pers. (*Myagrum austriacum* Jacq.), österreichischer Leindotter.

108) *Auf unbebautem Boden.*

Gastridium, III. Bandgras.

G. lendigerum Gaud. (*Milium lendigerum* L.), ährentragendes B. oder Hirsegras.

Crucianella, IV. Kreuzblatt.

Cr. angustifolia L., schmalblättriges Kreuzblatt.

Myrtus, XII. Myrte.

M. communis L., gemeine Myrte.

109) *Auf Urgebirgen.*

Oreochloa, III. Felsenspelz.

O. disticha Lk. (*Cynosurus distichus* Hoffm.), zweireihiges Kugelgras.

Lloydia, VI. Lloydie.

Ll. serotina Rchb. (*Anthericum serotinum* L.), späte Zaunblume.

*Auf Urgebirge.***Digitalis, XIV.** Fingerhut.*D. grandiflora Lam.*, grossblumiger Fingerhut.
(An Felsen.)

(Veronica latifolia, Thalictrum flexuosum s. May S. 325 f.)

a) *Auf Urgebirgsalpen.***Saxifraga, X.** Steinbrech.*S. moschata Wulff.*, bisamduftiger Steinbrech.**Silene, X.** Leimkraut.*S. Pumilio Wulff.*, niedriges Leimkraut. (Auf nackten etwas feuchten Plätzen.)**Pulsatilla, XIII.** Küchenschelle.*P. alba Lob.* (*Anemone alpina L.*), weisse K.,
Alpen-Windblume.**Callianthemum, XIII.** Schmuckblume.*C. coriandrifolium Rchb.* (*Ranunculus rutae-
folius All.*), corianderblättrige Schm., rau-
tenblättriger Hahnenfuss. (Am Rande der
Gletscher.)**Noccaea, XV.** Noccäe.*N. brevicaulis Rchb.* (*Lepidium brevicaule Hpp.*),
kurzstielige Kresse. (Am Gries.)(Primula glutinosa, Potentilla salisburgensis siehe May
S. 326.)*Auf hohen Urgebirgsalpen.***Saxifraga (s. oben) sedoides L.**, knörpelartiger St.*Auf höhern Urgebirgsalpen.***Primula, V.** Primel.*Pr. Floerkeana Schrad.*, Flörke'sche Pr. oder
Schlüsselblume. (An grasigen Abhängen.)**Astrantia, V.** Thalstern.*A. minor L.*, kleiner Thalstern, Sterndolde.

(Saxifraga controversa s. May S. 326.)

Auf den höchsten Urgebirgsalpen.

Saxifraga, X. Steinbrech.

S. biflora All., zweiblumiger Steinbrch.

S. oppositifolia L., paarblättriger Steinbrech.

Dianthus, X. Nelke.

D. glacialis Hänke, Gletscher-Nelke.

b) In Urgebirgswäldern.

Aconitum, XIII. Eisenhut.

A. Thelyphonum Rchb., Frauentod-Eisenhut.

*In höhern Urgebirgsalpen an Quellen, Bächen,
Bergströmen.*

Geranium, XVI. Storchschnabel.

G. silvaticum L., Wald-Storchschnabel.

110) *Auf und in Voralpen.*

Veronica, II. Ehrenpreis.

V. officinalis L., gebräuchlicher, heilsamer E.

Calamagrostis, III. Reithgras.

C. pyramidalis Host., pyramidenförmiges R.

Festuca, III. Schwingel.

F. alpestris R. S. Alpen-Schwingel.

Elymus, III. Haargras.

E. europaeus L., europäisches Haargras, Wald-Haargras.

Asterocephalus, IV. Kronenscabiöse.

A. graminifolius (Scabiosa graminifolia L.), grasblättrige Kronenscabiöse.

Campanula, V. Glockenblume.

C. barbata L., rauhblüthige Glockenblume.

C. pulla L., dunkelblaue Glockenblume.

Evonymus, V. Spindelbaum.

E. latifolius Scop., breitblättriger Spindelbaum.

Auf und in Voralpen.

Ligusticum, V. Ligustik.

L. Seguieri Koch. (*Selinum Seguieri L.*), Seguiers-Ligustik, Seguirs-Silge.

Luzula, VI. Hainsimse.

L. flavescens Gaud. (*Juncus flavescens Host.*), gelbliche Hainsimse.

L. nivea De C. (*Juncus niveus L.*), schneeweisse H.

Saxifraga, X. Steinbrech.

S. Cotyledon L., nabelkrautartiger, pyramidenförmiger Steinbrech.

Rosa, XII. Rose.

R. rubrifolia Vill. rothblätterige Rose.

R. villosa L., zottige Rose.

Sieversia, XII. Sieversie.

S. montana Spr. (*Geum montanum L.*), Berg-Sieversie, Berg-Benediktenkraut.

Delphinium, XIII. Rittersporn.

D. intermedium Ait., mittlerer Rittersporn.

Pulsatilla, XIII. Küchenschelle.

P. alba Lob. (*Anemone alpina L.*), weisse K., Alpen-Windblume.

Alectorolophus, XIV. Hahnenkamm.

A. major Rchb. (*Rhinanthus Crista galli L.*), grosser Hahnenkamm, Var. β . *alpestris*.

Polygala, XVII. Kreuzblume.

P. alpestris Rchb., Alpen-Kreuzblümchen.

Cytisus, XVII. Bohnenstrauch.

C. alpinus Mill., Alpen-Bohnenstrauch.

C. angustifolius Mnch., schmalblättriger B.

Carduus, XIX. Distel.

C. arctioides W., rothspitzige Distel.

Cirsium, XIX. Kratzdistel.

C. semipectinatum Rchb. (*Carduus semipectinatus Lam.*)

Auf und in Voralpen.

Doronicum, XIX. Gemswurz.

D. scorpioides W., gegliederte Gemswurzel.

Epipactis, XX. Sumpfwurz.

E. atrorubens Hoffm. (Serapias), dunkelrothe S.

Salix, XXII. Weide.

S. limosa Wahlb. (*Salix arenaria L.*), Gebirgs-Weide.

(*Valeriana montana*, *Festuca ovina* Var. *vivipara*, *Alchimilla fissa*, *Lonicera coerulea*, *L. nigra*, *Rhamnus alpinus*, *Bunium Bulbocastanum*, *Lilium Martagon*, *Spiraea flexuosa*, *Isopyrum thalictroides*, *Arabis alpina*, *Achillea tomentosa*, *Buphthalmum salicifolium*, *Alnus viridis* s. May S. 326 f.)

a) *In Voralpen an Abhängen, Anhöhen, auf trocknen Wiesen und Triften.*

(*Arabis hirsuta* s. May S. 328.)

An grasigen Abhängen.

Aquilegia, XIII. Akeley.

A. nigricans Bmg., schwärzliche Akeley.

b) *In Voralpengegenden angebaut.*

Levisticum, V. Liebstöckel.

L. vulgare J. Bauh. (*Ligusticum Levisticum L.*), gemeiner, gewöhnlicher Liebstock.

c) *In Voralpengegenden auf Bergen.*

Valeriana, III. Baldrian.

V. tripteris L., dreiblättriger Baldrian.

d) *In Voralpen an Bergströmen und Quellen.*

Cirsium, XIX. Kratzdistel.

C. rivulare Rchb. (*Carduus rivularis Jacq.*), Bach-Kratzdistel.

e) *In Voralpen an Felsen.*

Lasiagrostis, III. Rauhgras.

L. Calamagrostis Lk. (*Agrostis Calamagrostis L.*), ästiger Windhalm, silberfarbenes Rohr.

*In Voralpen an Felsen.***Dianthus, X.** Nelke.D. silvestris *Wulff.*, wilde Nelke.**Sabulina, X.** Sändling.S. Gerardi (*Arenaria Gerardi W.*), Gerards-Sandkraut.

(Ribes petraeum s. May S. 328.)

*An feuchten, etwas schattigen Felsen.***Moehringia, VIII.** Möhringie.M. muscosa *L.*, gemeine Moosmiere.*An nackten Felsen.***Sedum, X.** Fetthenne.S. annuum *L.*, jährige F., jähriger Knörpel.S. atratum *L.*, schwärzlicher Knörpel.*An felsigen Stellen.*

(Arctostaphylos Uva ursi s. May S. 328.)

An Felsen und Gries.

(Arabis alpina s. May S. 328.)

f) *In Voralpen an feuchten Stellen.***Valeriana** (s. oben) sambucifolia *Mik.*, hollunderblättriger Baldrian.**Chaerophyllum, V.** Kälberkropf.Ch. aureum *L.*, gelbfrüchtiger K., Goldkerbel.Ch. hirsutum *L.*, behaarter Kälberkropf.Ch. maculatum *W.*, gefleckter Kälberkropf.**Stachys, XIV.** Ziest.St. alpina *L.*, Alpen-Ziest.**Cardamine, XV.** Schaumkraut.C. trifolia *L.*, dreiblättriges Schaumkraut.

(Saxifraga umbrosa, Bellidiastrum Michelii siehe May S. 328.)

In Voralpen an feuchten und sandigen Orten.

(Nasturtium pyrenaicum s. May S. 328.)

In Voralpen an feuchten, steinigen Orten.

Anemone, XIII. Windblume.

A. narcissiflora L., narcissenblüthige W.

g) *In Voralpengegenden an freien, lichten und steinigen Orten und Aeckern.*

(*Cardamine hirsuta* s. May S. 329.)

h) *In Voralpen in Gebüsch.*

(*Scrofularia glandulosa*, *Hesperis matronalis* siehe May S. 328 f.)

i) *In Voralpen an Grashügeln.*

Malaxis, XX. Zart-Orche.

M. monophyllos Sw. (*Ophrys monophyllos L.*), einblättriges Weichkraut.

(*Scorzonera angustifolia* s. May S. 329.)

Auf Grasplätzen.

(*Habenaria albida* s. May S. 329.)

k) *In Voralpen an Kalkfelsen.*

Saxifraga, X. Steinbrech.

S. aizoon Murr., immergrüner Steinbrech.

S. caesia L., bläulicher Steinbrech.

Kerneria, XV. Kernere.

K. saxatilis Rchb. (*Myagrum saxatile L.*), Felsen-Leindotter.

Hieracium, XIX. Habichtskraut.

H. villosum L., zottiges Habichtskraut.

An kalkfelsigen Orten.

Heracleum, V. Bärenklau.

H. austriacum L., österreichischer Bärenklau, österreichisches Heilkraut.

l) *In Voralpengegenden in feiner Lauberde.*

(*Viola biflora* s. May S. 329.)

m) *In Voralpengegenden auf Moorboden.*

(*Primula farinosa* s. May S. 329.)

n) *In Voralpenegegenden an Quellen.*

Cirsium rivulare (s. oben unter d.)

An quelligen Orten.

Saxifraga (s. oben) **stellaris L.**, sternförmiger St.
Cardamine, XV. Schaumkraut.

C. resedifolia L., resedablätteriges Schaumkraut.
(*Saxifraga rotundifolia* s. May S. 329.)

o) *In Voralpenegegenden auf sandigem, steinigem Boden.*

Silene, X. Leimkraut.

S. inflato Sm., aufgeblasenes L. Var. **A. glabra**
ε. **chlorophylla.**

p) *An steinigem Orten.*

Arenaria, X. Sandkraut.

A. ciliata L., gefranztes Sandkraut.

(*Rosa pyrenaica*, *Corydalis capnoides* s. May S. 330.)

q) *In Voralpenegegenden an sumpfigen Orten.*

(*Vignea capitata* s. May S. 330.)

r) *In Voralpenthälern.*

(*Helleborus altifolius*, *H. niger*, *Cardamine trifolia*, *Viola biflora*, *Lunaria rediviva*, *Pinus obliqua* s. May S. 330.)

s) *Auf Voralpen-Triften.*

Linum, V. Lein, Flachs.

L. viscosum L., klebriger Lein.

Rumex, VI. Ampfer.

R. alpinus L., Alpen-A., falsche Rhabarber.

Horminum, XIV. Horminum.

H. pyrenaicum L., pyrenäische Melisse.

Aster, XIX. Sternblume.

A. alpinus L., Alpen-Sternblume.

(*Gentiana acaulis*, *G. angustifolia* s. May S. 331.)

t) *In Voralpenwäldern.***Valeriana tripteris** (s. oben unter c).**Scabiosa**, IV. Scabiose.

Sc. silvatica L., Wald-Scabiose.

Chaerophyllum, V. Kälberkropf.

Ch. nemorosum M. B., Hain-Kälberkropf.

Aquilegia nigricans (s. oben unter a).**Homogyne**, XIX. Alplattig.H. silvestris H. Cass. (Tussilago silvestris Scop.),
Wald-Huflattig.

(Acer Pseudoplatanus s. May S. 331.)

*In Voralpengegenden an waldigen Orten.***Dianthus silvestris** (s. oben unter e).u) *Auf Voralpenwiesen.***Cerinth**e, V. Wachsblume.

C. maculata L., gefleckte Wachsblume.

Ajuga, XIV. Günsel.

A. pyramidalis L., pyramidenförmiger Günsel.

Hieracium, XIX. Habichtskraut.

H. aurantiacum L., pomeranzenfarbiges H.

Geracium, XIX. Sperberkraut.G. aureum (Leontodon aureum L.), goldfar-
bener, rothgelber Löwenzahn.*In Voralpen auf feuchten Wiesen.***Gentiana**, V. Enzian.

G. utriculosa L., bauchiger Enzian.

111) *In Vorhölzern.***Melica**, III. Perlgras.M. ciliata L., gefranztes, wolliges Perlgras,
haariges Waldgras.**Elymus**, III. Haargras.

E. europaeus L., europäisches H., Wald-H.

In Vorhölzern.

Brachypodium, III. Kurzstielchen.

Br. gracile *P. B.* (*Bromus gracilis Weig.*),
schlanke Trespe.

Pulmonaria, V. Lungenblume.

P. azurea *Bess.*, lazurblaue Lungenblume.

Symphytum, V. Beinwell.

S. tuberosum *L.*, knollige B. oder Beinwurz.
(In schattigen Bergwaldungen.)

Pyrola, X. Birnkraut.

P. rotundifolia *L.*, rundblättriges Birnkraut oder
Wintergrün.

Fragaria, XII. Erdbeere.

Fr. elatior *Ehrh.* (*Fragaria vesca* β . *pratensis L.*),
grossblumige E., grosse Wald-E., rauhe oder
aromatische Erdbeere.

Trifolium, XVII. Klee.

Tr. agrarium *L.*, gelber Acker-Klee, Gold-Kl.,
Hopfen-Klee.

(*Melica nutans*, *Cytisus hirsutus* s. May S. 331.)

112) *An und in Wäldern und waldigen Orten.*

A. An Waldrändern.

Veronica, II. Ehrenpreis.

V. latifolia *L.*, breitblättriger Ehrenpreis.

Bromus, III. Trespe.

Br. sterilis *L.*, unfruchtbare, taube Trespe,
Taubhafer.

Plantago, IV. Wegerich.

Pl. Cynops *L.*, strauchartiger Wegerich.

Verbascum, V. Wollkraut.

V. nemorosum *Schrad.*, Wald-Königskerze.

Campanula, V. Glockenblume.

C. rapunculoides *L.*, rapunzelartige Glockenbl.

An Waldrändern.

Oenanthe, V. Rebendolde.

O. *Lachenalii* Gm., Lachenals Rebendolde.

Porrum, VI. Porrey.

P. *Scorodoprasum* L., Rocambole, Schlangen-Knoblauch.

Dianthus, X. Nelke.

D. *prolifer* L., sprossende Nelke, Kopf-Nelke.

Agrostemma, X. Rade.

A. *Coronaria* L., gekrönte Rade, Garten-Rade, Sammetröschen, Vexirnelke.

Lychnis, X. Lichtnelke.

L. *dioica* L. (L. *vespertina* Sibth.), Wiesen-L., Abend-L., Lichtröschen, weisses Marienröschen.

Rosa, XII. Rose.

R. *alba* L., weisse Rose.

R. *arvensis* Huds., Feld-Rose.

R. *geminata* Rau., Zwillings-Rose.

R. *inodora* Fr. et Hook., geruchlose Rose.

R. *micrantha* Sm., kleinblumige Rose.

R. *rubiginosa* L., rostfarbige Rose, Wein-Rose.

Rubus, XII. Himbeere, Brombeere.

R. *affinis* Weihe, verwandte Brombeere.

R. *caesius* L., Kratzbeere. Var. γ . Rubus *Pseudo-caesius* Lej.

R. *nitidus* Weihe.

Tilia, XIII. Linde.

T. *pyramidalis* Host., pyramidenförmige Linde.

Carduus, XIX. Distel.

C. *nutans* L., nickende Distel. Var. β . Carduus *involucratus* Beck.

(Veronica Chamaedrys, V. serpyllifolia, Festuca nemorum, Lonicera Caprifolium, L. pallida, Rhamnus catharticus, Evonymus europaeus, E. latifolius, Viola canina, Thesium Linophyllum, Chaerophyllum bulbosum, Ch. silvestre, Vi-

An Waldrändern.

burnum Opulus, Convallaria verticillata, Dianthus Armeria, D. atrorubens, Silene dichotoma, Euphorbia salicifolia, Crataegus oxyacantha, Mespilus vulgaris, Rosa hybrida, R. repens, Potentilla canescens, P. inclinata, Hesperis tristis, Hypericum barbatum, Carex hirta s. May S. 332 f.)

An Waldrändern in Gebirgen.

Euphorbia, XI. Wolfsmilch.

E. amygdaloides L., mandelblättrige Wolfsm.

An Waldrändern in Gehauen.

Lathyrus, XVII. Platterbse.

L. silvestris Dod. L., Wald-Platterbse.

An Waldrändern auf Sandboden.

Silene, X. Leimkraut.

S. Armeria L., Garten-Silene, Morgenröschen.

An lichten Waldrändern.

Ligustrum, II. Hartriegel.

L. vulgare L., gemeiner Hartriegel, Rainweide, Rheinweide.

(Rubus fruticosus, R. suberectus s. May S. 334.)

An trocknen Waldrändern.

(Hieracium obscurum s. May S. 334.)

B. In Wäldern.

Veronica, II. Ehrenpreis.

V. officinalis L., gebräuchlicher, heilsamer E.

Leucoium, VI. Knotenblume.

L. aestivum L., Sommer-Knotenblume.

Stellaria, X. Sternkraut.

St. Dilleniana Mnch., Dillenisches Sternkraut.

Euphorbia, XI. Wolfsmilch.

E. pilosa L., behaarte Wolfsmilch.

Myrtus, XII. Myrte.

M. communis L., gemeine Myrte.

*In Wäldern.***Rosa, XII.** Rose.R. Jundzilliana *Bess.*, Jundzillische Rose.**Rubus, XII.** Himbeere, Brombeere.R. corylifolius *Sm.*, haselnussblättrige Br.R. hirtus *Waldst. Kit.*, rauhe Brombeere.R. Schleicheri *Weihe*, Schleicher's Brombeere.**Tilia, XIII.** Linde.T. europaea *L.*, Sommer-Linde.**Delphinium, XIII.** Rittersporn.D. fissum *W. Kit.*, spaltblättriger Rittersporn.**Dracocephalum, XIV.** Drachenkopf.Dr. Ruyschiana *L.*, ganzblättriger Drachenkopf.**Prunella, XV.** Prunelle.Pr. vulgaris *L.*, gemeine Brunnheil.**Medicago, XVII.** Schneckenklee.M. carstiensis *Wulff.*, karst'scher Schneckenklee.**Lactuca, XIX.** Salat.L. stricta *W. Kit.*, steifer Salat.

(*Festuca duriuscula*, *Scabiosa arvensis*, *Chaerophyllum aromaticum*, *Linum laeve*, *Vaccinium Myrtillus*, *Silene nemoralis*, *Pyrus Malus*, *Ranunculus polyanthemos*, *Alliaria officinalis*, *Orobus albus*, *O. lacteus*, *Hieracium murorum*, *Fagus silvatica*, *Tamus communis* s. May S. 334 ff.)

a) *In Wäldern an grasigen Anhöhen.***Campanula, V.** Glockenblume.C. glomerata *L.*, knauelförmige Glockenblume.b) *In rauhen Berggegenden.*

(Evonymus verrucosus s. May S. 336.)

c) *An feuchten, schattigen Orten.*

(Carex Agastachys s. May S. 336.)

d) *In Gebirgen und Voralpen.*

(Acer Pseudoplatanus s. May S. 336.)

e) *In Wäldern zwischen Gebüsch.*

Pyrethrum, XIX. Bertramswurz.

P. corymbosum W. (*Chrysanthemum corymbosum L.*), doldentraubige B. od. Wucherblume.

f) *Auf Kalkhügeln.*

(*Cytisus falcatus* s. May S. 336.)

g) *An quelligen Orten.*

(*Larbraea uliginosa* s. May S. 337.)

h) *Auf sandigem Boden.*

Dianthus, X. Nelke.

D. diminutus L.

i) *An schattigen Orten.*

Geum, XII. Benediktenkraut.

G. urbanum L., wahres B., gemeine Nelkenwurz.

k) *An steinigen Orten.*

Rubus, XII. Himbeere, Brombeere.

R. tomentosus Bork., filzige Brombeere.

(*Rubus idaeus* s. May S. 337.)

l) *In Wäldern der Voralpen.*

Scabiosa, IV. Scabiose.

Sc. silvatica L., Wald-Scabiose.

(*Valeriana tripteris* s. May S. 337.)

m) *In bergigen Wäldern.*

(*Melica uniflora* s. May S. 337.)

n) *In dunkeln Wäldern.*

Prunella, XIV. Prunelle.

Pr. vulgaris L., gemeiner Brunnheil. Var. γ .
parviflora.

o) *In felsigen Wäldern.*

Geranium, XVI. Storchschnabel.

G. sanguineum L., blutrother Storchschnabel,
rothe Hühnerwurz, Blutkraut.

p) *In feuchten, schattigen Wäldern.*

(*Aremonia agrimonioides* s. May S. 337.)

q) *In lichten Wäldern.*

Viola, V. Veilchen.

V. canina L., Hunds-V., Wald-V. Var. *δ. lucorum*.

r) *In schattigen Wäldern.*

Myosotis, V. Vergissmeinnicht.

M. silvatica Ehrh.. Wald-Vergissmeinnicht.

(*Veronica urticaefolia*, *Arenaria trinervia*, *Arabis nemorensis* s. May S. 338.)

s) *In trocknen Wäldern.*

Rubus, XII. Himbeere, Brombeere.

R. candicans Weihe, weissliche Brombeere.

R. rhamnifolius Weihe, kreuzdornblättrige Br.

Genista, XVII. Ginster.

G. tinctoria L., Färbe-Ginster.

Orobis, XVII. Walderbse.

O. niger L., schwarze Walderbse.

Trifolium, XVII. Klee.

Tr. agrarium L., gelber Acker-Klee.

Tr. alpestre L., Wald-Klee, rother Berg-Klee, rother Spitzklee.

Tr. medium L., mittlerer oder bogiger Klee.

Hypericum, XVIII. Hartheu.

H. hirsutum L., haariges H. oder Johanniskraut.

(*Veronica officinalis*, *Galium silvestre*, *Orobanche Rapum*, *Genista germanica* s. May S. 338.)

C. *An waldigen Orten.*

a) *An Waldbächen.*

(*Myosotis laxiflora*, *Chaerophyllum aromaticum* siehe May S. 338 f.)

b) *An Waldbergen.*

(*Polygala Chamaebuxus* s. May S. 339.)

c) *Auf feuchtem Waldboden.*

Lysimachia, V. Lysimachie.

L. Nummularia L., kriechende Lysimachie, Egelkraut, Pfennigkraut.

d) *In Waldgebirgen.*

Cardamine, XV. Schaumkraut.

C. trifolia L., dreiblättriges Schaumkraut.

(Aquilegia platysepala s. May S. 339.)

Auf höhern Waldgebirgen.

Stachys, XIV. Ziest.

St. alpina L., Alpen-Ziest.

In kalkigen Waldgebirgen.

Crepis, XIX. Pippau.

C. alpestris Rchb., Voralpen-Pippau.

Auf schattigen Waldgebirgen.

Cynoglossum, V. Hundszunge.

C. montanum L., Berg-Hundszunge.

e) *In Waldgebüsch.*

Rosa, XII. Rose.

R. silvestris Tabern., Wald-Rose.

Astragalus, XVII. Traganth.

A. glycyphyllos L., süßblättriges Wirbelkraut, wildes Süssholz.

(Geranium pyrenaicum s. May S. 339.)

*In Waldgebüsch an Bächen, Quellen, Wiesen-
gräben.*

(Thalictrum aquilegifolium s. May S. 339.)

An Bergen.

Veronica, II. Ehrenpreis.

V. maritima L., Meerstrands-Ehrenpreis.

An Felsen.

(Potentilla recta s. May S. 339.)

Zwischen Waldgebüsch in Gebirgen.

Lathyrus, XVII. Platterbse.

L. ensifolius Badarro, schwertblättrige Pl.

In Waldgebüsch auf Moorboden.

(*Geum intermedium* und *rivale* s. May S. 340.)

Auf Sandhügeln.

Cirsium, XIX. Kratzdistel.

C. serratuloides Scop. (Cnicus serratuloides W.),
schartenartige Kratzdistel.

In schattigem Waldgebüsch.

Vicia, XVII. Wicke.

V. dumetorum L., Busch-Wicke, Hecken-W.

f) *In Waldgegenden auf feuchten Wiesen.*

Tragopogon, XIX. Bocksbart.

Tr. porrifolius L., lauchblättriger Bocksbart,
blaue Haferwurzel.

An dürrer, waldigen Orten.

Dianthus, X. Nelke.

D. plumarius L., Feder-Nelke, Pfingst-Nelke.

In trocknen Waldgegenden.

(*Lychnis Viscaria, Trifolium montanum* s. May S. 340.)

g) *Auf Waldhügeln.*

Holcus, III. (XXIII.) Pferdegras.

H. mollis L., weiches Pferdegras, kriechendes
Darrgras oder Honiggras.

Verbascum, V. Wollkraut.

V. mixtum Ram.

Vicia, XVII. Wicke.

V. pisiformis L., erbsenartige Wicke.

Hieracium, XIX. Habichtskraut.

H. cymosum L., afterdoldiges Habichtskraut.

(*Fragaria collina, Colutea arborescens, Limodorum abortivum* s. May S. 340 f.)

An Waidhügeln zwischen Gebüsch.

Vicia (s. oben) *silvatica* L., Wald-Wicke.

An grasigen Waldhügeln.

Vicia *tenuifolia* Rth., feinblättrige Wicke.

An sonnigen Waldhügeln.

(*Ophrys apifera*, *O. Arachnites* s. May S. 341.)

An trocknen Waldhügeln.

(*Scorzonera humilis* s. May S. 341.)

h) *Auf Waldplätzen.*

Milium, III. Milisgras.

M. multiflorum Cav., vielblüthiges Milisgras.

Auf feuchten Waldplätzen.

Diplopappus, XIX. Doppelkrone.

D. annuus H. Cass. (*Aster annuus* L.), jährige Aster oder Sternblume.

Auf lichten Waldplätzen.

Orobanche, XIV. Ervenwürger.

O. coerulea Vill., blauer E. Var. *O. Millefolii* Rchb. (Auf *Achillea Millefolium*.)

Auf schattigen Waldplätzen.

(*Cardamine silvatica*, *Lapsana communis* s. May S. 341.)

Auf sonnigen, trocknen Waldplätzen.

Anthericum, VI. Zaunlilie.

A. Liliago L., astlose Zaunblume.

A. ramosum L., ästige Zaunblume.

An steinigen Waldplätzen.

(*Aremonia agrimonioides* s. May S. 342.)

An trocknen Waldplätzen.

Agrostis, III. Straussgras.

A. canina L., Hunds-Straussgras, Haargras.

i) *In Waldsümpfen.*

(*Scirpus silvaticus*, *Stellaria glauca*. — *Carex glauca* s. May S. 342.)

k) *In feuchten Waldthälern.*

Cerastium, X. Hornkraut.

C. silvaticum *W. Kit.*, Wald-Hornkraut.

l) *Auf Waldtriften.*

(*Tormentilla erecta* s. May S. 342.)

m) *In Waldungen.*

Poa, III. Rispengras.

P. nemoralis *L.*, Hain-Rispengras.

Agropyrum, III. Queckengras.

A. caninum *R.S.* (*Triticum caninum* *L.*), Hunds-Queckengras, Hunds-Haargras, Hunds-Weizen, rothe Quecke.

Brachypodium, III. Kurzstielchen.

Br. pinnatum *P.B.* (*Bromus pinnatus* *L.*), gefiedertes K., gefiederte Trespe.

Aethusa, V. Gleise.

A. Cynapium *L.*, gemeine Gleise, kleiner Schierling, Hundspetersilie.

In Waldungen auf Sandplätzen.

Senecio, XIX. Kreuzkraut.

S. silvaticus *L.*, Wald-Kreuzkraut.

(*Ornithopus perpusillus* s. May S. 342.)

In Waldungen am Ufer der Bergströme.

Spiraea, XII. Spiere.

Sp. salicifolia *L.*, weidenblättrige Spierstaude.

In feuchten Waldungen.

Calamagrostis, III. Reithgras.

C. silvatica *P.B.* (*Agrostis arundinacea* *L.*), rohrartiger Windhalm.

(*Cardamine amara* s. May S. 343.)

In feuchten Voralpen-Waldungen an Gebirgsbächen.

Festuca, III. Schwingel.

F. latifolia Host., breitblättriger Schwingel.

In hellen Waldungen.

(*Pyrola minor* s. May S. 343.)

In sandigen Waldungen zwischen Gebüsch.

Corydalis, XVII. Helmbusch, Lerchensporn.

C. claviculata Pers. (*Fumaria claviculata* L.),
gabeltragender H. od. L.

In schattigen Waldungen.

Tormentilla, XII. Tormentille.

T. reptans L., kriechende Rothwurz.

(*Ilex Aquilegifolium* s. May S. 343.)

In trocknen Waldungen.

Valeriana, III. Baldrian.

V. officinalis L., gemeiner Baldrian. Var. α .

Valeriana pratensis Dierb.

Hypericum, XVIII. Hartheu

H. montanum L., Berg-Johanniskraut.

(*Galium silvestre* s. May S. 343.)

n) *An Waldwegen.*

Elymus, III. Haargras.

E. europaeus L., europäisches H., Wald-H.

o) *Auf Waldwiesen.*

Echium, V. Natterwurz.

E. rubrum Jacq., rother Natterkopf.

Verbascum, V. Wollkraut

V. austriacum Schott., österreichisches W.

Hypochaeris, XIX. Ferkelkraut.

H. maculata L., geflecktes Ferkelkraut.

Auf Waldwiesen.

Gymnadenia, XX. Nacktdrüse.

G. conopsea R. Br. (Orchis conopsea L.), fliegenartiges Knabenkraut.

Orchis, XX. Knabenkraut.

O. maculata L., geflecktes Kn., Händelkrautweibchen.

(Gladiolus communis, Iris graminea, Leontodon hastilis, Platanthera bifolia, Listera ovata s. May S. 344.)

Auf Waldwiesen an feuchten, schattigen Plätzen.

(Carex Agastachys s. May S. 344.)

Auf Waldwiesen in Gebirgsgegenden.

Trifolium, XVII. Klee.

Tr. elegans Savi., zierlicher Klee.

(Cineraria campestris s. May S. 344.)

Auf Waldwiesen der Kalkgebirge.

(Trifolium rubens s. May S. 344.)

Auf feuchten Waldwiesen.

Veronica, II. Ehrenpreis.

V. arguta Schrad.

(Myosotis laxiflora, Chaerophyllum aromaticum, Ophrys aranifera, Vignea vulpina s. May S. 345.)

Auf hohen Waldwiesen.

Himantoglossum, XX. Riemenzunge.

H. viride R. (Satyrium viride L.), grüne Ragwurz.

Auf nassen Waldwiesen.

(Aceras anthropophora s. May S. 345.)

Auf sandigen Waldwiesen.

(Euphorbia dulcis s. May S. 345.)

Auf schattigen, sumpfigen Waldwiesen.

Cardamine, XV. Schaumkraut.

C. parviflora L., kleinblüthiges Schaumkraut.

Auf trocknen, sandigen Waldwiesen.

Thalictrum, XIII. Wiesenraute.

Th. galioides Nestl., labkrautartige Wiesenraute.

Auf trocknen, steinigen Waldwiesen.

Peucedanum, V. Haarstrang.

P. officinale L., gemeiner H., Schwefelwurz.

113) *Auf Wällen.*

Linum, V. Lein, Flachs.

L. marginatum Poir., hautrandiger L. od. Fl.

Cardaria, XV. Cardarie.

C. Draba Desv. (*Cochlearia Draba L.*), hungerblumenartiges Löffelkraut, doldentragende Kresse.

(*Euphorbia Gerardiana*, *Erysimum diffusum*, *Trifolium nigrescens* s. May S. 345.)

114) *An und in Wasser.*

a) *An stehendem Wasser.*

(*Bulliarda Vaillantii* s. May S. 345.)

b) *An Wassergräben.*

Oenanthe, V. Rebendolde.

O. silaifolia M. B., silaublätterige Rebendolde.

(*Vigna repens* s. May S. 346.)

c) *An wasserreichen Orten.*

Calamagrostis, III. Reithgras.

C. stricta P. B. (*Arundo stricta Timm.*), steifähriges Rohr.

d) *In Wasser.*

Potamogeton, IV. Laichkraut.

P. acutifolius Lk., spitzblätteriges L. od. Saamkraut.

P. altifolius M. K., stumpfblätteriges L. od. S.

P. pusillus L., kleines L. oder Saamkraut.

P. spatulatus K. et Liz., spatelförmiges L. od. S.

In Wasser.

Sagittaria, XXI. Pfeilkraut.

S. sagittaefolia L., gemeines Pfeilkraut.

e) *In fliessendem Wasser.*

(*Larrea uliginosa* s. May S. 346.)

In langsam fliessenden Wässern.

Hippuris, I. Tannenwedel.

H. vulgaris L., gemeiner T. Var. β . *fluitans*.

f) *In halbsalzigem Wasser.*

Ranunculus, XIII. Ranunkel, Hahnenfuss.

R. tripartitus De C., dreitheiliger Ranunkel oder Hahnenfuss.

g) *In stehendem Wasser.*

Potamogeton (s. oben) lucens L., glänzendes Laichkraut oder Saamkraut.

Alisma, VI. Froschlöffel.

A. natans L., schwimmender Froschlöffel.

A. Plantago L., gemeiner Fr., Wasser-Wegerich.

Nuphar, XIII. Nixblume.

N. luteum Sm. (*Nymphaea lutea L.*), gelbe Seerose.

Nymphaea, XVIII. Seeblume.

N. alba L., weisse Seerose.

Ranunculus (s. oben) aquatilis, Wasser-Ranunkel.

R. circinnatus Sibth., aufgerolltblättriger R.

Myriophyllum, XXI. Tausendblatt.

M. alternifolium De C., wechselblättriges T.

M. pectinatum De C., kammförmiges Tausendbl.

M. spicatum L., ährenförmiges Tausendblatt.

(*Lemna gibba*, *L. minor*, *L. polyrrhiza*, *L. trisulca* siehe May S. 346.)

115) *An Wegen.*

Salvia, II. Salbey.

S. verticillata L., quirlförmige Salbey.

Gastridium, III. Bandgras.

G. lendigerum Gaud. Lk. (*Milium lendigerum L.*),
ährentragendes Hirsegras.

Eragrostis, III. Liebesgras.

E. megastachya Lk. (*Briza Eragrostis L.*), gross-
ähriges Rispengras

Poa, III. Rispengras.

P. trivialis L., gemeines R., Knotengras.

Hordeum, III. Gerste.

H. pratense Huds., Wiesen-Gerste.

Catapodium, III. Lolchschwingel.

C. Halleri (*Triticum Halleri Vio.*), Hallers-
Weizen.

Agropyrum, III. Queckengras.

A. glaucum R. S. (*Triticum glaucum Desf.*),
blaugrünes Q., blaugrüner Weizen.

A. repens P. B. (*Triticum repens L.*), kriechen-
der Weizen, Graswurzel, Quecke, Pädergras.

Scabiosa, IV. Scabiose.

Sc. hybrida All., Bastard-Scabiose.

Plantago, IV. Wegerich.

Pl. maritima L., Meerstrands-Wegerich. Var.
α. leptophylla.

Pl. media L., mittlerer Wegerich.

Galium, IV. Labkraut.

G. spurium L., Bastard-Labkraut.

Echium, V. Natterwurz.

E. italicum L., italienischer Natterkopf.

E. vulgare L., gemeiner Natterkopf.

E. Wierzbickii Habrl., Wierzbicks Natterkopf.

An Wegen.

Verbascum, V. Wollkraut.

V. Blattaria *L.*, Motten-Königskerze.

V. floccosum *W. Kit.*, flockige Königskerze.

V. phlomoides *L.*, windblumenartige Königskerze.

V. pulverulentum *Vill.*, bestäubte Königskerze.

Eryngium, V. Mannstreu.

E. campestre *L.*, Feld-Mannstreu.

Rumex, VI. Ampfer.

R. pulcher *L.*, schöner Ampfer.

Tribulus, X. Burzeldorn.

Tr. terrestris *L.*, gemeiner Burzeldorn.

Silene, X. Leimkraut.

S. inflata *Sm.*, aufgeblasenes *L.* Var. A. glabra
γ. oleracea *Fic.*

Agrimonia, XI. Odermennig.

A. Eupatoria *L.*, gemeiner O., Leberklette,
Steinwurz.

Reseda, XI. Wau.

R. Luteola *L.*, gelblicher Wau, Färber-Wau,
Gilbkraut.

Potentilla, XII. Fingerkraut.

P. argentea *L.*, silberweisses Fingerkraut.

Glaucium, XIII. Hornmohn.

Gl. rubrum *Sibth. Sm.*, rother Hornmohn.

Tilia, XII. Linde.

T. pyramidalis *Host.*, pyramidenförmige Linde.

Prunella, XIV. Prunelle.

Pr. vulgaris *L.*, gemeiner Brunnheil.

Rapistrum, XV. Rapsdotter.

R. perenne *All.* (*Myagrum perenne L.*), aus-
dauernder Dotter.

Sisymbrium, XV. Rauke.

S. pannonicum *Jacq.*, ungarische Rauke.

An Wegen.

Diploaxis, XV. Rampe.

D. tenuifolia De C. (*Sisymbrium tenuifolium L.*),
dünnblättrige Rampe oder Rauke.

Abutilon, XVI. Sammetpappel.

A. Avicennae Gärtn. (*Sida Abutilon L.*), ge-
meine Sida.

Astragalus, XVII. Traganth.

A. asper Jacq., scharfes Wirbelkraut.

Trifolium, XVII. Klee.

Tr. conicum Pers., kegelförmiger Klee.

Helminthia, XIX. Wurmlattig.

H. echioides Gärtn. (*Picris echioides L.*), scharf-
blättriger Wurmsalat.

Carduus, XIX. Distel.

C. nutans L., nickende D., Bisam-D., grosse
Bach-Distel.

C. polyanthemos L., vielblumige Distel.

Cirsium, XIX. Kratzdistel

C. acaule All. (*Cnicus acaulis Willd.*), stiel-
loses Kratzkraut.

Achillea, XIX. Garbe.

A. Millefolium L., gemeine Schaafgarbe.

Centaurea, XIX. Flockenblume.

C. Jacea L., gemeine Flockenblume.

Urtica, XXI. Nessel.

U. dioica L., zweihäusige N., grosse Brenn-N.

(*Veronica prostrata*, *V. serpyllifolia*, *Salvia pratensis*,
Alopecurus creticus, *Agrostis vulgaris*, *Briza maxima*, *Poa*
bulbosa, *Lophochloa phleoides*, *Bromus mollis*, *Br. tecto-*
rum, *Lagurus ovatus*, *Imperata cylindrica*, *Hordeum mari-*
timum, *Triticum villosum*, *Catapodium loliaceum*, *Agropy-*
rum cristatum, *Cynosurus echinatus*, *Scabiosa arvensis*, *Plan-*
tago serpentina, *Cynoglossum pictum*, *Anchusa azurea*, *Myoso-*
tis versicolor, *Campanula rotundifolia*, *Polygonum aviculare*,
Silene dichotoma, *Cerastium triviale*, *Euphorbia salicifolia*,

An Wegen.

E. stricta, *E. virgata*, *Rosa andegavensis*, *R. farinosa*, *Potentilla Anserina*, *Ranunculus bulbosus*, *Alyssum calycinum*, *A. minimum*, *Berteroa incana*, *Capsella Bursa pastoris*, *Lepidium perfoliatum*, *Isatis tinctoria*, *Myagrum perfoliatum*, *Sisymbrium officinale*, *Erodium malacoides*, *Cytisus austriacus*, *C. leucanthus*, *Medicago lupulina*, *Taraxacum officinale*, *Scorzonera laciniata*, *Carex hirta* s. May S. 346—50.)

116) *Auf Weideplätzen.*

(*Vulpia bromoides*, *Vignea caespitosa*. — *Ranunculus Thora* s. May S. 350 f.)

Auf feuchten Weideplätzen.

Juncus, VI. *Simse*.

J. compressus Jacq., knollige *Simse*.

Auf trocknen Weiden.

Cirsium, XIX. *Kratzdistel*.

C. acaule All. (*Cnicus acaulis Willd.*), stielloses *Kratzkraut*.

(*Pollinia Gryllus* s. May S. 351.)

117) *An Weihern* (s. an Teichen).118) *An und in Weinbergen.*

Jasminum, II. *Jasmin*.

J. officinale L., gemeiner *Jasmin*.

Melica, II. *Perlgras*.

M. ciliata L., gefranztes, wolliges *Perlgras*, haariges *Waldgras*.

Sorghum, III. *Sorghogras*.

S. halepense Pers. (*Holcus halepensis L.*), aleppisches *Pferdegras* oder *Bartgras*.

Lolium, III. *Lolch*.

L. arvense With., *Acker-Lolch*.

L. robustum Rchb.

An und in Weinbergen.

Scabiosa, IV. Scabiose.

Sc. hybrida *All.*, Bastard-Scabiose.

Galium, IV. Labkraut.

G. saccharatum *All.* (*Vaillantia Aparine L.*),
Zuckerfrucht-Labkraut.

Asterolinum, V. Stern-Lein.

A. stellatum *Lk.* (*Lysimachia Linum stellula-*
tum L.), kleinblättrige Lysimachie.

Verbascum, V. Wollkraut.

V. Blattaria *L.*, Motten-Königskerze.

Physalis, V. Schlutte.

Ph. Alkekengi *L.*, gemeine Schl. od. Judenkirsche.

Campanula, V. Glockenblume.

C. lunariaefolia *W.*, mondveilblättrige Gl.

C. simplex *De C.*

Physospermum, V. Blasensaame.

Ph. aquilegifolium *Koch.* (*Ligusticum aquilegi-*
folium W.), akeleiblättriger Liebstöckel.

Linum, V. Lein, Flachs.

L. viscosum *L.*, klebriger Lein oder Flachs.

Porrum, VI. Porrey.

P. sphaerocephalum (*Allium spaerocephalon L.*),
rundköpfiger Lauch.

Asphodelus, VI. Affodill.

A. fistulosus *L.*, röhriger Affodill.

Silene, X. Leimkraut.

S. silvestris *Schott.* β . *Silene quinquevulnera L.*,
fünffleckige Silene.

Reseda, XI. Wau.

R. Phyteuma *L.*, kleine Resede.

Rosa, XII. Rose.

R. spinosissima *L.*, Stachelrose.

R. tomentosa *Sm.*, filzige Rose.

*An und in Weinbergen.***Teucrium**, XIV. Gamander.

T. Botrys L., Trauben-Gamander.

Phlomis, XIV. Phlomis.

Phl. tuberosa L., knollige Phlomis.

Orobanche, XIV. Ervenwürger.

O. alba Steph., weisser Ervenwürger.

Abutilon, XVI. Sammetpappel.

A. Avicennae Gärtn. (Sida Abutilon L.), gemeine Sida.

Althaea, XVI. Eibisch.

A. pallida W. Kit., bleicher Eibisch.

Melilotus, XVII. Melote.

M. Petitpierreana W. (Trifolium Petitpierreanum Hayne), Fetitpierreanische Melote.

(Veronica acinifolia, Gladiolus communis, Alopecurus creticus, Phalaris paradoxa, Pollinia Gryllus, Briza maxima, Lagurus ovatus, Imperata cylindrica, Cynosurus echinatus, Symphythum macrolepis, Anchusa azurea, Tordilium maximum, Trinia pumila, Bupleurum protractum, Anthriscus nodosa, Caucalis leptophylla, Torilis nodosa, Muscari comosum, M. racemosum, Albucea nutans, Ornithogalum pyrenaicum, Dianthus Armeria, Euphorbia salicifolia, Rosa gallica, R. trachyphylla, R. turbinata, Fragaria virginiana, Bunias Erucago, Geranium lucidum, Fumaria parviflora, Cytisus leucanthus, Astragalus Cicer, A. exscapus, Arthrolobium scorpioides, Hypericum elegans, Hieracium cymigerum, Lactuca perennis, Tragopogon major, Aristolochia Clematitis, A. rotunda. — Ajuga Chamaepithys. — Brassica cheiranthiflora s. May S. 351 — 55.)

119) *Auf Wiesen.*

(Vergl. Bergwiesen, Gebirgswiesen, Waldwiesen.)

Veronica, II. Ehrenpreis.

V. latifolia L., breitblättriger-Ehrenpreis.

V. maritima L., Meerstrands-Ehrenpreis.

Auf Wiesen.

Iris, III. Schwertel.

I. spuria L., Bastard-Schwertlilie.

Phleum, III. Lieschgras.

Phl. pratense L., Wiesen-Lieschgras.

Poa, III. Rispengras.

P. trivialis L., gemeines R., Knotengras.

Avena, III. Hafer.

A. pubescens L., weichhaariger Hafer.

Dactylis, III. Knanelgras.

D. glomerata L., gemeines Kn., Hundsgras.

Hordeum, III. Gerste.

H. pratense Huds., Wiesen-Gerste.

Cynosurus, III. Kammgras.

C. cristatus L., gemeines Kammgras.

Asterocephalus, IV. Kronen-Scabiose.

A. columbarius (Scabiosa columbaria L.), Tauben-Scabiose.

Plantago, IV. Wegerich.

Pl. decumbens Bernh.

Sanguisorba, IV. Wiesenknopf.

S. auriculata Scop., geöhrter Wiesenknopf.

S. officinalis L., gemeiner W., unächter Bibernell.

Symphytum, V. Beinwell.

S. patens Sibth., offenkelchige Beinwell.

Verbascum, V. Wollkraut.

V. mixtum Ram.

Polemonium, V. Sperrkraut.

P. coeruleum L., blaues Sperrkraut.

Daucus, V. Möhre.

D. Carota L., gemeine M., gelbe Rübe.

Linum, V. Lein, Flachs.

L. catharticum L., Purgir-L., kleiner Wiesen-Fl.

Leucoium, VI. Knotenblume.

L. aestivum L., Sommer-Knotenblume.

Auf Wiesen.

Rumex, VI. Ampfer.

R. pratensis *M. K.*, Wiesen-Ampfer.

Agrimonia, XI. Odermennig.

A. Eupatoria *L.*, gemeiner Odermennig, Leberklette, Steinwurz.

Orobanche, XIV. Ervenwürger.

O. coerulea *Vill.*, blauer E. Var. *Orobanche Millefolii* *Rchb.* (Auf *Achillea Millefolium*.)

Cardamine, XV. Schaumkraut.

C. pratensis *L.*, Wiesen-Sch. Var. β . *Cardamine Hayneana* *Welw.*, Hayne'sches Sch.

Erodium, XVI. Reiherschnabel.

E. pimpinellifolium *Sm.* (*Geranium pimpinellifolium* *Cav.*), bibernellblättriger R. oder Storchschnabel.

Geranium, XVI. Storchschnabel.

G. pratense *L.*, Wiesen-Storchschnabel.

Polygala, XVII. Kreuzblume.

P. oxyptera *Rchb.*, spitzflügeliges Kreuzblümchen.

Genista, XVII. Ginster.

G. nervata *Kit.*, genervtblättriger Ginster.

G. sibirica *L.*, sibirischer Ginster.

Vicia, XVII. Wicke.

V. grandiflora *Scop.*, grossblumige Wicke.

Astragalus, XVII. Traganth.

A. arenarius *L.*, Sand-Wirbelkraut.

Oxytropis, XVII. Spitzfahne.

O. montana *De C.* (*Astragalus montanus* *L.*), Berg-Spitzfahne.

Trifolium, XVII. Klee.

Tr. procumbens *L.*, niederliegender Kl., gelber Feld-Klee.

*Auf Wiesen.***Crepis, XIX.** Pippau.

Cr. biennis L., zweijähriger Pippau.

Cr. lodomeriensis Bess., lodomirischer Pippau.

Arnica, XIX. Wolverley, Wohlverleih.

A. montana L., Berg-W., ächte, wahre W.

Achillea, XIX. Garbe.

A. Millefolium L., gemeine Schaafgarbe.

Centaurea, XIX. Flockenblume.

C. sordida W., schmutzige Flockenblume.

(Veronica Chamaedrys, V. serpyllifolia, Salvia pratensis, Gladiolus Boucheanus, Iris sibirica, Alopecurus nigricans, A. pratensis, Pollinia Gryllus, Agrostis stolonifera, Holcus lanatus, Poa pratensis, Festuca duriuscula, F. pratensis, Bromus mollis, Arrhenatherum avenaceum, Cynosurus echinatus, Galium lucidum, G. Mollugo, Alchimilla vulgaris, Symphytum officinale, Campanula patula, Gentiana acaulis, Pimpinella magna, Chaerophyllum silvestre, Rumex Acetosa, Stellaria graminea, Lathraea uliginosa, Euphorbia virgata, Spiraea Filipendula, Thalictrum flexuosum, Alectorolophus minor, Lathyrus pratensis, L. sepium, Vicia onobrychioides, V. pannonica, V. sepium, V. sordida, Trifolium nigrescens, Tr. pratense, Barkhausia bursifolia, B. hispida, B. taraxacifolia, Leontodon hispidus, Tragopogon pratensis, Chrysanthemum Leucanthemum, Cineraria arachnoidea, Vigna canescens, Carex hirta s. May S. 355 — 59.)

a) *Auf Wiesen an feuchten, schattigen Orten.*

(Carex Agastachys s. May S. 359.)

b) *Auf Wiesen an Flussufern.***Thalictrum, XIII.** Wiesenraute.

Th. medium Jacq., mittlere Wiesenraute.

c) *Auf Wiesen in Gebirgsgegenden.*

(Geranium phaeum s. May S. 359.)

*Auf Wiesen der höheren Gebirge.***Poa, III.** Rispengras.

P. sudetica Haenke, Riesengebirgs-Rispengras.

Auf Wiesen in Gebirgswäldern.

Cineraria, XIX. Asshenpflanze.

C. spatulaefolia Gm., spatelblättrige A.

d) *Auf Wiesen an Kalkbergen.*

Astragalus, XVII. Traganth.

O. Onobrychis L., langfahniges Wirbelkraut.

(*Polygala amara*, *P. austriaca*. — *Astragalus austriacus* s. May S. 359.)

e) *Auf Wiesen der Voralpen.*

Cerinthe, V. Wachsblume.

C. maculata L., gefleckte Wachsblume.

Ajuga, XIV. Günsel.

A. pyramidalis L., pyramidenförmiger Günsel.

Orobanche, XIV. Ervenwürger.

O. gracilis Sm., schlanker E., schlanke Sommerwurz. (An *Lotus corniculatus*, *L. siliculosus*, *Hippocrepis comosa*, *Dorycnium herbaceum*.)

Vignea, XXI. Segge.

V. saxatilis (*Carex saxatilis L.*), Klippen-Segge, Klippen-Riedgras.

(*Bellidiastrum Michellii* s. May S. 359.)

f) *Auf fetten Wiesen.*

(*Lychnis Flos cuculi* s. May S. 360.)

g) *Auf feuchten Wiesen.*

Schoenus, III. Knopfgras.

Sch. nigricans L., schwärzliches Knopfgras.

Beckmannia, III. Beckmannie.

B. erucaeformis Host. (*Phalaris erucaeformis L.*), raukenförmige Beckmannie.

Agrostis, III. Straussgras.

A. canina L., Hunds-Str., Haargras.

Aira, III. Schmiele.

A. caespitosa L., Rasen-Schmiele, Glanz-Schm.

Auf feuchten Wiesen.

Galium, IV. Labkraut.

G. boreale L., nördliches Labkraut.

Gentiana, V. Enzian.

G. utriculosa L., bauchiger Enzian.

Silaus, V. Silau.

S. pratensis Bess. (*Peucedanum Silaus L.*),
Wiesen-Haarstrang.

Oenanthe, V. Rebendolde.

O. Lachenalii Gm, Lachenals Rebendolde.

Allium, VI. Lauch.

A. danubiale Spr.

Veratrum, VI. (XXIII.) Germer.

V. album L., weisser G., weisse Niesswurz,
Lauswurz.

V. Lobelianum Bernh., grüner G. (Beide in
der Nähe der Gebirge.)

Triglochin, VI. Dreizack.

Tr. palustre L., Sumpf-Dreizack.

Thalictrum, XIII. Wiesenraute.

Th. angustifolium L., schmalblättrige W. (In
den Ebenen in Gebirgsgegenden.)

Th. nigricans Jacq., schwärzliche W.

Phlomis, XIV. Phlomis.

Phl. tuberosa L., knollige Phlomis.

Galega, XVII. Geisraute.

G. officinalis L., gemeine Geisraute.

Tragopogon, XIX. Bocksbart

T. porrifolius L., lauchblättriger B., blaue
Haferwurzel. (In Waldgegenden.)

Scorzonera, XIX. Haferwurz.

Sc. parviflora Jacq., kleinblumige Haferwurz.

Cirsium, XIX. Kratzdistel.

C. oleraceum All. (*Cnicus oleraceus L.*), ge-
müsartige Kr., Kohldistel, Wiesenkohl.

Auf feuchten Wiesen.

Cirsium tataricum All. (*Carduus tataricus L.*),
tatarische Kratzdistel.

Inula, XIX. Alant

I. salicina L., weidenblättriger Alant.

Orchis, XX. Knabenkraut.

O. haematodes Rchb., blutfleckiges Knabenkraut.

O. mascula L., männliches Kn., grosser Salep.

O. ustulata L., kleines, brandblumiges Kn.

Platanthera, XX. Platanthere.

Pl. brachyglossa (*Orchis bifolia* β . *brachyglossa*
Wallr.), kurzzüngiges Knabenkraut.

Vignea, XXI. Segge.

V. Bönninghauseniana (*Carex Bönninghauseniana Weihe*) Bönninghausen'sche Segge.

(*Pinguicula vulgaris*, *Hierochloa borealis*, *Lolium festu-
caceum*, *Convallaria multiflora*, *Malachium manticum*, *Tor-
mentilla erecta*, *Tetragonolobus siliquosus*, *Hieracium flagel-
lare*, *Gymnadenia odoratissima*, *Vignea caespitosa*, *V. inter-
media*, *Carex Oederi*, *C. tomentosa* s. May S. 360 f.)

Auf feuchten, vorzüglich salzigen Wiesen.

Althaea, XVI. Eibisch.

A. officinalis L., gemeiner Eibisch.

Auf feuchten, sandigen Wiesen.

Carex, XXI. Riedgras.

C. hirta L., kurzhaariges Riedgras.

Auf feuchten, sonnigen Wiesen.

(*Gymnadenia conopsea* s. May S. 361.)

Auf feuchten, sumpfigen Wiesen.

Viola, V. Veilchen.

V. palustris L., Sumpf-Veilchen.

h) *Auf hohen Wiesen.*

Iris, III. Schwertel.

I. squalens L., schmutzfarbige Schwertlilie.

i) *Auf Moorwiesen* (s. oben Nr. 70 k.)

k) *Auf nassen Wiesen.*

Calamagrostis, III. Reithgras.

C. stricta P. B. (*Arundo stricta* Timm.), steif-
ähriges Rohr.

Oenanthe, V. Rebendolde.

O. pimpinelloides L., bibernellartige Rebendolde.

Trifolium, XVII. Klee.

Tr. spadiceum L., castanienbrauner Klee. (In
waldigen Thälern.)

Orchis, XX. Knabenkraut.

O. coriophora L., Wanzen-Knabenkraut.

(*Vignea divisa*, *Carex falva*, *C. Pseudo-Cyperus* siehe
May S. 361 f.)

l) *Auf sandigen Wiesen.*

Silene, X. Leimkraut.

S. viscosa Pers., klebriges Leimkraut.

Auf sandigen feuchten Wiesen.

Carex hirta (s. oben unter g.)

Auf sandigen, trocknen Wiesen.

Festuca, III. Schwingel.

F. vaginata W. K., scheidentragender Schwingel.

Carex, XXI. Riedgras.

C. reflexa Hpp.

(*Pollinia Gryllus*, *Onosma arenarium*, *Thesium Lino-*
phyllum s. May S. 362.)

m) *Auf steinigen Wiesen.*

Milium, III. Milisgras.

M. multiflorum Cav., vielblüthiges Milisgras.

Silene (s. oben) *Pseudo-Otites* Bess.

Medicago, XVII. Schneckenklee.

M. prostrata Jacq., gestreckter Schneckenklee.

Auf steinigen Wiesen.

Chrysanthemum, XIX. Wucherblume.

Chr. montanum L., Berg-Wucherblume.

(*Thesium Linophyllum*, *Hieracium obscurum* s. May S. 362.)

n) *Auf sumpfigen Wiesen.*

Gladiolus, III. Siegwurz.

Gl. imbricatus L., schuppige Siegwurz.

Calamagrostis, III. Reithgras.

C. lanceolata Rth. (*Arundo Calamagrostis L.*),
vielhalmiges Rohr, Wiesenrohr.

Viola palustris (s. oben unter g).

Orobis, XVII. Walderbse.

O. palustris Rchb. (*Lathyrus palustris L.*),
Sumpf-W., Sumpf-Platterbse.

(*Vigna chordorrhiza*, *Carex spicata* s. May S. 363.)

o) *Auf trocknen Wiesen* (vergl. oben unter l.)

Bromus, III. Trespe.

Br. squarrosus L., sparrige Trespe.

Avena, III. Hafer.

A. flavescens L., gelblicher H., Goldhafer, und
Var. *b. lutescens*.

Galium, IV. Labkraut.

G. verum L., ächtes Labkraut, Bettstroh.

Linum, V. Lein, Flachs.

L. marginatum Poir., randkelchiger L. od. Fl.

Orobanche, XIV. Ervenwürger, Sommerwurz.

O. adenostemon Rchb., drüsenmännige Sommer-
wurz. (An *Galium Mollugo*, zwischen Klee
und *Lathyrus pratensis*.)

O. caryophyllacea Sm., gewürzartige Sommer-
wurz. (Zwischen Klee, und *Lathyrus pratensis*.)

O. galii Dub. (An *Galium Mollugo*.)

O. laxiflora Rchb., schlaffblüthiger E., schlaff-
blüthige Sommerwurz.

Auf trocknen Wiesen.

Orobanche strobiligena *Rchb.*, zapfensprossige Sommerwurz. (Zwischen Leguminosen.)

O. torquata *Rchb.*, Halsband-Sommerwurz.

Polygala, XVII. Kreuzblume.

P. comosa *Schk.*, schopfförmiges Kreuzblümchen und Var. β . *Hoppeana*.

Taraxacum, XIX. Pfaffenröhrlein.

T. serotinum *Rchb.*, spätblühendes Pfaffenröhrl.

Cirsium, XIX. Kratzdistel.

C. acaule *All.* (*Cnicus acaulis Willd.*), stiellose K.

Xeranthemum, XIX. Strohblume.

X. cylindraceum *Sm.*, walzenköpfige Str.

Orchis, XX. Knabenkraut.

O. ustulata *L.*, kleines, brandblumiges Kn.

(*Salvia variegata*, *Chilochloa Boehmeri*, *Festuca ovina*, *F. pannonica*, *Viola rothomagensis*, *Carum Carvi*, *Tragopogon undulatus*. — *Arabis hirsuta* s. May S. 363.)

p) *Auf feuchtem Wiesenboden.*

Lysimachia, V. Lysimachie.

L. Nummularia *L.*, kriechende L., Egelkraut, Pfennigkraut.

q) *An Wiesengräben.*

Nasturtium, XV. Brunnenkresse.

N. microphyllum *Bnng.*, kleinblättrige Brunnenkresse. (Auf Moorboden.)

(*Nasturtium officinale* s. May S. 363. — *Thalictrum aquilegifolium* s. May S. 364.)

r) *Auf Wiesenhügeln.*

Anthericum, VI. Zaunlilie.

A. ramosum *L.*, ästige Zaunblume.

s) *An Wiesenrändern.*

Betonica, XIV. Betonie.

B. officinalis *L.*, gemeine B., ächtes Zehrkraut.

Auf trocknen Wiesenhügeln.

Festuca, III. Schwingel.

F. inermis De C. (*Bromus inermis L.*), gran-
nenloser Schwingel, wehrlose Trespe.

Eryngium, V. Mannstreu.

E. planum L., flachblättrige Mannstreu.

Lathyrus, XVII. Platterbse.

L. tuberosus L., knollige Platterbse, Erdmandel,
Erdnüsschen.

(*Veronica Chamaedrys*, *Agrostis vulgaris*, *Albucea nu-
tans*, *Euphorbia Esula*, *Syrenia cuspidata*, *Hieracium pra-
tense* s. May S. 364.)

120) *Auf wüsten Plätzen.*

Hyoscyamus, V. Bilsenkraut.

H. canariensis Ker., canarisches Bilsenkraut.

Verbascum, V. Wollkraut.

V. condensatum Schrd., dichttraubige Königskerze.

V. phlomoides L., windblumenartige Königs-
k.

V. Thapsus L., gemeines Wollkraut, gemeine,
gelbe Königskerze, Wollblume.

V. thapsiforme Schrad., grossblumiges W.

V. thapsoides L., schmalblättrige Königskerze.

(*Hyoscyamus niger*, *Ornithopus perpusillus* s. May S. 364.)

An feuchten, wüsten Orten.

Ranunculus, XIII. Ranunkel, Hahnenfuss.

R. muricatus L., stachelsaamiger R. od. H.

121) *An Zäunen.*

Melica, III. Perlgras.

M. ciliata L., gefranztes, wolliges P., haariges Waldgr.

Sorghum, III. Sorghogras.

S. halepense Pers. (*Holcus halepensis L.*), alep-
pisches Pferdegras oder Bartgras.

Bromus, III. Trespe.

Br. sterilis L., unfruchtbare , taube Tr., Taubhafer.

An Zäunen.

Avena, III. Hafer.

A. pubescens *L.*, weichhaariger Hafer.

Hordeum, III. Gerste.

H. murinum *L.*, Mäuse-G., Mauer-G., taube G.

Agropyrum, III. Queckengras.

A. repens *P. B.* (*Triticum repens* *L.*), kriechender Weizen, Graswurzel, Quecke, Pädergras.

Scabiosa, IV. Scabiose.

Sc. hybrida *All.*, Bastard-Scabiose.

Rubia, IV. Krapp, Röthe.

R. peregrina *L.*, fremde Röthe.

R. tinctorum *L.*, Färberröthe. (Verwildert.)

Galium, IV. Labkraut.

G. Aparine *L.*, kletterndes L., Klebkraut, Zaunreis.

G. tricorne *With.*, dreikörniges Labkraut.

Verbascum, V. Wollkraut.

V. Blattaria *L.*, Motten-Königskerze.

V. sinuatum *Lam.*, buchtigblättrige Königskerze. (Auf Schutt.)

Aethusa, V. Gleise.

A. Cynapium *L.*, gemeine Gl., kleiner Schierling, Hundspetersilie.

Aegopodium, V. Geisfuss, Giersch.

A. Podagraria *L.*, gem. G., Strenzel, Zipperleinskr. t.

Anthriscus, V. Klettenkerbel.

A. vulgaris *Pers.* (*Scandix Anthriscus* *L.*), gem. K.

Linum, V. Lein, Flachs.

L. viscosum *L.*, klebriger Lein oder Flachs (In Weinbergen.)

Anthericum, VI. Zaunlilie.

A. ramosum *L.*, ästige Zaunblume.

Lychnis, X. Lichtnelke.

L. diurna *L.* (*L. vespertina* *Sibth.*), Wiesen-L., Lichtröschen, weisses Marienröschen, Abend-L.

An Zäunen.

Agrimonia, XI. Odärmennig.

A. Eupatoria *L.*, gem. O., Leberklette, Steinwurz.

Rosa, XII. Rose.

R. arvensis *Huds.*, Feld-Rose.

R. rubiginosa *L.*, rostfarbige Rose, Wein-Rose.

R. sempervirens *L.*, immergrüne Rose.

R. silvestris *Tabern.*, Wald-Rose.

R. uncinella *Bess.*

Rubus, XII. Himbeere, Brombeere.

R. affinis *Weihe*, verwandte Brombeere.

R. apiculatus *Weihe*.

R. corylifolius *Sm.*, haselnussblättrige Br.

R. pubescens *Weihe*, weichhaarige Brombeere.

Nepeta, XIV. Katzenmünze.

N. citriodora *Balb.*, citronenduftige K.

Fumaria, XVII. Erdrauch.

F. parviflora *Lam.*, kleinblüthiger Erdrauch.

Galega, XVII. Geisraute.

G. officinalis *L.*, gemeine Geisraute.

Bryonia, XXI. Zaunrübe.

Br. alba *L.*, weisse, schwarzbeerige Z., Gichtrübe.

Br. dioica *L.*, gemeine, zweihäusige, rothbeerige Z. oder Gichtrübe.

(*Veronica Chamaedrys*, *V. prostrata*, *Phalaris paradoxa*, *Festuca duriuscula*, *Arrhenatherum avenaceum*, *Imperata cylindrica*, *Triticum villosum*, *Lonicera pallida*, *Rhamnus catharticus*, *Paliurus aculeatus*, *Evonymus europaeus*, *Tordilium maximum*, *Smyrnium perfoliatum*, *Anthriscus Cerefolium*, *Chaerophyllum bulbosum*, *Ch. temulum*, *Stellaria graminea*, *Lychnis diurna*, *Crataegus oxyacantha*, *Cydonia vulgaris*, *Rosa hybrida*, *R. platyphylla*, *R. repens*, *Rubus fruticosus*, *R. suberectus*, *Chelidonium majus*, *Clematis Viticella*, *Lepidium ruderales*, *Laelia orientalis*, *Alliaria officinalis*, *Geranium pusillum*, *G. pyrenaicum*, *Lathyrus sepium*, *Tamus communis* siehe May S. 365 ff.)

J U L.

1) *An Abhängen.*

Veronica, II. Ehrenpreis.

V. fruticulosa L., Stauden-Ehrenpreis. (In Kalkalpen und Voralpen.)

An feuchten Abhängen.

Cyperus, III. Cypergras.

C. longus L., langes Cypergras.

An grasigen Abhängen der Kalkberge.

Gentiana, V. Enzian.

G. ciliata L., gefranzter Enzian.

(Ausser diesen blühen noch an Abhängen: Androsaemum officinale und Chlora perfoliata s. Jun. S. 368 *).)

2) *An Ackerrändern.*

Salvia, II. Salbey.

S. silvestris L., Wald-Salbey.

Atriplex, V. (XXIII.) Melde.

A. nitens Rebert., glänzende Melde.

Pastinaca, V. Pastinak.

P. sativa L., gemeiner Pastinak.

*) Von nun an sind, zur Ersparung des Raums, die in frühern Monaten schon da gewesenen Pflanzen blos unter den *Haupt-Rubriken* am Schlusse bemerkt.

*An Ackerrändern.***Falcaria, V.** Sichelbolde.*F. Rivini Host.* (*Sium Falcaria L.*), Acker-Merk,
Sichelkraut.**Codonoprasum, VI.** Glockenlauch.*C. carinatum* (*Allium car. L.*), Getreidellauch.*C. oleraceum* (*Allium oleraceum L.*), Gemüse-
Lauch. (In Gebüsch.)**Galeopsis, XIV.** Hohlzahn.*G. acuminata Rchb.**G. bifida Bnng.*, spaltlippiger Hohlzahn.**Stachys, XIV.** Ziest.*St. germanica L.*, deutscher Ziest.*St. recta L.*, gerader Ziest, Berufkraut.**Malva, XVI.** Malve, Käspappel.*M. Morenii Pollin.**M. moschata L.*, moschusartige M., Bisampappel.**Medicago, XVII.** Schneckenklee.*M. media Pers.*, mittlerer Schn., Bastard-Schn.**Carlina, XIX.** Eberwurz.*C. acaulis L.*, grossblumige E. od. Silberdistel.*C. vulgaris L.*, kleinblumige oder gemeine E.(Chilochloa aspera, Anchusa arvalis, A. officinalis, Reseda lutea, Sisymbrium officinale, Vicia bithynica, Lotus corniculatus, Scorzonera laciniata siehe May S. 156 ff.) —
Ausser diesen noch die im Jun an Ackerrändern S. 368 ff.
beimerten Pflanzen.)**3) Auf Aeckern.****Digitaria, III.** Fingergras.*D. ciliaris Koel.* (*Panicum ciliare Retz.*), wimperhaariges F., gefranzte Bluthirse.*D. filiformis Koel.* (*Panicum Ischaenum Schreb.*),
fadenförmiges F., kahle Bluthirse.*D. sanguinalis Scop.* (*Panicum sanguinale L.*),
gemeines Fingergras, Bluthirse.

*Auf Aeckern.***Setaria, III.** Borstengras.*S. glauca* P. B. (*Panicum glaucum* L.), grau-grüner Fennich, gelbhaarige Hirse. (Nach der Aernte.)*S. verticillata* P. B. (*Panicum verticillatum* L.), quirlförmige Hirse, quirlblüthiger Fennich.**Lolium, III.** Lolch.*L. temulentum* L., betäubender L., Taumel-L., Schwindelhafer, Tollkorn.**Plantago, IV.** Wegerich.*Pl. Psyllium* L., Flöhkraut-Wegerich.**Heliotropium, V.** Sonnenwende.*H. europaeum* L., europäische Sonnenwende.**Anagallis, V.** Gauchheil.*A. Monelli* L.**Chenopodium, V.** Gänsefuss.*Ch. ficifolium* Sm., feigenblättriger Gänsefuss.**Torilis, V.** Borstdolde.*T. helvetica* Gmel. (*Caucalis helvetica* Jacq.), Acker-Hafstdolde. (In Thonboden.)**Porrum, VI.** Porrey.*P. Ampeloprasum* (*Allium Ampeloprasum* L.), breitblättriger Lauch, Sommer-Lauch.*P. rotundum* (*Allium rotundum* L.), runder L.**Polygonum, VIII.** Knöterig.*P. Convolvulus* L., windender K., Schwarzwinde.*P. tataricum* L., tatarischer, sibirischer Buchweizen.**Euphorbia, XI.** Wolfsmilch.*E. exigua* L., kleine Wolfsmilch.*E. falcata* L., sichelförmige Wolfsmilch.**Papaver, XIII.** Mohn.*P. intermedium* Beck., mittlerer Mohn.

Auf Aeckern.

Nigella, XIII. Schwarzkümmel.

N. damascena L., Garten-S., Gretchen im Busche.

Adonis, XIII. Adonis.

A. autumnalis L., Herbst-Feuerröschen.

Galeopsis, XIV. Hohlzahn.

G. ochroleuca Lam., grossblüthige, schwefelgelbe Hanfnessel.

G. pubescens Bess., weichhaarige Hanfnessel.

G. Tetrahit L., breitblättrige, rauhhaarige Hanfnessel.

G. versicolor Curt., bunte Hanfnessel.

Stachys, XIV. Ziest.

St. arvensis L., Acker-Ziest.

St. annua L., jähriger Ziest. (Besonders an hoher, sonniger Lage.)

Mentha, XIV. Minze, Münze.

M. arvensis L., Acker-Minze.

Linaria, XIV. Maulblume.

L. simplex De C. (Antirrhinum simplex W.), einfaches Löwenmaul.

Melampyrum, XIV. Wachtelweizen.

M. arvense L., Acker-W., Acker-Kuhweizen.

Brassica, XV. Kohl.

Br. praecox Kit., Kohltreps, Sommerreps.

Vicia, XVII. Wicke.

V. hirta Balb., rauhfrüchtige Wicke.

V. lutea L., gelbe Wicke.

Ervum, XVII. Erve, Linse.

E. Ervilia L., Erven-Linse, Wicken-Linse.

Trifolium, XVII. Klee.

Tr. arvense L., Acker-Klee, Haasenklee.

Chondrilla, XIX. Knorpelsalat.

Ch. juncea L., binsenartiger Knorpelsalat, gelbe Wegwarte.

Auf Aeckern.

Cirsium, XIX. Kratzdistel.

C. arvense Lam. (*Serratula arvensis L.*), Acker-Kratzdistel, Acker-Scharte, Haferdistel.

Chrysanthemum, XIX. Wucherblume.

Chr. segetum L., Saat-W., Hungerblume.

Pyrethrum, XIV. Bertramswurz.

P. inodorum Sm. (*Chrysanthemum inodorum L.*), geruchlose Hungerblume, wilde Hundschamille.

Centaurea, XIX. Flockenblume.

C. Scabiosa L., Scabiosen-Fl., Eisenwurzel.

a) *Auf Aeckern unter dem Getreide.*

Nigella, XIII. Schwarzkümmel.

N. arvensis L., Acker-Schwarzkümmel.

b) *Auf Aeckern verwildert.*

Panicum, III. Hirse, Fennich.

P. capillare L., haarförmiger Fennich.

P. miliaceum L., gemeine Hirse.

Setaria, III. Borstengras.

S. germanica P. B. (*Panicum germanicum C. B.*), deutsche Hirse, Fenchel-Hirse.

Galium, IV. Labkraut.

G. anglicum Huds., englisches Labkraut.

c) *Auf bergigen Aeckern.*

Bromus, III. Tresp.

Br. secalinus L., Roggen-Tr. Var. *b. divergens*.

d) *Auf feuchten Aeckern.*

Echinochloa, III. Stachelgras.

E. Crus galli P. B. (*Panicum Crus galli L.*), Hühnerhirse, Hahnsporn-Fennich.

Rumex, VI. Ampfer.

R. crispus L., krauser Ampfer. (In Gräben.)

Auf feuchten Aeckern.

Senecio, XIX. Kreuzkraut.

S. erraticus Bert., herumschweifendes Kreuzkr.

Auf feuchten, sandigen Aeckern.

Spergella, X. Spergelle.

Sp. nodosa (Spergula nod. L.), knotiger Spark.

Auf feuchten, thonigen Aeckern.

Sambucus, V. Hollunder.

S. Ebulus L., Attich-H., Zwerg-H., rother H.

e) Auf sandigen Aeckern.

Hypericum, XVIII. Hartheu.

H. humifusum L., gestrecktes, liegendes H. oder Johanniskraut.

Auf trocknen, besonders sandigen Aeckern.

Gypsophila, X. Gypskraut.

G. muralis L., Mauer-Gypskraut, Mauer-Nelke.

(*Veronica arvensis*, *Valerianella Auricula*, *V. dentata*, *Alopecurus creticus*, *Triticum villosum*, *Scabiosa arvensis*, *Sagina procumbens*, *Lycopsis arvensis*, *Anagallis arvensis*, *Convolvulus arvensis*, *Scandix Pecten*, *Caucalis leptophylla*, *Stellaria graminea* β . *breviflora*, *St. media*, *Odontites verna*, *Melampyrum barbatum*, *Camelina sativa*, *Isatis tinctoria*, *Sinapis arvensis*, *Raphanistrum segetum*, *Erodium moschatum*, *Geranium rotundifolium*, *Fumaria parviflora*, *Lathyrus Nissolia*, *Vicia onobrychioides*, *V. pannonica*, *V. uncinata*, *Ornithopus perpusillus*, *Medicago Gerardi* s. May S. 158—63. *Neslia paniculata*, *Bunium Bulbocastanum*, *Nasturtium palustre*, *N. silvestre*, *Erodium cicutarium* s. May S. 164 ff.)

(Ausser diesen blühen noch die meisten der im Jun S. 370 ff. aufgeführten Pflanzen, nämlich: *Apera interrupta* bis *Bromus arvensis*, *Avena fatua*, *A. tenuis*, *Galium Aparine* bis *Cerinthe minor*, *Campanula trachelioides* bis *Saponaria Vaccaria*, *Silene silvestris*, *Spergula arvensis*, *Euphorbia segetalis* bis *Rapistrum perenne*, *Malva rotundifolia* bis *Ervum Lenticula*, *Medicago orbicularis* bis *Calendula arvensis*, *Orobanche ramosa* bis *Echium Wierzbickii*.)

4) Auf Alpen und in Alpengegenden.

(Vergl. Urgebirge, Voralpen.)

A. Auf Alpen.

Veronica, II. Ehrenpreis.

V. bellidioides L., masliebblättriger Ehrenpr.

Pinguicula, II. Fettkraut.

P. leptoceras Rchb., Dünnhorn-Fettkraut.

Valeriana, III. Baldrian.

V. tuberosa L., knolliger B. (Im südl. Gebiete.)

Agrostis, III. Straussgras.

A. rupestris All., Felsen-Straussgras.

Calamagrostis, III. Reithgras

C. tenella Lk. (Arundo tenella Schrad.), zartes

Reithgras, zartes Rohr.

Aira, III. Schmiele.

A. flexuosa L., geschlängeltstielige Schmiele,

Drath-Schm., Flitter-Schm. und Var. b. Aira

montana L., Berg-Schmiele.

Poa, III. Rispengras.

P. alpina L., Alpen-Rispengras.

P. flexuosa Wahlb., schlängliches Rispengras.

P. Halleri R. S., Hallers Rispengras.

P. laxa Haenke, schlaffes Rispengras.

Festuca, III. Schwingel.

F. eskia Ram., weich-achsiger Schwingel.

F. ferruginea Rchb., rostfarbiger Schwingel.

F. flavescens Bell., gelbwerdender Schwingel.

F. poaeformis Host., rhätischer, rispengrasförmiger Schwingel.

F. rubra L., rother Schwingel.

F. spadicea L., brauner Schwingel.

Avena, III. Hafer

A. alpestris Host., Alpen-Hafer.

A. argentea W., fächerblättriger Hafer.

A. praeusta Rchb.

Auf Alpen.

Galium, IV. Labkraut.

G. helveticum Weig., Schweizer-Labkraut.

Primula, V. Primel.

Pr. truncata Lehm., stutzblättrige Schlüsselbl.

P. villosa Jacq., zottige Schlüsselblume.

Androsace, V. Mannsschild.

A. carnea L., fleischfarbener Mannsschild.

Phyteuma, V. Rapunzel.

Ph. comosum L., blaugrüne Rapunzel.

Ph. Michelii All., Michels-Rapunzel.

Campanula, V. Glockenblume.

C. carnica Schiede, krainische Glockenblume.

C. thyrsoides L., straussartige Glockenblume.

Viola, V. Veilchen.

V. alpina Jacq., Alpen-Veilchen.

Gentiana, V. Enzian.

G. Froelichii Jan., Fröhlichs-Enzian.

Eryngium, V. Mannstreu.

E. alpinum L., Alpen-Mannstreu.

Heracleum, V. Bärenklau.

H. asperum M. B., rauhe Bärenklau.

H. palmatum Baumg., handblättrige Bärenklau.

Angelica, V. Angelica.

A. montana Schleich., Berg-Angelica.

Libanotis, V. Heilwurz.

L. daucifolia Rchb. (*Athamanta daucifolia Host.*),
möhrenblättrige Heilwurz.

Sibbaldia, V. Sibbaldie.

S. procumbens L., liegendes Scheidenkraut.

Drosera, V. Sonnentau.

Dr. obovata M. K., verkehrteirundblättriger S.

Juncus, VI. Simse.

J. castaneus Sm., castanienbraune Simse.

J. stygius L., stygische Segge.

Auf Alpen.

Daphne, VIII. Seidel.

D. striata *Prtschl.*, gestreifter Seidelbast.

Saxifraga, V. Steinbrech.

S. imbricata *Bertol.*, schuppiger Steinbrech. (Im südlichen Gebiete.)

S. tenella *Wulff.*, zarter Steinbrech.

Arenaria, X. Sandkraut.

A. thesiifolia *Froel.*, leinblatt-blätteriges S.

Sabulina, X. Sändling.

S. sphagnoides (*Arenaria sphagnoides* *Froel.*), torfmoosartiges Sandkraut.

Cerastium, X. Hornkraut.

C. alpinum *L.*, Alpen-Hornkraut.

C. ciliatum *W. Kit.*, wimperblätteriges Hornkr.

C. grandiflorum *W. Kit.*, grossblüthiges H.

Rosa, XII. Rose.

R. resinosa *Strnb.*, harzige Rose.

Potentilla, XII. Fingerkraut.

P. salisburgensis *Hnk.*, Salzburger Fingerkraut.

Aconitum, XIII. Eisenhut.

A. acutum *Rchb.*, spitzblüthiger Eisenhut.

A. angustifolium *Bernh.*, schmalblätteriger E.

A. Cammarum *Jacq. Lam.*, langhelmiger Eisenh.

Var. β . *Judenbergense* *Clus.* und γ . *macranthum* *Rchb.*

A. cernuum *Wulff.*, überhängender Eisenhut.

A. formosum *Rchb.*, schöner Eisenhut.

A. Funkianum *Rchb.*, Funk's Ehrenpreis.

A. Hoppeanum *Rchb.*, Hoppe's Eisenhut.

A. laxum *Rchb.*, schlaffer Ehrenpreis.

A. Napellus *Dod.*, gemeiner E., Giftwurzel, Wolfswurzel.

A. neubergense *Clus.*, neubergischer Eisenhut.

A. strictum *Bernh.*, schnurgerader Eisenhut.

Auf Alpen.

Ranunculus, XII. Ranunkel, Hahnenfuss.

• **R. Phthora Crntz.**, Bastard-Ranunkel.

R. Seguieri Vill., italischer Ranunkel.

Acinos, XIV. Basilienthym.

A. alpinus Mnch. (Thymus alp. L.), Alpen-Thymian.

Euphrasia, XIV. Augentrost.

E. tricuspidata L., dreispitziger Augentrost.

Draba, XV. Hungerblümchen.

Dr. fladnitzensis Wulff., fladnitzer Hungerbl.

Dr. lapponica W., lappländisches Hungerbl.

Dr. rupestris R. Br., Felsen-Hungerblümchen.

Dr. stellata Jacq., sternhaariges Hungerbl.

Astragalus, XVII. Traganth.

A. leontinus Jacq., Tyroler Wirbelkraut.

Trifolium, XVII. Klee.

Tr. alpinum L., Alpen-Klee.

Tr. noricum Wulff., norischer Klee.

Tr. pallescens Schreb., gelblicher Klee.

Hieracium, XIX. Habichtskraut.

H. flexuosum W. Kit., bogiges Habichtskraut.

H. fuscum Vill., braunblüthiges Habichtskraut.

Crepis, XIX. Pippau.

C. grandiflora W., grossblüthiger Pippau.

Leontodon, XIX. Löwenzahn.

L. croceus Hnk., safranblüthiger Löwenzahn.

Carduus, XIX. Distel.

C. carlinaefolius Lam., eberwurzblättrige D.

Cirsium, XIX. Kratzdistel.

C. carniolicum Scop. (Carduus carniolicus Hoppe),
krainische Kratzdistel.

C. Pumilio Tsch., Zwerg-Kratzdistel.

C. spinosissimum Scop., vielstachelige Kr.

Saussurea, XIX. Saussurea.

S. alpina De C. (Serratula alp. L.), Alpen-Scharte.

Auf Alpen.

Saussurea discolor *De C.* (*Serratula alpina* γ . *Linn.*),
zweifarbige Scharte.

Artemisia, XIX. Beifuss.

A. lanata *W.* wolliger Beifuss.

Doronicum, XIX. Gemswurz.

D. longifolium *C. Bauh.*, langblättrige Gemsw.

D. orientale *Ad.*, orientalische Gemswurz.

Cineraria, XIX. Aschenpflanze.

C. alpestris *Hpp.*, Aelpler-Aschenpflanze.

C. aurantiaca *Hpp.*, orangeblüthige Aschenpflanze.

C. papposa *Rchb.*, langschopfige Aschenpflanze.

Senecio, XIX. Kreuzkraut.

S. carniolicus *W.*, krainisches Kreuzkraut.

Homogyne, XIX. Alplattig.

H. alpina *H. Cass.* (*Tussilago alpina* *L.*), Alpen-
Huflattig, Groschenkraut.

H. discolor *H. Cass.* (*Tussilago discolor* *Jacq.*),
zweifarbiger Alplattig.

Aronicum, XIX. Krebswurz.

A. latifolium *Rchb.* (*Doronicum latifol.* *C. Bauh.*),
breitblättrige Krebswurz.

Anthemis, XIX. Chamille.

A. alpina *L.*, Alpen-Chamille.

Buphthalmum, XIX. Rindsauge.

B. speciosissimum *Ard.*, prächtigstes R.

Gymnadenia, XX. Nacktdrüse.

G. ornithis *Spr.* (*Orchis ornithis* *Scop.*), vogel-
artige Nacktdrüse.

Vignea, XXI. Segge.

V. foetida (*Carex foetida* *All.*), stinkende Segge.

V. Gebhardi (*Carex Gebh.* *Schk.*), Gebhards-S.

V. incurva (*Carex inc.* *Lightf.*), eingebogene S.

V. tripartita (*Carex trip.* *All.*), dreitheilige S.

*Auf Alpen.***Salix, XXII. Weide.***S. herbacea L.*, krautartige Weide.*S. Jacquini Host.*, Jacquin's Weide.a) *Auf Alpen an Bächen.***Allium, VI. Lauch.***A. foliosum Red.*, blattreicher Lauch.**Aconitum, XIII. Eisenhut.***A. Koelleanum Rchb.*, Koelle's Eisenhut.b) *Auf Alpen an dürrer, sonnigen Orten.***Dianthus, X. Nelke.***D. Scheuchzeri Rchb.*, Scheuchzers Nelke.c) *Auf Alpen an Felsen und felsigen Orten.***Valeriana, III. Baldrian.***V. elongata Jacq.*, verlängerter Baldrian. (In Felsritzen an etwas feuchten Stellen.)**Elyna, III. Elyne.***E. spicata Schrad.* (*Carex Bellardi All.*), ährenförmige Elyne.**Poa, III. Rispengras.***P. distichophylla Gaud.*, zweizeilig-blätteriges Rispengras. (Auf Felsblöcken.)**Campanula, V. Glockenblume.***C. Zoysii Wulff.*, Zoysi's Gl. (Auf Kalkfelsen.)**Bupleurum, V. Hasenohr.***B. graminifolium Vahl.*, grasblätteriges Hasenohr.*B. stellatum L.*, sternhülliges Hasenohr.**Cerastium, X. Hornkraut.***C. lanatum Lam.*, wolliges Hornkraut**Sempervivum, XI. Hauswurz.***S. arachnoideum L.*, spinnenwebartige H.*S. hirtum L.*, rauhblüthige Hauswurz.*S. Wulfenii Hpp.*, Wulfens Hauswurz.

Auf Alpen an Felsen und felsigen Orten.

Hieracium, XIX. Habichtskraut.

H. Jacquini Vill., Jacquins Habichtskraut.

H. porrifolium L., lauchblättriges Habichtskr.

Rhodiola, XXII. Rosenwurz.

Rh. rosea L., gemeine Rosenwurz.

An felsigen, sonnigen Orten.

Sabulina, X. Sändling.

S. striata (Arenaria striata L.), gestreiftes Sandkraut.

d) *Auf Alpen an feuchten Stellen.*

Valeriana elongata (s. oben unter c).

Saxifraga (s. oben) **Aizoides L.**, immergrüner Steinbrech.

An feuchten, schattigen Orten.

Ranunculus, XII. Ranunkel, Hahnenfuss.

R. vaginatus Sommerauer, weisser Hahnenkamm.

Tozzia, XIV. Tozzie.

T. alpina L., Alpen-Tozzie.

An feuchten, steinigen Orten.

Sabulina (s. oben) **austriaca** (Arenaria austriaca Jacq.), langstieliges Sandkraut.

Arabis, XV. Gänsekraut.

A. bellidifolia Jacq., tausendschönblättriges G.

e) *Auf Alpen-Gerölle.*

Saxifraga Aizoides (s. oben unter d.)

Draba, XV. Hungerblümchen.

Dr. fladnitzensis Wulff., stumpfes Hungerbl.

Noccaea, XV. Noccäe.

N. rotundifolia Mnch. (Iberis rotundifolia L.), rundblättrige Schleifenblume.

f) *Auf Alpen an grasigen Plätzen.*

Hieracium, XIX. Habichtskraut.

H. glanduliferum Hpp., drüsentragendes H.

g) *Auf Alpen an steinigen Hügeln.*

Hieracium glaucum All., blaugrünes Habichtskraut.

An trocknen, grasigen Hügeln.

Elyna spicata (s. oben unter c).

b) *Auf Alpen auf Moorboden.*

Juncus, VI. Simse.

J. triglumis L., dreispelzige Simse.

Taraxacum, XIX. Pfaffenröhrlein.

T. nigricans Rchb., schwärzliches Pfaffenröhrl.

i) *Auf Alpen an quelligen Orten.*

Epilobium, VIII. Schotenweiderich.

E. alpinum L., Alpen-Schotenweiderich.

Saxifraga, X. Steinbrech.

S. leucanthemifolia Lap., wucherblumblättriger St.

Aconitum Koelleianum (s. oben unter a).

k) *Auf Alpen an Schieferfelsen.*

Zahlbrucknera, X. Zahlbrucknere.

Z. paradoxa Rchb. (*Saxifraga paradoxa Sternb.*),
sonderbarer Steinbrech.

l) *Auf Alpen an sonnigen, dürren Orten* (s. oben
unter b).

An sonnigen, felsigen Orten (s. oben unter c.)

m) *Auf Alpen an steinigen Orten.*

Hieracium, XIX. Habichtskraut.

H. dentatum Hpp., zahnblättriges Habichtskraut.

An feuchten, steinigen Orten (s. oben unter d).

n) *Auf Alpentriften.*

Veronica, II. Ehrenpreis.

V. pyrenaica All., pyrenäischer Ehrenpreis.

Pinguicula, II. Fettkraut.

P. flavescens Floerke, gelbliches Fettkraut.

*Auf Alpentriften.***Plantago, IV.** Wegerich.Pl. alpina *L.*, Alpen-Wegerich.Pl. montana *Lam.*, Berg-Wegerich.**Gentiana, V.** Enzian.G. purpurea *L.*, purpurrother Enzian.**Meum, V.** Bärenwurz.M. Mutellina *Gaertn* (Phellandrinm Mutellina *L.*),

Alpen-Wasserfenchel, Madaun.

Aconitum Koelleianum (s. oben unter a). (Um Sennhütten.)**Ranunculus montanus** (s. May S. 174.)**Pedicularis XIV.** Läusekraut.P. recutita *L.*, beschnittenes Läusekraut.**Trifolium, XVII.** Klee.Tr. badium *Schreb.*, karmelitfarbiger Klee.*Auf feuchten Alpentriften.***Viola, V.** Veilchen.V. lutea *Huds.*, gelbes V. (An steinigen Orten.)**Gentiana** (s. oben) punctata *L.*, punctirter Enzian.o) *Auf Alpenwiesen.***Festuca, III.** Schwingel.F. varia *Haenke*, bunter Schwingel. (Auf steinigen Wiesen.)**Myosotis, V.** Vergissmeinnicht.M. lithospermifolia *Horn.*, steinsaamblättriges V.M. suaveolens *Kit.*, wohlriechendes Vergissm.**Phyteuma, V.** Rapunzel.Ph. betonicaefolium *Vill.*, betonienblättrige R.Ph. fistulosum *Rchb.*, röhrige Rapunzel.Ph. Scheuchzeri *All.*, Scheuchzers Rapunzel.**Campanula, V.** Glockenblume.C. linifolia *W.*, leinblättrige Glockenblume.

*Auf Alpenwiesen.***Armeria**, V. Grasnelke.*A. alpina* Hpp., Alpen-Grasnelke.**Euphrasia**, XIV. Augentrost.*E. salisburgensis* Funk., Salzburger Augentrost.**Geracium**, XIX. Sperberkraut.*G. aureum* (*Leontodon aureum* L.), rothgelber Löwenzahn.*G. chondrilloides* (*Hieracium chondrilloides* Jacq.), knorpelsalatartiges Sp. od. Habichtskraut.**Leontodon**, XIX. Löwenzahn.*L. alpinus* Jacq., Alpen-Löwenzahn.**Hypochaeris**, XIX. Ferkelsalat.*H. helvetica* Jacq., Gebirgs-Ferkel-Salat.**Cineraria**, XIX. Aschenpflanze.*C. longifolia* Jacq., langblättrige Aschenpflanze.**Centaurea**, XIX. Flockenblume.*C. phrygia* L., phrygische Flockenblume.**Chamaerepes**, XX. Erdorche.*Ch. alpina* (*Ophrys alpina* L.), Alpen-Erdorche, Alpen-Ragwurz.

(*Valeriana montana*, *Alchimilla alpina*, *A. fissa*, *A. pubescens*, *Androsace Chamaejasme*, *Juncus bufonius*, *Saxifraga rotundifolia*, *Silene Saxifraga*, *Dryas octopetala*, *Pulsatilla alba*, *P. vernalis*, *Scutellaria alpina*, *Pedicularis foliosa*, *Draba aizoides*, *Dr. confusa*, *Dr. contorta*, *Arabis ovirensis*, *Carex ferruginea*, *Salix myrtilloides*, *S. retusa* siehe May S. 165 ff. — *Rhodothamnus Chamaecistus*, *Saxifraga oppositifolia*, *Ranunculus alpestris*, *Pinguicula flaves-cens*, *Saxifraga stellaris*, *Veronica alpina*, *V. aphylla*, *Gentiana acaulis*, *G. alpina*, *G. angustifolia*, *G. discolor*, *Rumex alpinus*, *Potentilla aurea*, *Sieversia montana* s. May S. 167 ff.)

(Ausser diesen blühen noch die meisten der im Jun S. 376 ff. aufgeführten Pflanzen, nämlich *Veronica urticaefolia* bis *Cortusa Matthioli*, *Soldanella pusilla*, *Campanula pubescens* bis *Heracleum siifolium*, *Laserpitium peucedanoides* bis *Saxifraga Cotyledon*, *Saxifraga Hostii* bis *Draba*

Auf Alpen und in Alpengegenden.

muricella, Arabis ciliata, Geranium argenteum, G. silvaticum, Orobis luteus bis Orchis atropurpurea, Salix limosa bis Empetrum nigrum, Gentiana obtusifolia, Scorzonera rosea, Campanula cespitosa bis Poa nemoralis, Luzula spadicea, Saxifraga cuneifolia bis Vignea Grypos, Alchimilla alpina bis Gymnadenia suaveolens.)

B. Auf Hochalpen.

Poa, III. Rispengras.

P. minor G., kleines Rispengras.

Festuca, III. Schwingel.

F. alpina Sut., Alpen-Schwingel.

Avena, III. Hafer.

A. Scheuchzeri All., Scheuchzers Hafer.

Androsace, V. Mannsschild.

A. Vitaliana Lap., Vitaliano's Mannsschild.

Tofieldia, VI. Tofieldie.

T. glacialis Gaud., (Anthericum) Gletscher-T.

Saxifraga, X. Steinbrech.

S. hieracifolia W. Kit., habichtskrautblättriger St.

S. nivalis L., Gletscher-Steinbrech.

Silene, X. Leimkraut.

S. valesiaca L., Walliser-Leimkraut.

Sieberia, X. Siebere.

S. cherlerioides Schrad. (Cherleria octandra Sieb.), moosnelkenartige Siebere.

Sempervivum, XI. Hauswurz.

S. Funkii F. Braun., Funke's Hauswurz.

Thalictrum, XIII. Wiesenraute.

Th. alpinum L., Alpen-Wiesenraute.

Scrofularia, XIV. Braunwurz.

Scr. canina L., Hunds-Braunwurz.

Pedicularis, XIV. Läusekraut.

P. Portenschlagii Saut., Portenschlag's L.

Braya, XV. Braya.

Br. alpina Sternb., Alpen-Braya.

Auf Hochalpen.

Draba, XV. Hungerblümchen.

Dr. carinthiaca Hpp., kärnthnerisches H.

Cochlearia, XV. Löffelkraut.

C. groenlandica L., grönländisches Löffelkraut.

Oxytropis, XVII. Spitzfahne.

O. uralensis De C. (*Astragalus uralensis L.*),
uralisches Wirbelkraut, Var. *b. sericea*.

Saussurea, XIX. Saussurea.

S. pygmaea Spr. (*Cnicus pygmaeus L.*), Zwerg-
Kratzkraut, Zwerg-Scharte.

Gnaphalium, XIX. Ruhrkraut.

Gn. Leontopodium L., gestrahltes R., Edelweiss.

Artemisia, XIX. Beifuss.

A. helvetica Schl., Schweizer-Beifuss.

Carex, XXI. Riedgras.

C. membranacea Hpp., häutiges Riedgras.

Salix, XXII. Weide.

S. reticulata L., netzblätterige Weide.

S. retusa L., gerändelte Weide.

a) *Auf hohen Alpen in Felsritzen.*

Gentiana, V. Enzian.

G. imbricata Froel., dachziegelförmiger E.

Oxyris, VI. Säuerling.

O. digyna Cambd. (*Rumex digynus L.*), zwei-
griffeliger Sauerampfer.

Draba (s. oben) tomentosa Wahlb., filziges
Hungerblümchen.

b) *Auf hohen Alpen an feuchten Orten.*

Valeriana, III. Baldrian.

V. supina L., niedriger B. (An feuchten Plätzen.)

Phleum, III. Lieschgras.

Phl. capitatum Scop., kopfförmiges Lieschgras.
(An feuchten Plätzen.)

Auf hohen Alpen an feuchten Orten.

Sedum, X. Fetthenne.

S. repens L., kriechender Knörpel.

Vignea, XXI. Segge.

V. lagopina (*Carex lagopina Wahlb.*). (An feuchten, grasigen Stellen.)

Juncus, VI. Simse.

J. Jacquini L., Jacquin's Simse.

Cherleria, X. Cherlerie.

Ch. sedoides L., hauslaubartige Moosnelke.

c) Auf hohem Alpen-Gerölle.

Epilobium, VIII. Schotenweiderich.

E. angustissimum Ait., langblättriger Schotenweiderich. (Auf Gries.)

Silene, X. Leimkraut.

S. acaulis L., stielloses *L.* Var. γ . *pedunculosa* und δ . *dianthifolia*.

Chrysanthemum, XIX. Wucherblume.

Chr. alpinum L., Alpen-Wucherblume.

Chr. Halleri Sut., Haller's Wucherblume.

Auf Gries am Fusse der Gletscher, sowie auf Steinen.

Linaria, XIV. Maulblume.

L. alpina De C. (*Antirrhinum alpinum L.*), Alpen-Löwenmaul.

Noccaea rotundifolia (s. oben unter A. e).

d) Auf hohen Alpentristen.

Polygonum viviparum (s. S. 382.)

Viola, V. Veilchen.

V. calcarata L., langgesporntes V. und Var β .

Viola Zoysii.

Laserpitium, V. Laser.

L. hirsutum Lam., rauhhaariges Laserkraut.

*Auf hohen Alpentriften.***Potentilla, XII.** Fingerkraut.*P. grandiflora L.*, grossblumiges Fingerkraut.**Aconitum, XIII.** Eisenhut.*A. tauricum Wulff.*, Tauern-Eisenhut.**Hedysarum, XVII.** Süssklec.*H. obscurum L.*, Gebirgs-Süssklec.*Auf hohen, feuchten Alpentriften.***Gentiana (s. oben) bavarica L.**, bayrischer Enzian.*e) Auf hohen Alpenwiesen.***Koeleria, III.** Kammschmiele.*K. hirsuta Gaud.* (*Aira hirsuta Schl.*), rauhhaarige Kammschmiele.**Phyteuma, V.** Rapunzel.*Ph. cordatum Vill.*, herzblättrige Rapunzel.**Czackia, VI.** Czackia.*C. Liliastrum Andrz.* (*Anthericum Liliastrum L.*), lilienartige Zaunblume.**Hieracium, XIX.** Kreuzkraut.*H. intybaceum Jacq.*, cichorienartiges Kreuzkr.**Aronicum, XIX.** Krebswurz.*A. Doronicum* (*Arnica Doronicum Jacq.*), Alpen-Wolverley.**Nigritella, XX.** Nigritelle.*N. angustifolia Rich.* (*Satyrium nigrum L.*), schwarze Stendelwurz.*N. fragrans Richb.*, starkkriechende Stendelwurz.*Auf hohen, sonnigen Alpenwiesen.***Luzula, VI.** Hainsimse.*L. lutea De C.* (*Juncus campestris e. Linn.*), gelbe Hainsimse.

(Ausser diesen noch die im Jun auf Hochalpen S. 384 f. angemerkten Pflanzen.)

C. Auf den höchsten Alpen.

Valeriana, III. Baldrian.

V. elongata Jacq., verlängerter Baldrian.

V. celtica L., celtischer Baldrian.

V. saluunca All., piemontesischer Baldrian.

Festuca, III. Schwingel.

F. Halleri Vill., Hallers Schwingel.

F. Scheuchzeri Gaud., Scheuchzers Schwingel.

Avena, III. Hafer.

A. aurata All.

Psilathera, III. Dünnganne.

Ps. tenella Lk. (*Cynosurus ovatus Hpp.*), zarte Dünnganne, eiförmiges Kammgras.

Sesleria, III. Seslerie.

S. sphaerocephala Ard. (*Cynosurus sphaerocephalus W.*), kugelblüthiges Kammgras.

Alchimilla, IV. Alchimille.

A. pentaphyllea L., fünfblättriger Sinau.

Sagina, IV. Mastkraut.

S. decandra Rchb., zehnfädiges Mastkraut.

Phyteuma, V. Rapunzel.

Ph. humile Schleich., niedrige Rapunzel.

Gentiana, V. Enzian.

G. frigida Haenke, Frost-E., durchscheinender E.

G. nivalis L., Schneec-Enzian.

Luzula, VI. Hainsimse.

L. spicata De C. (*Juncus spicatus L.*), ährenförmige Hainsimse.

Saxifraga, X. Steinbrech.

S. planifolia Lap., flachblättriger Steinbrech.

Saponaria, X. Seifenkraut.

S. lutea L., gelbes Seifenkraut.

Potentilla, XII. Fingerkraut.

P. nivea L., schneeweisses Fingerkraut.

Auf den höchsten Alpen.

Anemone, XII. Windblume.

A. baldensis L., baldische Windblume.

Draba, XV. Hungerblümchen.

Dr. fladnitzensis Wulff., fladnitzer Hungerbl.

Dr. laevigata Hpp., glattes Hungerblümchen.

Dr. nivalis W., Schnee-Hungerblümchen.

Oxytropis, XVII. Spitzfahne.

O. cyanea M. B. (*Astragalus valesiacus Thm.*), blaue S.

Trifolium, XVII. Klee.

Tr. expansum W. Kit., ausgebreiteter Kl. Var.

β . *Trifolium vaginatum Schleich.*

Hieracium, XIX Habichtskraut.

H. angustifolium Hpp., schmalblättriges H.

Crepis, XIX. Pippau.

Cr. hyoseridifolia Rchb., schweinsalatblättriger P.

Gnaphalium, XIX. Ruhrkraut.

Gn. carpathicum Wahlb., Alpen-Ruhrkraut.

Gn. fuscum Scop., Var. *humilis alpina* (*Gnaphalium supinum L.*), niedriges Ruhrkraut.

Artemisia, XIX. Beifuss.

A. glacialis L., Gletscher-Beifuss.

A. spicata Jacq., ährentragender Beifuss.

Carex membranacea (s. oben unter B. Hochalpen.)

a) *Auf den höchsten Alpen an Felsen.*

Draba (s. oben) *frigida Saut.*, Kälte liebendes H.

An sonnigen Felsen.

Sabulina, X. Sändling.

S. recurva (*Arenaria recurva All.*), krummblättriges Sandkraut.

In Felsritzen und auf Gerölle.

Sieversia, XII. Sieversie.

S. reptans Spr. (*Geum reptans L.*), kriechendes Benediktenkraut.

b) *Auf den höchsten Alpen an feuchten Orten.*

Saxifraga, X. Steinbrech.

S. Seguieri Spr., Seguier's Steinbrech.

An feuchten, schattigen Plätzen.

Tozzia alpina (s. oben unter A. d).

c) *Auf den höchsten Alpen an Gerölle.*

Viola, V. Veilchen.

V. cenisia All., cenisisches Veilchen, Alpen-V.

Cerastium, X. Hornkraut.

C. latifolium L., breitblättriges Hornkraut.

Leontodon, XIX. Löwenzahn.

L. Taraxaci (Hieracium Taraxaci L.), löwenzahnblättriges Habichtskraut.

d) *Auf den höchsten Alpen an Gletschern.*

Gentiana, V. Enzian.

G. nana Wulff., kleinster Enzian.

Ranunculus, XIII. Ranunkel, Hahnenfuss.

R. glacialis L., Gletscher-Ranunkel oder H.

Cardamine, XV. Schaumkraut.

C. alpina W., Alpen-Schaumkraut.

Arabis, XV. Gänsekraut.

A. coerulea Wulff., blaues Gänsekraut.

An grasigen, sonnigen Plätzen der Gletscherhöhen.

Gentiana (s. oben) *glacialis L.*, Gletscher-Enzian.

e) *Auf den höchsten Alpen an steinigen Orten.*

Papaver, XIII. Mohn.

P. alpinum L., Alpen-Mohn.

An steinigen, quelligen Orten.

Cardamine alpina (s. oben unter d).

f) *Auf den höchsten Alpen auf Sumpfwiesen.*

Carex, XXI. Riedgras.

C. irrigua Sm., Quell-Riedgras.

Auf den höchsten Alpentriften.

Saxifraga, X. Steinbrech.

S. pedemontana All., piemonteser Steinbrech.

b) Auf den höchsten Alpenwiesen.

Agrostis, II. Straussgras.

A. alpina Scop. Alpen-Straussgras.

Festuca, III. Schwingel.

F. violacea Gaud., violetter Schwingel.

Crepis, XIX. Pippau.

Cr. montana Rchb. (*Hypochaeris montana L.*),
Berg-Pippau.

Carex irrigua (s. oben unter f).

(Ausser diesen noch die im Jun auf den höchsten Alpen
Seite 385 f. angemerkten Pflanzen.)

D, In Alpengegenden und Alpenthälern.

Scabiosa, IV. Scabiose.

Sc. dipsacifolia Host., kartendistelblättrige *Sc.*

Sc. longifolia W. Kit., langblättrige Scabiose.

Astrantia, V. Thalstern.

A. major L., grösserer Thalstern, Meisterwurz.

Ostericum, V. Osterik.

O. verticillare Rchb. (*Angelica verticillaris L.*),
quirelförmige Angelica.

Aconitum acutum (s. unter A. auf Alpen.)

Calamintha XIV. Calaminthe.

C. grandiflora Mnch. (*Melissa grandiflora L.*),
grossblumige Melisse.

Geranium argenteum und *G. silvaticum* (s. S. 378.)

Trifolium badium (s. oben auf Alpentriften).

*a) In Alpenthälern an Bächen, Hecken und in
Wäldern.*

Aconitum cernuum (s. unter A. auf Alpen).

b) An dürrer, sonnigen Orten.

Dianthus Scheuchzeri (s. unter A. auf Alpen b).

c) *In Alpengegenden und Alpenthälern an Felsen und felsigen Orten.*

Molopospermum, V. Striemensaame.

M. cicutarium De C. (*Ligusticum peloponnesiacum* L.)

Lactuca, XIX. Salat.

L. coerulea Saut., blauer Salat.

In Felsritzen.

Sabulina, X. Sändling.

S. Villarsii (*Arenaria Villarsii* Balb.), Villarsisches Sandkraut.

Erigeron, XIX. Berufungskraut.

E. alpinus L., Alpen-B. Var. γ . *Erigeron glabratus* Hoppe.

d) *In Alpenthälern an feuchten Orten.*

Heracleum, V. Bärenklau.

H. flavescens Bess., gelbliche Bärenklau.

H. longifolium Jacq., langblättrige Bärenklau.

e) *In Alpengegenden auf sonnigen Thalhängeln.*

Ranunculus Phthora (s. oben unter A. auf Alpen).

f) *In Alpengegenden auf Kalk.*

Geranium, XVI. Storchschnabel.

G. silvaticum L., Wald-Storchschnabel.

Leontodon, XIX. Löwenzahn.

L. hyoseroides Welw., schweinesalatartiger L.

g) *In Alpengegenden an steinigen Orten.*

Epilobium, VIII. Schotenweiderich.

E. rosmarinifolium Hänk., rosmarinblättr. Sch.

Saponaria, X. Seifenkraut.

S. ocymoides L., rundblättriges Seifenkraut.

An steinigen, quelligen Orten.

Imperatoria, V. Kaiserwurz.

I. Ostruthium L., gemeine Meisterwurz.

h) *In Alpengegenden auf Wiesen.*

Scorzonera, XIX. Haferwurz.

Sc. grandiflora Lap., grossblumige Haferwurz.

Auf fetten Alpenthalwiesen.

Phyteuma, V. Rapunzel.

Ph. Halleri All., Haller's Rapunzel.

(*Campanula barbata, Saxifraga Cotyledon, Acinos alpinus, Pedicularis recutita, Geracium aureum, Carduus carlinaefolius, Empetrum nigrum. — Gypsophila repens, Linaria alpina, Noccaea alpina, N. rotundifolia, Biscutella laevigata, Kerneria saxatilis, Arabis bellidifolia. — Helianthemum alpestre. — Atragene alpina, Arabis alpina. — Moehringia muscosa. — Cortusa Matthioli. — Streptopus amplexifolius, Ranunculus aconitifolius. — Potentilla aurea. — Anemone trifolia. — Silene acaulis, Leontodon Taraxaci. — Lotus corniculatus. — Pinguicula flavescens. — Ranunculus aconitifolius. — Sieversia montana. — Valeriana tripteris, Homogyne alpina, Veronica urticaefolia. — Senecio alpinus s. May S. 169 — 175.*)

(Ausser diesen blühen noch die meisten der im Jun S. 386 ff. aufgeführten Pflanzen, nämlich: *Chaerophyllum Cicutaria* bis *Polygala alpestris, Paederota Ageria* bis *Campanula spicata, Sisymbrium austriacum, Saxifraga mutata* bis *Bartsia alpina, Silene inflata* bis *Viola palustris, Carex capillaris.*)

5) Angebaut oder angepflanzt (und zum Theil verwildert.)

Phalaris, III. Glanzgras.

Ph. canariensis L., Canariengras.

Panicum, III. Fennich, Hirse.

P. miliaceum L., gemeine Hirse.

Setaria, III. Borstengras.

S. italica P. B. (Panicum italicum C. B. Linn.), italienische Hirse.

Avena, III. Hafer.

A. orientalis Schreb., türkischer, ungarischer H.

A. sativa L., gemeiner Hafer.

A. trisperma Schübl., doppelter H., Gäbeles H.

Angebaut oder angepflanzt.

Nicotiana, V. Tabak.

N. macrophylla Spr., grossblättriger Tabak.

N. rustica L., Bauern-Tabak.

N. Tabacum L., gemeiner Tabak.

Physalis, V. Schlutte.

Ph. latifolia Lam., breitblättrige Schlutte oder Judenkirsche.

Ph. pubescens Lam., weichhaarige Schl. oder Judenkirsche.

Impatiens, V. Springkraut.

I. Balsamina L., Garten-Balsamine.

Ampelopsis, V. Zaunrebe.

A. quinquefolia Rchb. (*Hedera quinquefolia L.*), wilder Wein.

Asclepias, V. Seidenpflanze.

A. syriaca L., syrische Seidenpflanze.

Beta, V. Mangold.

B. Cicla L., weisser Mangold.

B. vulgaris L., Runkelrüben-Mangold.

Coriandrum, V. Coriander.

C. sativum L., gemeiner Coriander.

Pimpinella, V. Bibernell.

P. Anisum L., gemeiner Anis.

Sium, V. Merk.

S. Sisarum L., Zuckerwurzel.

Linum, V. Lein, Flachs.

L. humile L., Klänge-L, Klang-, Spring-Flachs.

Porrum, VI. Porrey.

P. Ceba (*Allium Ceba L.*), gemeine Zwiebel, Sommerzwiebel.

P. Ophioscorodon (*Allium Ophioscorodon Lk.*), Rocambole.

Rumex, VI. Ampfer.

R. Patientia L., Garten-A., englischer Spinat.

Angebaut oder angepflanzt.

Spergula, X. Spark.

Sp. arvensis *L.*, Acker-Spark, Futter-Spark.

Tetragonia, XII. Tetragonie.

T. expansa *Thnb.*, ausgebreitete Vierecksfrucht, neuseeländischer Spinat.

Mesembryanthemum, XII. Zaserblume.

M. cristallinum *L.*, eiswarzige Z., Eiskraut.

Rosa, XII. Rose.

R. Acharii *Billb.*, Acharische Rose.

Origanum, XIV. Dosten.

O. Majorana *L.*, gemeiner Majoran.

Dracocephalum, XIV. Drachenkopf.

Dr. Moldavica *L.*, türkischer Drachenkopf.

Brassica, XV. Kohl.

Br. praecox *Kit.*, Kohltreps, Sommerreps.

Hibiscus, XVI. Hibiscus.

H. syriacus *L.*, syrischer Ibisch.

Vicia, XVII. Wicke.

V. equina *Rchb.* (V. Faba β . minor *L.*), Pferdebohne, Schweinsbohne.

V. Faba *L.*, Buffbohne.

Cicer, XVII. Kicher.

C. physodes *Rchb.*, blasenfrüchtige Kicher.

C. sativum *Schk.*, gebaute Kicher.

Melilotus, XVII. Melote.

M. coerulea *Lam.* (Trifolium Melilotus coerulea *L.*), blauer Steinklee, Schabziegenkraut.

Cichorium, XIX. Cichorie.

C. Endivia *L.*, Salat-Cichorie, Endivien.

Carthamus, XIX. Saflor.

C. tinctorius *L.*, gemeiner Saflor.

Anacyclus, XIX. Ringblume.

A. Pyrethrum *Lk.* (Anthemis Pyrethrum *L.*), speichelerregende Chamille.

Angebaut oder angepflanzt.

Helianthus, XIX. Sonnenblume.

H. annuus L., einjährige Sonnenblume.

Zea, XXI. Mays.

Z. Mays L., Türken-Weizen, Wälschkorn.

Amaranthus, XXI. Amaranth.

A. caudatus L., geschwänzter A., Fuchsschwanz.

Cucumis, XXI. Gurke.

C. Cantalupo Hbrl., Cantaloupe.

C. Citrullus L., Wasser-Melone.

C. Melo L., Melone.

C. sativus L., gemeine Gurke.

(Ausser diesen blühen noch vom May: *Lonicera Periclymenum*, *Silene pendula*, *Rosa damascena*, *Rubus odoratus*, *Camelina sativa*, *Lepidium sativum*, *Sinapis alba*, *Colutea arborescens*, *Pisum ramulare*, *P. umbellatum*, *Medicago sativa*, *Citrus Aurantium*, *C. medica*, *Calendula officinalis*, *Spinacia inermis*, *Sp. oleracea* s. May S. 175—80. — Endlich die meisten im Jun S. 390 ff. aufgeführten, nämlich: *Olea europaea* bis *Hordeum Zeocriton*, *Asterocephalus atropurpureus* bis *Prunus semperflorens*, *Rosa camtschatica*, *R. centifolia*, *R. coriifolia*, *R. dimorpha*, *R. ferox*, *R. glutinosa*, *R. sulphurea*, *R. Wilsonii*, *Papaver officinale*, *P. somniferum*, *Tilia corylifolia*, *Nigella sativa* bis *Acacia Farnesina*.)

6) Auf Anhöhen.

Festuca, III. Schwingel.

F. rubra L., rother Schwingel.

a) *Auf dürren Anhöhen.*

Avena, III. Hafer.

A. pratensis L., Wiesen-Hafer.

A. tenuis Mnch., zarter Hafer.

Asterocephalus, IV. Kronen-Scabiose.

A. suaveolens (*Scabiosa suaveolens Desf.*), wohlriechende Scabiose.

Sedum, X. Fetthenne.

S. rupestre Dill. L., Felsen-F., Felsen-Knörpel.

b) *An felsigen Anhöhen.*

Sabulina, X. Sändling.

S. fastigiata (*Arenaria fastigiata Sm.*), büscheliges Sandkraut.

c) *An grasigen Anhöhen.*

Erythraea, V. Tausendguldenkraut.

E. Centaurium Pers. (*Gentiana Centaurium L.*), gemeines Tausendguldenkraut.

Heracleum, V. Bärenklau.

H. Panaces L., grosses Heilkraut.

d) *An rauhen Anhöhen.*

Diplachne, III. Sperrschwingel.

D. serotina Lk. (*Agrostis serotina L.*), später Sperrschwingel, spätes Straussgras.

e) *An sonnigen Anhöhen.*

Codonoprasum, VI. Glockenlauch.

C. carinatum (*Allium carinatum L.*), Berg-Lauch.

Porrum, VI. Porrey.

P. arenarium (*Allium arenarium L.*), Sandlauch. (In Sandgegenden.)

P. rotundum (*Allium rotundum L.*), runder Lauch.

P. sphaerocephalum (*Allium sphaerocephalum L.*), rundköpfiger Lauch.

Teucrium, XIV. Gamander.

T. Chamaedrys L., gemeiner Gamander.

Stachys recta (s. an Ackerrändern).

Acinos, XIV. Basilienthym.

A. villosus Mnch., (Thymus) zottiger B.

Clinopodium, XIV. Wirbeldosten.

Cl. vulgare L., gemeine Wirbeldosten.

Cephalanthera, XX. Cephalanthere.

C. rubra Rich. (*Serapias rubra L.*), rothe Sumpfwurz, rothe Zymbel. (In Bergwäldern.)

An sonnigen, steinigen Anhöhen.

Stachys germanica (s. an Ackerrändern).

An trocknen Anhöhen.

Asterocephalus, IV. Kronen-Scabiose.

A. gramuntius (*Scabiosa gramuntia* L.), feinblättrige Scabiose.

(*Festuca duriuscula*, *Astragalus exscapus*, *Tragopogon undulatus*, *Armeria vulgaris*, *Dianthus atrorubens*, *Helianthemum grandiflorum*, *Genista decumbens*, *Tragopogon major*, *Lepidium campestre* s. May S. 180 — 185. — Ferner die im Jun. S. 396 ff. aufgeführten Pflanzen.

7) *In Auen.*

(*Lathyrus incurvus* s. Jun S. 398.)

8) *Auf aufgeschwemmtem Boden.*

Reseda, XI. Wau.

R. Luteola L., gelblicher Wau, Färber-Wau.

Orobanche, XIV. Ervenwürger.

O. loricata Rchb., bepanzerte Sommerwurz. (Auf *Tussilago*, *Petasites* und *Berberis vulgaris*.)

(*Reseda lutea*, *Nasturtium anceps*, *N. silvestre* s. May S. 185. — *Erodium pimpinellifolium* s. Jun. S. 398.)

9) *An und in Bächen.*

A. An Bächen.

Glyceria, III. Mannagras.

G. airoides Rchb. (*Aira aquatica* L.), Wasserschmiele.

Apium, V. Selleri.

A. graveolens L., gemeiner Selleri.

Rumex, VI. Ampfer.

R. Patientia L., Garten-A., englischer Spinat.

Epilobium, VIII. Schotenweiderich.

E. obscurum Schreb. Baumg., dunkler Sch.

E. roseum Schreb., rosenfarbiger Schotenw.

Aconitum, XIII. Eisenhut.

A. Cammarum Jacq. Lam., langhelmiger E.

An Bächen.

Galeopsis Tetrahit und *G. versicolor* (s. auf Aeckern).

Mentha, XIV. Minze, Münze.

M. viridis L., grüne Minze.

Hypericum, XVIII. Hartheu.

H. tetrapterum Fries., vierflügeliges Hartheu.

Tanacetum, XIX. Rainfarn.

T. vulgare L., gemeine Rainfarn.

Senecio, XIX. Kreuzkraut.

S. erraticus Bert., herumschweifendes Kr.

Inula, XIX. Alant.

I. britannica L., britannischer A., Wiesen-A.

a) *An Bächen in Alpengegenden.*

Aconitum (s. oben) *cernuum* Wulff., überhängender Eisenhut.

In den höhern Alpen.

Poa, III. Rispengras.

P. annua L., jähriges R. Var. *b. supina*.

b) *An Bächen in Gebüsch.*

Carduus, XIX. Distel.

C. Personata Jacq. (*Arctium Personata* L.), klettenartige Distel.

c) *An Bächen in Waldgebüsch.*

Carduus crispus L. β . *integrifolius*.

In Waldungen.

Eupatorium, XIX. Wasserdoste.

E. cannabinum L., hanfartige Wasserdoste.

B. *In Bächen.*

Potamogeton, IV. Laichkraut.

P. fluitans Roth., fluthendes L. od. Saamkraut.

P. nitens Web., glänzendes L. od. Saamkraut.

P. oblongus Viv., länglich rundes Leimkraut.

P. rufescens Schrad., röthliches L. oder S.

An und in Bächen.

(*Veronica serpyllifolia*, *Stellaria neglecta*, *Spiraea Aruncus*, *Sp. denudata*, *Sp. Ulmaria*, *Nasturtium officinale*, *N. silvestre*, *Sisymbrium strictissimum*. — *Larabrea uliginosa* s. May S. 186 f. — Ferner die im Jun S. 399 f. aufgeführten Pflanzen.

10) *An Basaltfelsen.*

(*Ruta divaricata* s. May S. 187.)

11) *In Baumgärten.*

(*Cynosurus cristatus*, *Aegopodium Podagraria* s. Jun S. 400.)

12) *Auf bebautem Boden.*

Blitum, I. Erdbeerspinat.

Bl. capitatum L., kopfförmiger Erdbeerspinat.

Bl. virgatum L., ruthenförmiger Erdbeerspinat.

Digitaria ciliaris, *filiformis*, *sanguinalis* (s. auf Aeck.)

Setaria, III. Borstengras.

S. verticillata P. R. (*Panicum verticillatum* L.), quirlblüthiger Fennich.

S. viridis P. B. (*Panicum viride* L.), grüner Fennich.

Borugo, V. Boretsch.

B. officinalis L., gemeiner Boretsch.

Datura, V. Stechapfel.

D. Stramonium L., gemeiner Stechapfel.

Solanum, V. Nachtschatten.

S. pterocaulon Dun. (*Solanum nigrum* & *virginicum* Linn.), schwarzbeeriger Nachtschatten.

Chenopodium, V. Gänsefuss.

Ch. acutifolium W., spitzblättriger Gänsefuss.

Ch. album L., weisser Gänsefuss.

Ch. glomerulosum Rchb.

Ch. hybridum L., Bastard-Gänsefuss.

Ch. opulifolium Schrad., schneeballblättriger G.

Ch. paganum Rchb.

Ch. polyspermum L., vielsaamiger Gänsefuss.

Ch. viride L., grüner Gänsefuss. . .

Auf bebaulichem Boden.

Atriplex, V. (XXIII.) Melde.

A. angustifolia Sm., schmalblättrige Melde.

A. hortensis L., Garten-Melde.

A. patula L., ausgebreitete Melde.

Ammi, V. Ammi.

A. majus L., grosses Ammi.

Rumex, VI. Ampfer.

R. obtusifolius L., stumpfblättriger Ampfer.

Polygonum, VIII. Knöterig.

P. amphibium L. γ . terrestre.

P. lapathifolium Ait., ampferblättriger Kn.

P. lapathifolium-nodosum R.

Saponaria, X. Seifenkraut.

S. officinalis L., gemeines S., Waschkraut.

Silene, X. Leimkraut.

S. noctiflora L., nachtblühendes Leimkraut.

Phytolacca, X. Kermesbeere.

Ph. decandra L., zehnfädige Kermesbeere.

Euphorbia, XI. Wolfsmilch.

E. helioscopia L., Sonnen-Wolfsmilch.

E. micrantha Steph., kleinblumige Wolfsmilch.

E. plathyphyllos L., flachblättrige Wolfsmilch.

Galeopsis Tetrahit (s. auf Aeckern).

Satureja, XIV. Bart-Saturey.

S. hortensis L., gemeine Saturey, Bohnenkraut.

Mentha, XIV. Minze, Münze.

M. rubra Huds., rothblättrige Minze.

Senebiera, XV. Senebierre.

S. Coronopus Poir. (*Cochlearia Coronopus* L.),
niedergedrückter Krähenfuss, Saamenkresse,
Schweinskresse.

Vicia, XVII. Wicke.

V. hybrida L., Bastard-Wicke.

Auf bebaulichem Boden.

Melilotus, XVII. Melote.

M. alba Lam. (*Trifolium Melilotus vulgaris Hayne*),
gemeiner, weisser Melotenklee.

Lactuca, XIX. Salat.

L. saligna L., weidenblättriger Salat.

Amaranthus, XXI. Amaranth.

A. Blitum L., kleiner A., wilder Fuchsschwanz.

A. prostratus Balb., gestreckter Amaranth.

A. retroflexus L., zurückgebogener Amaranth.

A. silvestris Desf., Wald-Amaranth.

A. spicatus Lam., geährter Amaranth.

Mereurialis, XXII. Bingelkraut.

M. annua L., einjähriges B., Hundskohl.

(*Blitum Bonus Henricus*, *Veronica serpyllifolia*, *Convolvulus arvensis*, *Stellaria media*, *Cerastium triviale*, *C. vulgatum*, *Oxalis corniculata*, *Euphorbia Lathyris*, *Lepidium campestre*, *Sinapis alba*, *S. nigra*, *Geranium molle*, *G. pusillum*, *G. pyrenaicum*, *Fumaria Vaillantii*, *Medicago lupulina*, *Sonchus asper*, *S. oleraceus*, *Scorzonera octangularis*, *Senecio vulgaris* s. May S. 188 ff. — Ausser diesen noch die meisten im Jun. S. 400 aufgeführten Pflanzen, nämlich: *Gastridium lendigerium*, *Poa annua*, *Agropyrum repens* bis *Asparagus officinalis*, *Lychnis dioica* bis *Vicia sativa*, *Senecio squalidus*, *Urtica urens*.)

13) An und auf Bergen.

Calamagrostis, III. Reithgras.

C. montana Host. (*Arundo montana Gaud.*),
Berg-Reithgras, Berg-Rohr.

Poa, III. Rispengras.

P. hybrida Gaud., Bastard-Rispengras.

Campanula, V. Glockenblume.

C. Hostii Baumg., Host's Glockenblume.

C. petraea L., Felsen-Glockenblume.

An und auf Bergen.

Adenophora, V. Becherglocke.

A. suaveolens Fisch. (*Campanula suaveolens Schrad*), wohlriechende Glockenblume.

Hladnikia, V. Hladnikie.

Hl. pastinacifolia Rchb. pastinakblättrige H.

Oenanthe, V. Rebendolde.

O. Karstia Hacq., karst'sche Rebendolde.

Thymus, XIV. Thymian, Quendel.

Chamaedrys Fries., Gamander-Quendel.

Digitalis, XIV. Fingerhut.

D. purpurascens Rth., purpurröthlicher F.

Rhaponticum, XIX. Rübindistel.

Rh. scariosum Lam. (*Centaurea Rhapontica L.*), klettenblättrige Flockenblume.

Achillea, XIX. Garbe.

A. ochroleuca Ehrh., gelblichweisse Schaafgarbe.

a) *An Bergabhängen.*

Silene, X. Leimkraut.

S. Otites Sm. (*Cucubalus Otites L.*), zweihäusiger Taubenkropf, Ohrlöffeleinkraut.

Corydalis, XVII. Helmbusch, Lerchensporn.

C. lutea De C. (*Fumaria lutea L.*), gelber H., oder Lerchensporn.

b) *An Bergen in Gebüsch.*

Trifolium, XVII. Klee.

Tr. agrarium L., Goldklee.

c) *Auf felsigen Bergen.*

Sedum, X. Fetthenne.

S. reflexum L., zurückgebogene F., Tripmadam.

d) *An begrasten Bergen.*

Campanula (s. oben) *elliptica Kit.*, elliptische Glockenblume.

e) *Auf sehr hohen Bergen.*

Buphthalmum speciosissimum (s. auf Alpen).

f) *Auf trocknen Bergen.*

Cirsium, XIX. Kratzdistel.

C. montanum *Rchb.* (*Cnicus montanus* *W. Kit.*),
Berg-Kratzdistel.

(*Agropyrum cristatum*, *Polygala major*, *Trifolium montanum*, *Hypericum elegans* s. May S. 192 f. — Ausser diesen noch die meisten der im Jun S. 403 ff. aufgeführten Pflanzen, nämlich: *Veronica officinalis* bis *Euphorbia pilosa*, *Rubus hirtus* bis *Betonica officinalis*, *Veronica officinalis*, *Veronica maritima* bis *Asperula montana*.)

14) *In Berggegenden.*

Bupleurum, V. Hasenohr.

B. falcatum *L.*, sichelblättriges Hasenohr.

a) *In Berggegenden in der Nähe von Bächen, Gräben, Quellen in schattigen Wäldern.*

Impatiens, V. Springkraut.

I. Noli tangere *L.*, gelbes Springkraut, Rühr' mich nicht an, wilde Balsamine.

b) *In Berggegenden an feuchten, schattigen Orten.*

Circaea, II. Hexenkraut.

C. intermedia *Ehrh.*, mittleres Hexenkraut.

c) *In Berggegenden an Mauern.*

Epilobium, VIII. Schotenweiderich.

E. collinum *Gm.*, Hügel-Schotenweiderich.

d) *In höhern Berggegenden an feuchten, schattigen Orten.*

Circaea (s. oben) **alpina** *L.*, Alpen-Hexenkraut.

In feuchten und schattigen Nadelwäldern.

Corallorrhiza, XX. Corallenwurz.

C. innata *R. Br.* (*Ophrys Corallorrhiza* *L.*),
gemeine Corallenwurz.

e) *In niedern Berggegenden zwischen Gebüsch*
Clematis, XIII. Waldrebe.

Cl. erecta All. (*Clematis recta L.*), aufrechte W.

f) *Am Fusse von Bergen an feuchten Orten.*
Hypericum, XVIII. Hartheu.

H. quadrangulum L., vierkantiges H. oder Johanniskraut.

g) *An Bergströmen.*

Corrigiola, V. Uferling.

C. littoralis L., Ufer-Knotenkraut.

Aconitum Cammarum (s. an Bächen.)

(*Veronica officinalis* Var. β ., *Neslia paniculata*. *Geranium pyrenaicum*, *Epilobium montanum* s. May S. 195 f. — Ausserdem blühen noch die im Jun S. 406—409 in Berggegenden angemerkten Pflanzen.)

15) *In Bergwäldern.*

Astrantia, V. Thalstern.

A. intermedia M. B., mittlerer Thalstern.

Pteroselinum, V. Flügelsilge.

Pt. Chabraei (*Selinum Chabraei Jacq.*), lang-scheidige Silge.

Orobus, XVII. Walderbse.

O. Clusii Spr. wickenartige Walderbse.

Senecio, XIX. Kreuzkraut.

S. Fuchsii Gmel, Fuchsens Kreuzkraut.

S. nemorensis L., Hain-Kreuzkraut.

Epipactis, XX. Sumpfwurz.

E. microphylla Sw., kleinblättrige Sumpfwurz.

a) *In Bergwäldern an sonnigen Anhöhen.*

Cephalanthera rubra (s. oben an sonnigen Anhöhen.)

b) *In Bergwäldern an feuchten Plätzen.*

Mentha rubra (s. oben auf bebautem Boden.)

c) *In Bergwäldern zwischen Gebüsch.*

Heracleum Panaces (s. auf grasigen Anhöhen.)

d) *In Bergwäldern auf Wiesen.*

Cirsium, XIX. Kratzdistel.

C. heterophyllum All. (*Carduus heterophyllus L.*),
verschiedenblättrige Kratzdistel.

e) *In schattigen Bergwäldern.*

Astrantia (s. oben) *major L.*, grosser Thalstern,
Meisterwurz.

(*Lilium Martagon*, *Fragaria semperflorens*, *Spiraea Aruncus* s. May S. 198 f. — Von den im Jun S. 409 ff. aufgeführten blühen noch: *Cornus sanguinea* bis *Campanula bononiensis*, *Aconitum Stoeckianum*, *Origanum vulgare*, *Hieracium silvaticum* bis *Chimophila umbellata*, *Verbascum cuspidatum* bis *Festuca montana*.)

16) *Auf Bergwiesen.*

Avena pratensis (s. auf dünnen Anhöhen.)

Triodia, III. Dreizahn.

Tr. decumbens P. B. (*Festuca decumbens Willd.*),
niederliegender D. oder Schwingel.

Thesium, V. Leinblatt.

Th. pratense Ehrh., Wiesen-Leinblatt.

Betonica, XIV. Betonie.

B. hirta Leyss., rauhe Betonie.

Picris, XIX. Bitterkraut.

P. umbellata N. v. E., doldenförmiges Bitterkr.

Auf feuchten Bergwiesen.

Senecio, XIX. Kreuzkraut.

S. Doria L., hohes Kr., goldenes Jakobskraut.

(*Ranunculus Thora*, *Melampyrum barbatum* s. May S. 202. — Ausser diesen blühen noch die im Jun S. 411 f. aufgeführten Pflanzen.)

17) *An bewässerten Plätzen.*

Alopecurus, III. Fuchsschwanzgras.

A. fulvus Sm.

A. geniculatus L., knieförmiges Fuchsschwanzgr.

Festuca, III. Schwingel.

F. rubra L., rother Schwingel, Var. f. *Festuca trichophylla* Docr.

18) *Auf Brachäckern.*

Spergella, X. Spergelle.

Sp. subulata (*Spergula subulata* Sw.), pfriemenförmiger, feinbehaarter Spark.

Galeopsis, XIV. Hohlzahn.

G. Ladanum L., Acker-Hanfnessel.

Trifolium, XVII. Klee.

Tr. arvense L., Acker-Klee.

Tr. campestre Schreb., Feld-Kl. (Nach der Aernte.)

Hypericum humifusum (s. auf sandigen Aeckern.)

(*Vicia bithynica* s. May S. 205 und alle im Jun S. 412 f. von *Alchimilla arvensis* bis *Anthemis arvensis* aufgeführten Pflanzen)

19) *Auf Brüchen.*

Drosera, V. Sonnentau.

Dr. longifolia L., langblättriger Sonnentau.

(*Rubus Schlechtendalii* s. Jun S. 413.)

20) *In Buchenwäldern.*

Epipogium, XX. Bananen-Orche.

E. aphyllum Gm. (*Satyrion Epipogium* L.), saftige B. (In dichten, schattigen Buchenwäld.)

Vignea, XXI. Segge.

V. guestphalica Bnngh., westphälische Segge. (Auf schattigem, thonig-kalkigen Boden.)

(*Monotropa glabra*, *M. Hypopithys* s. Jun S. 413.)

21) *Auf Dächern.*

Sempervivum, XI. Hauswurz.

S. tectorum *L.*, gemeiner Hauslauch, Dachwurz.
(*Sedum album* s. Jun S. 413.)

22) *An Dämmen.*

(*Ranunculus repens* s. May S. 205. — *Carduus tenuiflorus* s. Jun S. 414.)

23) *Auf Dammerde.*

(*Spergula vulgaris* s. Jun S. 414.)

24) *Um Dörfer.*

Rumex, VI. Ampfer.

R. nemorosus *Schrad.*, Wald - Ampfer. (An feuchten Orten.)

Anthemis, XIX Kamille.

A. Cotula *L.*, stinkende Kamille, Hunds-K.

Um Dörfer und Städte.

Tilia, XIII. Linde.

T. europaea *L.*, Sommerlinde.

T. parviflora *Ehrh.* (*Tilia europaea* γ . *L.*), kleinblüthige Linde.

25) *Auf Dünen.*

Senecio, XIX. Kreuzkraut.

S. denticulatus *Müll.*, gezähneltes Kr. (Am baltischen Meere.)

(Ausserdem noch die im Jun S. 414 angegebenen Pflanzen.)

26) *Auf und um Dünger.*

Blitum, I. Erdbeerspinat.

B. rubrum (*Chenopodium rubrum* *L.*), rother Gänsefuss, rothe Melde.

Auf und um Dünger.

Echinochloa, III. Stachelgras.

E. Crus galli *P. B.* (*Panicum Crus galli L.*),
Hahnsporn-Fennich, Hühner-Hirse.

Chenopodium, V. Gänsefuss.

Ch. glaucum *L.*, graugrüner G., Mistmelde.

Ch. murale *L.*, Mauer-G., Mauermelde.

Ch. olidum *Curt.* (*Chenopodium Vulvaria L.*),
stinkender Gänsefuss, Stinkmelde.

Ch. rhombifolium *Whlrb.*, rhombenblättriger G.

Atriplex, V. (XXIII.) Melde.

A. microsperma *W. K.*, kleinsamige Melde.

27) *Auf dürren Plätzen.*

Cerithe, V. Wachsblume.

C. strigosa *Rchb.*

Centrophylum, XIX. Spornhülle.

C. lanatum *Rchb.* (*Carthamus lanatus L.*), wol-
liger Saflor.

Auf dürren, sandigen Plätzen.

Conyza, XIX. Dürrwurz.

C. squarrosa *L.*, sparrige D., Flöhkraut.

An dürren, steinigen Plätzen.

Bupleurum, V. Hasenohr.

B. aristatum *Bartl.*, begranntes Hasenohr.

Silene Otites (s. an Bergabhängen).

An dürren, steinigen, sonnigen Orten.

Eryngium V. Mannstreu.

E. amethystinum *L.*, blaue Mannstreu.

(Ausser diesen blühen noch die im Jun S. 414 ange-
merkten Pflanzen.)

28) *Auf Feldern.*

Carduus, XIX. Distel.

C. platylepis *Rchb. Saut.* (In Gebirgsgegenden.)

Auf sandigen Feldern.

Gypsophila, X. Gypskraut.

G. acutifolia Fisch., spitzblättriges Gypskraut.

(*Veronica serpyllifolia* s. May S. 207. — *Agropyrum repens*, *Hypochaeris radicata* s. Jun S. 415.)

29) An Feldrainen und Feldrändern.

Andropogon, III. Bartgras.

A. Ischaemum L., vielähriges Bartgras.

Asterocephalus, IV. Kronen-Scabiose.

A. agrestis (*Scabiosa agrestis W. Kit.*), Acker-Scabiose.

A. ochroleucus (*Scabiosa ochroleuca L.*), weissgelbe Scabiose.

A. suaveolens (*Scabiosa suaveolens Desf.*), wohlriechende Scabiose.

Erythraea, V. Tausendguldenkraut.

E. Centaurium Pers. (*Gentiana Centaurium L.*), grosses Tausendguldenkraut.

Dianthus, X. Nelke.

D. Carthusianorum L., Karthäuser-N., Stein-N.

Silene Otites (s. an Bergabhängen).

Nepeta, XIV. Katzenminze.

N. Cataria L., gemeine Katzenminze.

N. citriodora Balb., citronenduftige Katzenminze.

Thymus Chamaedrys (s. auf Bergen).

Linaria, XIV. Maulblume.

L. vulgaris Bauh. (*Antirrhinum Linaria L.*), gemeines Leimkraut, gelbes Löwenmaul.

Hypericum, XVIII. Hartheu.

H. perforatum L., gemeines H. oder Johanniskraut.

Crepis, XIX. Pippau.

Cr. virens L., grüner Pippau.

Picris, XIX. Bitterkraut.

P. hieracioides L., habichtskrautblättriges B.

*An Feldrainen und Feldrändern.***Lappa, XIX.** Klette.*L. tomentosa All.* (*Arctium tomentosum Schk.*),
filzige Klette.**Tanacetum vulgare** (s. an Bächen).**Senecio, XIX.** Kreuzkraut.*S. Jacobaea L.*, Jacobskraut.**Centaurea, XIX.** Flockenblume.*C. paniculata L.*, rispenartige Flockenblume.*C. Scabiosa L.*, Scabiosen-Flockblume.*An sandigen Feldrainen.***Ononis, XVII.** Hauhechel.*O. spinosa L.*, dornige Hauhechel.*An trocknen Feldrainen.***Atriplex, V. (XXIII.)** Melde.*A. tatarica L.*, tatarische Melde.

(*Veronica prostrata*, *Anchusa arvalis*, *Armeria vulgaris*,
Polygonum aviculare, *Stellaria graminea*, *Euphorbia Esula*,
Geranium rotundifolium, *Astragalus Cicer*, *Poterium Sanguisorba* s. May S. 208 f.

Ausser diesen noch die im Jun S. 415 ff. aufgezeichneten Pflanzen.)

30) An Feldwegen.**Rosa, XIII.** Rose.*R. spinosissima L.*, vielstachelige Rose.

(Camelina microcarpa s. May S. 210.)

31) An Felsen.**Heteropogon, III.** Schopfgras.*H. Allionii K. H. B.* (*Andropogon contortum All.*)**Poa, III.** Rispengras.*P. cenisia All.*, Var. b. *P. badensis Hnk.*, badenisches Rispengras.*P. compressa L.*, zusammengedrücktes, plattes R.

An Felsen.

Asterocephalus gramuntius (s. auf trockn. Anhöhen).

Athamanta, V. Augenwurz.

A. rupestris *Rchb.*, felsenliebende Augenwurz.

Ferula, V. Steckenkraut.

F. Ferulago *L.*, sicilisches Steckenkraut.

F. sulcata *Desf.*

Seseli, V. Sesel.

S. tortuosum *L.*, gebüschelter S. od. Bergfenchel.

Bupleurum, V. Hasenohr.

B. ranunculoides *L.*, ranunkelartiges Hasenohr.

Porrum, VI. Porrey.

P. strictum (*Allium strictum* *Schrad.*), gerader Lauch.

Epilobium, VIII. Schotenweiderich.

E. collinum *Gm.*, Hügel-Weiderich.

Sedum, X. Fetthenne.

S. anopetalum *De C.*

S. maximum *Pers.* (*Sedum Telephium* *e. maximum* *L.*), grösster Knörpel.

S. rupestre *Dill. L.*, Felsen-Knörpel.

Phytolacca, X. Kermesbeere.

Ph. decandra *L.*, zehnfädige Kermesbeere.

Sempervivum, XI. Hauswurz.

S. globiferum *Mill.*, kugelknospige Hauswurz.

Punica, XII. Granatbaum.

P. Granatum *L.*, gemeiner Granatbaum.

Thalictrum, XII. Wiesenraute.

Th. majus *L.*, grosse Wiesenraute.

Teucrium Chamaedrys (s. an sonnigen Anhöhen).

Micromeria, XIV. Bart-Saturey.

M. montana (*Satureia montana* *L.*), Berg-Saturey.

M. pygmaea *Rchb.* (*Satureia pygmaea* *Sieb.*), Zwerg-Saturey.

An Felsen.

Clinopodium vulgare (s. an sonnigen Anhöhen).

Linaria vulgaris (s. an Feldrainen).

Cytisus, XVII. Bohnenstrauch.

C. nigricans L., schwärzlicher B. oder Geisklee.

Hypericum perforatum (s. auf Feldrainen).

Hieracium, XX. Habichtskraut.

H. Lachenalii Gmel., Lachenals Habichtskraut.

Lactuca, XIX. Salat.

L. virosa L., giftiger Salat.

Picris, XIX. Bitterkraut.

P. ruderalis Schm., Schutt-Bitterkraut.

Carlina acaulis (s. an Ackerrändern).

Chrysocoma, XIX. Goldhaar.

Chr. Linosyris L., leinblättriges Goldhaar.

Conyza squarrosa (s. an durren, sandigen Plätzen).

Ficus, XXII. Feige.

F. Carica L., gemeine Feige. (Verwildert.)

a) *An Felsen zwischen Gebüsch.*

Galium, IV. Labkraut.

G. aristatum L., begranntes Labkraut.

Aster, XIX. Sternblume.

A. Amellus L., blaue Sternblume.

b) *An Felsen der Hochalpen.*

Erigeron, XIX. Berufungskraut.

E. alpinus L., Alpen-B. Var. β . *Erigeron grandiflorus* Hoppe), grossblüthiges Berufungskraut.

c) *An Felsen der Halkalpen.*

Veronica, II. Ehrenpreis.

V. saxatilis L., Felsen-Ehrenpreis.

Helianthemum alpestre (s. S. 458).

d) *An bewachsenen Felsen.*

Hieracium, XIX. Habichtskraut.

H. laevigatum Willd., glattes Habichtskraut.

e) *Auf hohen Felsen des Urgebirgs.*

Sempervivum (s. ob.) *montanum* L., Berg-Hauswurz.

f) *An nackten Felsen.*

Sempervivum arachnoideum L., spinnenwebartige Hauswurz. (Auf Alpen.)

Sedum (s. oben) *repens* Schleich., kriechender Knörpel. (In Gebirgen.)

g) *An sonnigen Felsen.*

Andropogon Ischaemum (s. an Feldrainen.)

Allium, VI. Lauch.

A. acutangulum W., kantiger Lauch.

Dianthus, X Nelke.

D. vaginatus Vill., scheidige Nelke. (Vorzüglich auf Kalkboden.)

D. cariophylloides Schult. (Auf Kalkgebirgen.)

Stachys germanica und *St. recta* (s. an Ackerränd.)

Inula, XIX. Alant.

I. germanica L., deutscher Alant.

h) *An steinigen Felsen.*

Solanum, V. Nachtschatten.

S. Dulcamara L., kletternder N., Bittersüß.

i) *An Felsabhängen der Alpen.*

Avena, III. Hafer.

A. sempervirens Vill., immergrüner Hafer.

k) *An Felsrändern.*

Campanula, V. Glockenblume.

C. pyramidalis L., pyramidenförmige Gl.

l) *In Felsritzen.*

Seseli (s. oben) *montanum* L., Berg-Sesel.

Linaria, XIV. Maulblume.

L. chloraefolia Rehb.

m) *An felsigen Orten.*

Pteroselinum, V. Flügelsilge.

Pt. austriacum (*Selinum austriacum Jacq.*), österreichische Silge.

Galcopsis, XIV. Hohlzahn.

G. angustifolia Ehrh., schmalblättrige Hanfnessel. (Vorzüglich an Kalkbergen.)

Origanum, XIV. Dosten.

O. heracleoticum L., griechischer Dosten.

An felsigen, steinigen Plätzen.

Festuca, III. Schwingel.

F. pumila Vill., niedriger Schw. (Auf Hochalpen.)

Crithmum, V. Bacille.

Cr. maritimum L., schmalblättriger Meerfenchel.

Hieracium (s. oben) *asperum Schleich.*, schärfliches Habichtskraut.

Anthemis, XIX. Chamille.

A. tinctoria L., Färber-Chamille.

Rhodiola, XXII. Rosenwurz.

Rh. rosea L., gem. R. (In Alpen und Voralpen.)

(*Salvia officinalis*, *Campanula rotundifolia*, *Cynanchum Vincetoxicum*, *Dianthus caesius*, *Orobanche Rapum*, *Linaria Cymbalaria*, *Arabis alpina*, *Geranium lucidum*, *Corydalis lutea*, *Hippocrepis comosa*, *Poterium glaucescens*. — *Festuca glauca*, *Lychnis Viscaria*, *Camelina microcarpa*, *Noccaea alpina*, *Arctostaphylos Uva ursi* s. May S. 210 ff. — Ausser diesen noch die meisten der im Jun S. 418 angemerkten Pflanzen, nämlich: *Centranthus ruber*, *Poa nemoralis* bis *Campanula cespitosa*, *Anthericum Liliago* bis *Digitalis purpurea*, *Arabis alpina* bis *Sabulina Gerardi*, *Asperula tinctoria*, *Moehringia muscosa* bis *Sedum Cepaea*, *Calamintha thymifolia* bis *Hypericum Coris*, *Hieracium amplexicaule* bis *Echinospermum deflexum*.)

31) *Auf fettem Boden.*

Blitum rubrum, **Chenopodium rhombifolium** (siehe auf Dünger.)

(*Erodium pimpinellifolium* s. Jun S. 398.)

33) *An feuchten Orten.*

Veronica, II. Ehrenpreis.

V. scutellata *L.*, schildsaamiger Ehrenpreis.

Lycopus, II. Wolfsfuss.

L. europaeus *L.*, gemeiner Wolfsfuss.

L. exaltatus *L.*, hoher Wolfsfuss.

Fimbristylis, III. Faserriet.

F. Micheliana *R.* (*Scirpus Michelianus L.*) Michelische Binse.

Heleogiton, III. Grundbinse.

H. trigonum (*Scirpus trigonus Rth.*)

H. triquetrum (*Scirpus triqueter L.*), dreikantige Binse.

Agropyrum, III. Queckengras.

A. acutum *R. S.* β . affine (*Triticum affine Deth.*), steifer Weizen.

Brachypodium, III. Kurzstielchen.

Br. gracile *P. B.* (*Bromus gracilis Weig.*), schlanke Trespe.

Isnardia, IV. Isnardie.

I. palustris *L.*, Basilienblatt.

Rumex, VI. Ampfer.

R. Nemolapathum *Ehrh.*, knäuelblüthiger A.

R. nemorosus *Schr.*, Wald-Ampfer.

Polygonum, VIII. Knöterig.

P. Hydropiper *L.*, Wasser-Pfeffer.

P. lapathifolio-nodosum *R.*

P. laxiflorum *Weihe*, schlaffblüthiger Kn.

P. nodosum *Pers.* knotiger Knöterig.

P. Persicaria *L.*, Flöhkraut-Knöterig.

Lotus, XVII. Hornklee.

L. uliginosus *Schk.*, Sumpf-Hornklee.

Carpesium, XIX. Kragenblume.

C. cernuum *L.* hängende Kragenblume.

*An feuchten Orten.***Gnaphalium, XIX.** Ruhrkraut.Gn. uliginosum *L.*, Sumpf-Ruhrkraut.**Inula, XIX.** Alant.I. Oetteliana *Rchb.*, Oettelischer Alant.**Pulicaria, XIX.** Badekraut.P. dysenterica *Gaert.* (*Inula dysenterica L.*),
Ruhr-Alant.a) *An feuchten Orten in Bergwäldern.***Mentha rubra** (s. auf bebautem Boden).b) *An feuchten Orten in Gebirgsgegenden.***Streptopus, VI.** Knotenfuss.Str. amplexifolius *Pers.* (*Uvularia amplexifolia L.*),
stängelumfassendes Zapsenkraut. (In Gebüsch.)**Ranunculus aconitifolius** (s. May S. 227.)c) *An feuchten Orten in Gebüsch.***Convolvulus, V.** Winde.C. sepium *L.*, Zaunwinde.**Cucubalus, X.** Taubenkropf.C. baccifer *L.*, beerentragender Taubenkropf.d) *An feuchten Orten auf Hügeln.***Hypericum, XVIII.** Hartheu.H. quadrangulum *L.*, vierkantiges Hartheu oder
Johanniskraut.e) *An feuchten Orten in Thälern.***Galeopsis, XIV.** Hohlzahn.G. versicolor *Curt.*, bunte Hanfnessel.f) *An feuchten Orten in Wäldern.***Epilobium montanum** (s. in Berggegenden zwischen
Gebüsch.)**Cucubalus baccifer** (s. oben unter c).

An feuchten Orten in schattigen Waldungen.

Rumex (s. oben) *nemorosus* Schrad., Wald-Ampfer.

g) *An feuchten, niedrigen Orten.*

Chlora, VIII. *Chlora*.

Chl. acuminata K. Z. zugespitzte *Chlora*.

h) *An feuchten, schattigen Orten.*

Atriplex *microsperma* (s. auf Dünger.)

Rumex *obtusifolius* (s. auf bebautem Boden.)

Polygonum (s. oben) *minori-Persicaria* Br.

An feuchten, schattigen Orten in Berggegenden
(s. in Berggegenden.)

i) *An feuchten, schlammigen Orten.*

Erythraea, V. Tausendguldenkraut.

E. spicata Pers. (*Gentiana spicata* L.), geähr-
tes Tausendguldenkraut.

k) *An feuchten, überschwemmtgewesenen Orten.*

Chenopodium, V. Gänsefuss.

Ch. glaucum L., graugrüner Gänsefuss.

(*Sagina maritima*, *S. procumbens* β . *fontana*, *Potentilla*
Anserina, *Ranunculus hirsutus*, *R. repens*, *Ephemerum nemo-*
rum, *Myrrhis odorata*, *Stellaria nemorum*, *Cardamine tri-*
folia, *Poa annua*, *Barbarea stricta*, *Sisymbrium strictissi-*
mum s. May S. 217 ff.

Ausser diesen noch vom Jun S. 424 ff.: *Veronica*
Anagallis bis *Stachys palustris*, *Chaerophyllum aureum* bis
Stachys silvatica, *Festuca arundinacea* bis *Ranunculus mu-*
ricatus.)

34) *In Fichtenwäldern.*

Linnaea, XIV. *Linnäe*.

L. borealis Gron., nordische L., nördliches Moos-
glöckchen. (An schattigen, feuchten, moosi-
gen Stellen.)

(*Monotropa Hypopithys* s. Jun S. 426.)

35) *Im Flugsande.*

Holoschoenus, III. Kugelriet.

H. exserens Rchb. (*Scirpus Holoschoenus Scholl.*),
langnarbiges Knabenkraut.

(*Tribulus terrestris*, *Achillea pectinata* s. Jun S. 426.)

36) *An und in Flüssen.*

(Vergl. Bergströme, Gebirgsflüsse und Gries.)

A. *An Flüssen.*

Blitum virgatum (s. auf bebautem Boden.)

Heleogiton, III. Grundbinse.

H. pungens (*Scirpus pungens Vahl.*), stechen-
de Binse.

Calamagrostis, III. Reithgras.

C. Epigeios Rth. (*Arundo Epig. L.*), Land-Rohr.

C. glauca Rchb. (*Arundo glauca M. B.*), blau-
grünes Rohr.

C. Hübneriana Rchb., Hübnerisches Rohr.

Asperula, IV. Waldmeister.

A. rivalis Sibth. Sm., Bach-Waldmeister.

Apium graveolens (s. an Bächen.)

Myricaria, V. Myricarie.

M. squamosa Desv. (*Tamarix germanica Schk.*),
schuppige M. oder Tamariske.

Oenothera, VIII. Nachtkerze.

O. muricata L., weichstachelige Nachtkerze.

Epilobium, VIII. Schotenweiderich.

E. angustifolium L., schmalblättr. Weidenröslein.

Polygonum, VIII. Knöterig.

P. nodosum Pers., knotiger Knöterig.

P. lapathifolio-nodosum R.

Elatine, VIII. Tännel.

E. hexandra De C., sechsfädiger Tännel.

An Flüssen.

Cucubalus baccifer (s. an feuchten Orten zwischen Gebüsch.)

Lythrum, XI. Weiderich.

L. Salicaria L., gemeiner W., Aehren-W.

Euphorbia platyphyllos (s. auf bebautem Boden.)

Mentha rubra (s. auf bebautem Boden.)

Lindernia, XIV. Lindernie.

L. pyxidaria L., gemeines Büchsenkraut.

Ononis, XVII. Hauhechel.

O. Natrix L., gelbe Hauhechel.

Hypericum, XVIII. Hartheu.

H. commutatum Nolte, verwechseltes Hartheu.

Senecio, XIX. Kreuzkraut.

S. paludosus L., Sumpf-Kreuzkraut.

S. sarracenicus L., sarracenisches Kreuzkraut.

Inula britannica (s. an Bächen.)

Zannichellia, XXI. Zannichellie.

Z. gibberosa Richb.

Humulus, XXII. Hopfen.

H. Lupulus L., gemeiner Hopfen.

a) *An Flüssen in der Nähe des Meeres.*

Juncus, VI. Simse.

J. repens Req. kriechende Simse.

b) *An Flüssen auf Sandboden.*

Silene, X. Leimkraut.

S. tatarica Pers. (*Cucubalus tataricus* L.), einseitiger Taubenkropf.

c) *An Flüssen in Waldgebüsch.*

Carduus, XIX. Distel.

C. crispus L., krause D. Var β . *integrifolius*.

d) *An bespülten Flussufern.*

Elatine (s. ob.) *Hydropiper* L., kleiner Wasserpfeffer.

*B. In Flüssen.***Potamogeton**, IV. Laichkraut.*P. fluitans* (s. in Bächen).*P. pectinatus* *L.*, kammartiges *L.* oder Saamkr.*In langsamen Flüssen mit kleinem Wasser.***Naias**, XXII. Najade.*N. marina* *L.*, Seestrands-Najade.*Auf Flussinseln.***Lythrum** (s. oben) *virgatum* *L.*, ruthenförmiger Weiderich.(Gratiola officinalis, Euphorbia Esula, Nasturtium anceps, *N. silvestre*, Isatis tinctoria, Barbarea stricta, Sisymbrium strictissimum s. May S. 221 f. — Ausser diesen noch die im Jun S. 426 ff. aufgeführten Pflanzen.)**37) In und an Gärten.****Digitaria**, III. Fingergras.*D. sanguinalis* *Scop.* (*Panicum sanguinale* *L.*), gemeines F., Bluthirse. (Auf Gartenauswurf.)**Setaria**, III. Borstengras.*S. verticillata* *P.B.* (*Panicum verticillatum* *L.*), quirlblüthiger Fennich.**Atriplex nitens** (s. an Ackerrändern).**Sedum**, X. Fetthenne.*S. reflexum* *L.*, zurückgebogener Knörpel, Trippmadam.

(Agropyrum repens, Nepeta citriodora s. Jun S. 428.)

38) Auf und in Gebirgen.**Calamagrostis**, III. Reithgras.*C. nutans* *Saut.*, überhängendes Reithgras.**Campanula**, V. Glockenblume.*C. linifolia* *W.*, leinblättrige Glockenblume.**Jasione**, V. Jasione.*J. perennis* *Lam.* ausdauernde Schafscabiose.

Auf und in Gebirgen.

Heracleum, V. Bärenklau.

H. sibiricum L., sibirisches Heilkraut.

Pteroselinum, V. Flügelsilge.

Pt. rablense (Ferula rablensis Wulff.), kärnthische Flügelsilge.

Pleurospermum, V. Rippnüsschen.

Pl. austriacum Hoffm. (Ligusticum austriacum L.), österreichischer Liebstöckel.

Allium, VI. Lauch.

A. Victorialis L., netzwurzeliger Lauch, Allermannsharnisch.

Streptopus amplexifolius (s. an feuchten Orten in Gebirgsgegenden.)

Rumex, VI. Ampfer.

R. arifolius All. (Rumex Acetosa δ . L.), aronblättr. A.

Dianthus, X. Nelke.

D. neglectus Lois., vernachlässigte Nelke.

Aconitum, XIII. Eisenhut.

A. Bernhardianum Rchb., Bernhardischer E.

A. eminens Korh., langlippiger Eisenhut.

A. hians Rchb.

A. pyrenaicum L., pyrenäischer Eisenhut.

Hieracium, XIX. Habichtskraut.

H. murorum L., Mauer-Habichtskraut.

Cineraria, XIX. Aschenpflanze.

C. rivularis W.K., Bach-Aschenpflanze.

Pulicaria, XIX. Badekraut.

P. odora Rchb. (Inula odora L.), wohlriechender Alant.

a) *In Gebirgen an Bächen.*

Archangelica, V. Engelwurz.

A. officinalis Hoffm. (Angelica Archangelica L.), edle Engelwurz.

Androsaemum officinale (s. Jun. S. 368).

b) *Auf Gebirgen an Felsen.*

Sabulina Gerardi (s. Jun S. 421).

In Gebirgen an nackten Felsen.

Sedum repens (s. an nackten Felsen).

c) *In Gebirgen an feuchten Orten.*

Heracleum (s. oben) *flavescens Bess.*, gelbliche Bärenklau.

H. longifolium Jacq., langblättrige Bärenklau.
Aconitum (s. oben) *multifidum Koch.*, vielspaltiger Eisenhut. Var. β . **Aconitum callibotryon Rchb.**
A. strictum Bernh., schnurgerader Eisenhut.

An feuchten, steinigen Orten.

Potentilla aurea (s. auf Alpentriften).

d) *In Gebirgen auf Moorboden.*

Trifolium, XVII. Klee.

Tr. spadiceum L., brauner Klee.

e) *In Gebirgen an schattigen Plätzen.*

Laserpitium, V. Laser.

L. Archangelica Jacq., engelwurzblättr. Laserkraut.

f) *Auf Gebirgen an steinigen Plätzen.*

Viola lutea (s. auf feuchten Alpentriften).

Potentilla aurea (s. oben unter c.)

g) *In Gebirgen in Sümpfen.*

Hoppea, XIX. Hoppea.

H. sibirica Rchb. (*Cineraria sibirica L.*), sibirische Hoppea oder Aschenpflanze.

Orchis, XX. Knabenkraut.

O. speciosa Host., prächtiges Knabenkraut.

h) *In Gebirgen auf Triften.*

Meum, V. Bärwurz.

M. athamanticum Jacq. (*Athamanta Meum L.*), feinblättrige Bärwurz.

i) *In Gebirgen an Waldrändern.*

Euphorbia, XI. Wolfsmilch.

E. amygdaloides L., mandelblättrige W.

k) *In Gebirgen auf Wiesen.*

Veronica, II. Ehrenpreis.

V. spicata L., ährenblüthiger Ehrenpreis.

l) *In hohen Gebirgen.*

Meum Mutellina (s. auf Alpen auf Triften.)

Saxifraga, X. Steinbrech.

S. nivalis L., Gletscher-Steinbrech.

Gypsophila, X. Gypskraut.

G. repens L., kriechendes Gypskraut.

Sedum, X. Fetthenne.

S. repens Schleich., kriechender Knörpel.

Aconitum (s. oben) *exaltatum* Brnh., hoher Eisenhut.

A. palmatifidum Rchb., handspaltiger Eisenhut.

Hedysarum, XVII. Süssklee.

H. obscurum L., Gebirgs-Hahnenkopf.

In höhern Gebirgen an quelligen Orten.

Epilobium, VIII. Schotenweiderich.

E. nutans Tsch., überhängender Sch.

An steinigen Orten.

Homogyne, XIX. Alplattig.

H. alpina H. Cass. (*Tussilago alpina* L.), Alpen-Huflattig, Groschenkraut.

Auf Wiesen.

Poa, III. Rispengras.

P. sudetica Haenke, Riesengebirgs-Rispengras.

Auf hohen Gebirgswiesen an felsigen Stellen.

Campanula (s. oben) *thyrsoidea* L., straussartige Glockenblume.

m) *In Gebirgsgegenden.*

Epilobium rosmarinifolium (s. in Alpengegenden an steinigen Orten.)

In Gebirgen an Aeckern.

Lactuca virosa (s. an Felsen).

In Gebirgsgegenden angepflanzt.

Imperatoria, V. Kaiserwurz.

I. *Osthrutium* L., gemeine Meisterwurz. (Verw.)

Archangelica officinalis (s. oben unter a).

In Gebirgsgegenden auf Feldern.

Carduus platylepis (s. auf Feldern.)

In Gebirgsgegenden an feuchten Stellen.

Veratrum, VI. (XXIII.) Germer.

V. *nigrum* L., schwarzer Germer.

In Gebirgsgegenden in Gebüsch.

Achillea, XIX. Garbe.

A. *lanata* Spr., wollige Schaafgarbe.

In Gebirgsgegenden an begrasten Plätzen.

Achillea magna L., grosse Schaafgarbe.

In Gebirgsgegenden auf Wiesen.

Geracium, XIX. Sperberkraut.

G. *succisaefolium* (*Hieracium succisaefolium* All.), abbissblättriges Habichtskraut.

Leontodon, XIX. Löwenzahn.

L. *pratensis* Rchb., Wiesen-Löwenzahn.

Scorzonera, XIX. Haferwurz.

Sc. *grandiflora* Lap., grossblumige Haferwurz.

Achillea lanata (s. oben).

Auf nassen Wiesen.

Cineraria (s. oben) *aurantiaca* Hpp., pomeranzenfarbige Aschenpflanze.

n) *In Gebirgsgründen an Bächen und Wasserfällen.*

Aconitum (s. oben) *laetum* *Rchb.*

o) *An Hochgebirgsströmen.*

Arabis *bellidifolia* (s. auf Alpen an feuchten, steinigen Orten.)

p) *In Gebirgsthälern.*

Aconitum (s. oben) *multifidum* *Koch.*, vielspaltiger Eisenhut.

In Gebirgsthälern an feuchten Orten.

Cardamine, XIV. Schaumkraut.

C. trifolia *L.*, dreiblättriges Schaumkraut.

In Gebirgsthälern auf Wiesen.

Crepis *grandiflora* (s. auf Alpen).

Am Fusse von Gebirgen.

Cynanchum, V. Hundswürger.

C. medium *R. Br.*, mittlerer Hundswürger.

q) *In Gebirgswäldern.*

Laserpitium, V. Laser.

L. asperum *Crntz.*, scharfes Laserkraut.

Sonchus, XIX. Distelsalat.

S. alpinus *L.*, Alpen-Gänsedistel.

Prenanthes, XIX. Hasensalat.

Pr. purpurea *L.*, purpurblüthiger Hasensalat.

Pr. tenuifolia *All.*, schmalblättriger Hasensalat.

Senecio, XIX. Kreuzkraut.

S. Jacquinianus *Rchb.*, Jacquinisches Kreuzkr.

Achillea (s. oben) *tanacetifolia* *All.*, rainfarnblättrige Schaafgarbe.

Centaurea, XIX. Flockenblume.

C. austriaca *W.*, österreichische Flockenblume.

In Gebirgswäldern an feuchten Orten.

Arabis, XV. Gänsekraut.

A. Halleri L., Hallers-Gänsekraut.

Epipactis, XX. Sumpfwurz.

E. latifolia Sw. (Serapias Helleborine α . latifolia L.), breitblättrige Sumpfwurz.

In Gebirgswäldern an Kalkfelsen.

Aquilegia, XIII. Akeley.

A. pyrenaica De C. pyrenäische Akeley.

In Gebirgswäldern an schattigen Plätzen.

Atropa, V. Tollkirsche.

A. Belladonna L., gemeine Tollkirsche.

Campanula (s. oben) latifolia L., breitblättrige Glockenblume.

(Festuca glauca b. laevigata, Geranium divaricatum, Buphthalmum salicifolium, Arctostaphylos Uva ursi, Habenaria albida, Bunium Bulbocastanum, Trientalis europaea, Bunias Erucago, Ranunculus aconitifolius β . platanifolius, R. polyanthemos, Ephemerum nemorum, Myrrhis odorata, Geranium nodosum, Lilium chalcedonicum, Doronicum Matthioli, D. Pardalianches. — Ausser diesen noch die meisten der im Jun S. 428 ff aufgeführten Pflanzen, nämlich: Veronica spuria, Poa nemoralis, Polemonium coeruleum bis Carex tetanica, Salix limosa bis Vicia silvatica, Thalictrum angustifolium bis Scrofularia chrysanthemifolia, Lilium bulbiferum bis Nigritella globosa.)

39) *In Gebüsch.*

Convolvulus, V. Winde.

C. sepium L., Zaun-Winde.

Heracleum, V. Bärenklau.

H. Sphondylium L., unächte B., gem. Heilkraut.

Selinum, V. Silge.

S. Gmelini de Bray., Gmelins Silge.

Cnidium, V. Brenndolde.

Cn. palustre (Selinum pal. L.), Sumpf-Silge.

In Gebüsch.

Pteroselinum austriacum (s. an felsigen Orten).

Laserpitium, V. Laser.

L. latifolium *L.*, breitblättriges Laserkraut.

Torilis, V. Borstdolde.

T. Anthriscus *Gmel.* (*Tordylium Anthriscus* *L.*),
gemeiner Klettenkörbel.

T. infesta *Hffm.*, verhasster Klettenkörbel.

Asparagus, V. Spargel.

A. acutifolius *L.*, spitzblättriger Spargel.

Polygonum, VIII. Knöterig.

P. dumetorum *L.*, Hecken-Knöterich.

P. tataricum *L.*, tatarischer Buchweizen.

Dianthus, X. Nelke.

D. superbus *L.*, stolze Nelke, Pfauen-Nelke,
Busch-Nelke, Feder-Nelke.

Clematis, XIII, Waldrebe.

Cl. Vitalba *L.*, gemeine Waldrebe.

Clinopodium vulgare (s. an sonnigen Anhöhen).

Malva, XVI. Malve, Käspappel.

M. Alcea *L.*, schlitzblättrige *M.*, Rosenpappel.

M. Morenii *Pollin.*, Morenische Malve.

Althaea, XVI. Eibisch.

A. cannabina *L.*, hanfblättriger Eibisch.

Medicago, XVII. Schneckenklee.

M. falcata *L.*, Sichel-Schneckenklee.

M. media *Pers.*, mittlerer Schneckenklee.

Lappa, XIX. Klette.

L. major *Gaertn.* (*Arctium majus* *Gmel.*),
grosse Klette.

Senecio paludosus (s. an Flüssen).

Inula germanica (s. an sonnigen Felsen).

Mercurialis, XXII. Bingelkraut.

M. ambigua *L. fil.*

a) *In Gebüsch an Aeckern, Hügeln, Waldrändern.*
Codonoprasum, VI. Glockenlauch.

C. oleraceum (*Allium oleraceum* L.), Gemüselauch.

b) *Zwischen Gebüsch in Berggegenden.*
Epilobium montanum (s. oben in Berggegenden).

Zwischen Gebüsch in niedern Berggegenden.
Clematis erecta (s. in niedern Berggegenden).

Zwischen Gebüsch in Bergwäldern.
Heracleum Panaces (s. in Bergwäldern).

c) *Zwischen Gebüsch an Felsen.*
Galium aristatum, **Aster Amellus** (s. an Felsen zwischen Gebüsch).

d) *Zwischen Gebüsch an feuchten Orten.*
Asperula, IV. Waldmeister.
A. rivalis Sibth. Sm., Bach-Waldmeister.
Cucubalus baccifer (s. an feuchten Orten in Gebüsch).
Streptopus amplexifolius (s. an feuchten Orten in Gebirgsgegenden).

e) *In Gesträuch an freien Plätzen.*
Poa, III. Rispengras.
P. nemoralis L., Hain-R. Var. b. *firmula* Gaud.

f) *In Gebüsch in Gebirgsgegenden.*
Achillea lanata (s. in Gebirgsgegenden in Gebüsch).

g) *In Gebüsch an Kalkbergen.*
Coronilla, XVII. Kronwicke.
C. montana Riv., Berg-Kronwicke.

h) *In Gebüsch auf Sandboden.*
Saponaria officinalis (s. auf bebautem Boden).

i) *In Gebüsch an steinigen Orten.*
Picris umbellata (s. auf Bergwiesen).

k) *In Gebüsch an Wäldern und Zäunen.*

Rubus, XII. Himbeere, Brombeere.

R. Sprengelii Weihe, Sprengels Brombeere.

(*Veronica Chamaedrys, Galium Mollugo, Myosotis sparsiflora, Rosa sempervirens, Clematis Viticella, Geranium robertianum, Bonjeanea hirsuta, Hesperis inodora, Stellaria nemorum* s. May S. 230 ff. — Ausser diesen noch die meisten der im Jun S. 436 aufgeführten Pflanzen, nämlich: *Veronica officinalis* bis *Avena pubescens, Galium Aparine* bis *Asparagus officinalis, Rosa canina, R. cariophyllacea, R. inodora, R. rubiginosa, R. sepium*, alle dort angemarkten Arten von *Rubus, Althaea officinalis* bis *Echinospermum deflexum, Verbascum austriacum* bis *Corydalis claviculata*)

40) *In Gehauen.*

Torilis Anthriscus (s. oben Nr. 39 in Gebüsch.)

41) *Unter Getreide.*

Bromus, III. Trespe.

Br. multiflorus Sm., vielblüthige Trespe.

Br. secalinus L., Roggen-Trespe.

Avena, III. Hafer.

A. brevis Roth., kurzer H., Sperlingschnabel.

A. nuda L., nackter H., Spinnenhafer.

Prismatocarpus, V. Venusspiegel.

Pr. hybridus l' Herit. (*Campanula hybrida L.*),
Bastard-Glockenblume.

Turgenia, V. Turgenie.

T. latifolia Hoffm. (*Caucalis latifolia L.*), breit-
blättrige Haftdolde.

Agrostemma, X. Rade.

A. Githago L., Kornrade.

Nigella, XIII. Schwarzkümmel.

N. arvensis L., Acker-Schwarzkümmel.

Unter Getreide.

Galeopsis, XIV. Hohlzahn.

G. Ladanum *L.*, Acker-Hanfnessel.

G. versicolor *Curt.*, bunte Hanfnessel.

(*Euphorbia segetalis* s. May S. 234 und alle im Jun S. 440 f. angegebenen Pflanzen.)

42) *An und in Gräben.**A. An Gräben.*

Cyperus longus (s. an feuchten Abhängen).

Echinochloa Crus galli (s. an Dünger).

Poa, III. Rispengras.

P. angustifolia *L.*, schmalblättriges Rispengras.

Dipsacus, IV. Karden.

D. ferox *Lois.*, vielstachelige Karden.

D. laciniatus *L.*, zerschlissene Karden.

D. pilosus *L.*, haarige Karden.

D. silvestris *Mill.* (*Dipsacus fullonum* *a. L.*), wilde Karden.

Lysimachia, V. Lysimachie.

L. guestfalica *Weihe*, westphälische Lysimachie oder Goldblume.

L. vulgaris *L.*, gemeine L. oder Goldblume.

Thysselium, V. Thysselin.

Th. palustre *Hoffm.* (*Selinum palustre* *Sm.*), Sumpf-Silge.

Juncus, VI. Simse.

J. lamprocarpos *Ehrh.* (*Junc. articulatus* *b. Linn.*), glanzfrüchtige S., gemeine Glieder-Simse.

Epilobium, VIII. Schotenweiderich.

E. angustifolium *L.*, schmalblättr. Weidenröslein.

E. obscurum *Schreb. Baumg.* (An Mühlgräben).

E. persicinum *Rchb.*, purpurblüthiges Weidenröslein.

E. roseum *Schreb.*, rosenfarbenes Weidenröslein.

An Gräben.

Cucubalus baccifer (s. an feuchten Orten zwischen Gebüsch).

Lythrum, XI. Weiderich.

L. Salicaria *L.*, gemeiner W., Aehren-W.

L. tomentosum *Mill.*, filziger Weiderich.

Potentilla, XII. Fingerkraut.

P. reptans *L.*, kriechendes Fingerkraut.

Galeopsis versicolor (s. an feucht. Orten in Thälern).

Mentha, XIV. Minze, Münze.

M. arvensis *L.*, Feld-Minze.

M. gratissima *Wigg.*, angenehme Minze.

M. rubra *Huds.*, rothblumige Minze.

Clinopodium vulgare (s. an sonnigen Anhöhen).

Althaea XVI. Eibisch.

A. cannabina *L.*, hanfblättriger Eibisch.

A. officinalis *L.*, gemeiner Eibisch.

Hypericum tetrapterum, Tanacetum vulgare (siehe an Bächen).

Cotula, XIX. Lungenblume.

C. coronopifolia *L.*, krähensfußblättrige *L.*

Senecio erraticus (s. auf feuchten Aeckern).

Pulicaria dysenterica (s. an feuchten Plätzen).

Anthemis Cotula (s. um Dörfer).

Centaurea, XIX. Flockenblume.

C. Calcitrapa *L.*, Sterndistel.

a) *An Gräben in Berggegenden in schattigen Wäldern.*

Impatiens Noli tangere (s. Berggegenden).

b) *An Gräben auf Moorboden.*

Juncus (s. oben) *acutiflorus* (*Juncus articulatus* *c. Linn.*), spitzblüthige Simse.

c) *An Gräben in Waldungen.*

Eupatorium cannabinum (s. an Bächen).

d) *An feuchten Gräben.*

Inula britannica (s. an Bächen).

B. *In Gräben.*

Veronica scutellata, *Lycopus europaeus* (s. an feuchten Stellen).

Potamogeton fluitans (s. in Bächen).

Potamogeton pectinatus (s. in Flüssen).

Cicuta, V. Wütherich.

C. virosa L., giftiger W., Wasserschierling.

Sium, V. Merk.

S. angustifolium L., schmalblättriger Merk.

S. latifolium L., breitblättriger Merk.

Juncus lamprocarpos (s. oben unter A).

Rumex, VI. Ampfer.

R. acutus L., spitzblättriger Ampfer.

R. Hydrolapathum Huds., Fluss-Ampfer.

R. maritimus L., schmalblättriger Ampfer.

R. maximus Schreb., grosser Ampfer.

R. Nemolapathum Ehrh., knäuelblüthiger Ampfer.

R. obtusifolius L., stumpfblättriger Ampfer.

R. palustris Sm., Sumpf-Ampfer.

Epilobium (s. oben) *intermedium*, mittleres Weidenröslein.

E. palustre L. Sumpf-Weidenröslein.

E. parviflorum Schreb., kleinblumiges Weidenr.

E. rivulare Wahlb., Bach-Weidenröslein.

Polygonum laxiflorum (s. an feuchten Orten.)

Scrofularia, XIV. Braunwurz.

Scr. aquatica L., Wasser-Braunwurz.

Helichrysum, XIX. Immortelle.

H. luteo-album Richb. (*Gnaphalium luteo-album* L.), gelblichweisses Ruhrkraut.

Schelhammeria, XXI. Schelhammerie.

Sch. cyperoides Mnch. (*Carex cyperoides* L.), cyperförmiges Riedgras.

In Gräben.

Sparganium, XXI. Igelskolbe.

Sp. erectum *L.*, aufrechte, ästige Igelskolbe.

Sp. simplex *Sm.* (Sp. erectum *b. Linn.*), einfache Igelskolbe.

a) *In Gräben auf etwas feuchten Aeckern.*

Rumex crispus (s. auf etwas feuchten Aeckern).

b) *In Gräben auf Moorboden.*

Juncus acutiflorus (s. oben unter A. b).

c) *In tiefen Gräben.*

Scolochloa, III. Schwingelschilf.

Sc. festucacea *Lk.* (*Arundo festucacea W.*), schwingelartiges Rohr.

Mentha (s. oben) palustris *Mnch.*, Sumpf-Münze.

Verbena, V. Eisenkraut.

V. officinalis L., gemeines Eisenkraut.

(*Glyceria distans*, *Myosotis palustris*, *Samolus Valerandi*, *Stellaria neglecta*, *Spiraea denudata*, *Spiraea Ulnaria*, *Nasturtium palustre*, *N. silvestre*, *Callitriche verna*, *Lemna trisulca*, *Potamogeton crispus*, *P. perfoliatus*, *Larbraea uliginosa*, *Cerastium triviale*, *Potentilla Anserina*, *Ranunculus repens* s. May S. 234 ff. — Ausser diesen noch die in Jun S. 441 ff. aufgezeichneten Pflanzen.)

43) Auf Grasplätzen.

Bromus, III. Trespe.

Br. erectus *Huds.*, aufrechte Trespe.

Pastinaca sativa (s. an Ackerrändern).

Cnidium, V. Brenndolde.

Cn. Monnieri *Cuss.* (*Selinum Monnieri L.*), französische Silge.

Linum, V. Lein, Flachs.

L. flavum L., gelbblühender Flachs.

Scilla, VI. Meerzwiebel.

Sc. autumnalis L., Herbst-Meerzwiebel.

*Auf Grasplätzen.***Polygonum VIII.** Knöterig.*P. Bellardi All.*, aufrechter Knöterig.**Potentilla reptans** (s. an Gräben).**Trifolium, XVII.** Klee.*Tr. patens Schreb.*, ausgebreiteter Klee.*Auf sonnigen Grasplätzen.***Achillea, XIX.** Garbe.*A. ochroleuca Ehrh.*, weissgelbe Schafgarbe.*Auf trocknen Grasplätzen.***Medicago falcata L.** (s. in Gebüsch).*M. media* (s. an Ackerrändern).*An grasigen, steinigen Orten der Kalkalpen.***Erigeron, XIX.** Berufungskraut.*E. alpinus L.*, Alpen-Berufungskraut.

(*Polygonum aviculare*, *Veronica serpyllifolia*, *Geranium pusillum*, *Festuca pratensis*, *Plantago lanceolata*, *Alchimilla vulgaris*, *Campanula Rapunculus*, *Ajuga reptans*, *Erodium cicutarium*, *Trifolium pratense*, *Taraxacum officinale*, *Poterium glaucescens*, *Habenaria albida*, *Pollinia distachys*, *Lotus corniculatus*, *Trifolium scabrum* s. May S. 238—242. Ausser diesen noch die im Jun S. 444—446 angemerkten Pflanzen.)

44) Auf Gries der Alpen und Gebirgsflüsse.**Saxifraga, X.** Steinbrech.*S. patens Gaud.*, abstehendblättriger Steinbr.**Gypsophila, X.** Gypskraut.*G. repens L.*, kriechendes Gypskraut.**Linaria, XIV.** Maulblume.*L. alpina De C.* (*Antirrhinum alpinum L.*),
Alpen-Löwenmaul.**Arabis, XV.** Gänsekraut.*A. bellidifolia Jacq.*, tausendschönblättriges G.

*Auf Gries der Alpen und Gebirgsflüsse.***Hieracium, XIX.** Habichtskraut.H. glaucum *All.*, blaugrünes Habichtskraut.H. staticifolium *All.*, grasnelkenblättriges H.**Erigeron, XIX.** BerufungskrautE. uniflorus *L.*, einblumiges Berufskraut.

(Saxifraga oppositifolia, Dryas octopetala, Acinos alpinus, Noccaea alpina, Arabis alpina s. May S. 243 ff. — Chondrilla prenanthoides, Noccaea brevicaulis s. Jun S. 447.)

45) *An sonnigen Gypsfelsen.***Telephium, V.** Telephie.T. Imperati *L.*, wechselblättriges Telephium.46) *An Häusern.***Blitum Bonus Henricus** (s. auf bebautem Boden).**Chenopodium, V.** Gänsefuss.Ch. urbicum *L.*, Strassen-G., Gassen-Melde.**Amaranthus, XXI.** Amaranth.A. adscendens *Lois.*, aufsteigender Amaranth.47) *An Hecken.*(Oxalis stricta s. May S. 245. — Ligustrum vulgare, Veronica latifolia, Lycium barbarum, L. europaeum, Asparagus officinalis, Rosa canina, R. rotundifolia, R. semper-virens, Rubus caesius *δ.* S. Jun S. 447. f.)*An Hecken in Alpenthälern (s. Alpenthäler.)*48) *Auf Heiden.***Triodia decumbens** (s. auf Bergwiesen).**Asterocephalus suaveolens** (s. auf dünnen Anhöhen.)**Thymus Chamaedrys** (s. auf Bergen.)**Euphrasia, XIV.** Augentrost.E. officinalis *L.*, gemeiner Augentrost.*In Heidewäldern.*Euphrasia micrantha *Rchb.*, kleinblättriger A.

In Heidewäldern an lichten Plätzen und Hügeln.

Laserpitium, V. Laser.

L. pruthenicum L., weisshaariges Laserkraut.

49) Auf Holzerde.

Arenaria trinervia s. May S. 248.)

50) Auf Hügeln.

(Vergl. Kalkhügel, Sandhügel.)

Salvia, II. Salbey.

S. nemorosa L., Hain-Salbey.

Bromus erectus (s. auf Grasplätzen).

Dipsacus, IV. Karden.

D. fullonum Mill. (Dipsacus fullonum β. Linn.),
Weber-Karden.

Asterocephalus ochroleucus (s. an Feldrainen).

Verbascum, V. Wollkraut.

V. speciosum Schrad., prächtige Königskerze.

Pastinaca sativa (s. an Ackerrändern).

Siler, V. Rosskümmel.

S. aquilegifolium Gaertn. (Laserpitium trilobum Linn.), dreilappiges Laserkraut.

Linum, V. Lein, Flachs.

L. austriacum L., österreichischer L. od. Fl.

Epilobium collinum (s. an Felsen).

Gypsophila, X. Gypskraut.

G. effusa Tsch., ausgebreitetes Gypskraut.

G. fastigiata L., langstieliges, doldentragendes G.

Dianthus, X. Nelke.

D. Carthusianorum L., Karthäuser-N., Stein-N.

D. glaucus L., blaugrüne Nelke.

Arenaria, V. Sandkraut.

A. serpyllifolia L., quendelblättriges Sandkr.

Thymus Chamaedrys (s. auf Bergen).

Malva Alcaea (s. in Gebüsch).

Ononis Natrix (s. an Flüssen).

An Hügeln.

Ononis spinosa (s. an sandigen Feldrainen).

Hypericum perforatum (s. auf Feldrainen.)

Cirsium, XIX. Kratzdistel.

C. acaule All. (*Cnidus acaulis Willd.*), stengellose Kratzdistel.

Gnaphalium, XIX. Ruhrkraut.

Gn. arvense Fr. (*Filago arvensis L.*), Acker-R.

Gn. montanum Fr. (*Filago montana L.*), Berg-R.

Inula, XIX. Alant.

I. squarrosa L., sparriger Alant.

Centaurea, XIX. Flockenblume.

C. badensis Tratt., badensche Flockenblume.

C. muricata L., zackige Flockenblume.

C. Scabiosa L., scabiosenartige Flockenblume.

C. Stoebe L., schmalblättrige Flockenblume.

Echinops, XIX. Kugeldistel.

E. Ritro L., glattblättrige Kugeldistel.

a) *An Hügeln in Bergwaldungen.*

Oxytropis, XVII. Spitzfahne.

O. montana De C. (*Astragalus montanus L.*), Berg-Wirbelkraut.

b) *Auf Hügeln an feuchten Orten (s. an feuchten Orten unter d).*

c) *An Hügeln in Gebüsch (s. in Gebüsch unter a).*

d) *An Hügeln in Heidewäldern.*

Laserpitium pruthenicum (s. S. 628).

e) *An bewachsenen, sonnigen Hügeln.*

Thalictrum, XIII. Wiesenraute.

Th. simplex L., einfache Wiesenraute.

f) *An dünnen Hügeln.*

Centaurea (s. oben) *paniculata L.*, rispenartige Flockenblume.

An dürrer, sonnigen Hügeln.

Ptychotis, V. Haardolde.

Pt. Bunias Rchb. (*Carum Bunias L. Seseli saxifragum L.*), steinbrechender Bergfenchel.

g) An grasigen Hügeln.

Codonoprasum, VI. Glockenlauch.

C. flavum (*Allium flavum L.*), gelber Gl.

Odontites, XIV. Odontite.

O. lutea Rchb. (*Euphrasia lutea L.*), gelber Augentrost.

Crepis virens (s. an Feldrainen).

h) Auf sandigen Hügeln.

Gypsophila (s. oben) *effusa Tsch.*, ausgebreitetes Gypskraut.

Silene, X. Leimkraut.

S. chlorantha Ehrh. (*Cucubalus catholicus β . L.*), grünblühendes Leimkraut.

i) An sonnigen Hügeln (vergl. e. und f.)

Andropogon Ischaemum (s. an Feldrainen).

Seseli, V. Sesel.

S. Hippomarathrum L., gemeiner Rossfenchel.

Codonoprasum (siehe g.) *paniculatum* (*Allium paniculatum L.*), rispenförmiger Lauch.

Thalictrum (siehe e.) *minus L.*, kleine Wiesenraute.

Lavandula, XIV. Lavendel.

L. Spica L., gemeiner Lavendel.

Chrysocoma Linosyris (s. an Felsen).

Dianthus vaginatus (s. an sonnigen Felsen).

An sonnigen Hügeln auf Sand- und Kalkboden.)

Veronica, II. Ehrenpreis.

V. squamosa Prsl., schuppiger Ehrenpreis.

An sonnigen, trocknen Hügeln.

Gentiana, V. Enzian.

G. cruciata L., Kreuz-Enzian.

Inula (s. oben) ensifolia L., nerviger Alant.

I. Oculus Christi L., weissblättriger Alant.

Laserpitium, V. Laser.

L. hispidum M. B., hackeriges Laserkraut.

k) Auf steinigen Hügeln.

Gypsophila effusa (s. oben unter h).

Malva moschata (s. an Ackerrändern).

l) Auf trocknen Hügeln (vergl. oben unter i).

Linum flavum (s. auf Grasplätzen.)

Seseli (s. o. unt. i) varium Trev., bunter Bergfenchel.

Betonica, XIV. Betonie.

B. stricta Ait., rauhe Betonie.

Medicago, XVII. Schneckenklee.

M. procumbens Bess., niederliegender Schn.

Calamagrostis Epigeios (s. an Flüssen).

(*Veronica arvensis, V. prostrata V. serpyllifolia, Plantago graminea, Pl. sericea, Campanula R. punctatus, Cynanchum Vincetoxicum, Bunium Bulbocastanum, Lychnis Viscaria, Sorbus torminalis, Orobanche Rapum, Erysimum diffusum, Erodium cicutarium, Lotus corniculatus, Astragalus Cicer, Trifolium montanum, Medicago lupulina, Poterium glaucescens. — Cytisus hirsutus. — Agropyrum intermedium, Berteroa incana. — Gypsophila rigida. — Ajuga montana. — Bellis perennis. — Dianthus diutinus. — Convolvulus Cantabrica, Dianthus Armeria Medicago Gerardii, Hieracium echinoides. — Barkhausia rhoeadifolia. — Poterium Sanguisorba s. May S. 248 ff.)*

(Ausser diesen blühen noch fast alle im Jun S. 450 ff. angegebenen Pflanzen, nämlich: *Veronica officinalis* bis *Genista tinctoria*, *Vicia hybrida* bis *Ervum gracile*, *Agrostemma Coronaria*, *Dianthus prolifer* bis *Anthemis austriaca*, *Anthericum Liliago*, *Anthyllis alpestris* bis *Linum narbonense*.)

51) *Auf Kalkalpen.*

Linum, V. Lein, Flachs.

L. alpinum *L.*, Alpen-Lein oder Flachs.

Rhododendron, X. Alpbalsam.

Rh. ferrugineum *L.*, rostfarbiger Alpenbalsam.

Rh. hirsutum *L.*, gefranzter Alpenbalsam.

Sabulina, X. Sändling.

S. laricifolia (*Arenaria laricifolia* *L.*), lerchen-
baumblättriges Sandkraut.

Papaver, XIII. Mohn.

P. Burseri *Crtz.*, Burser's Mohn.

Draba, XV. Hungerblümchen.

Dr. stellata *Jacq.*, sternhaariges Hungerblümchen.

Aronicum, XIX. Krebswurz.

A. scorpioides *Rchb.* (*Arnica scorpioides* *L.*),
scorpionartige Wolverley.

a) *Auf Kalkalpen an Felsen.*

Veronica, II. Ehrenpreis.

V. saxatilis *L.*, Felsen-Ehrenpreis.

Campanula, V. Glockenblume.

C. Zoysii *Wulff.*, nickende Glockenblume.

Athamanta, V. Augenwurz.

A. cretensis *L.*, Gebirgs Hirschwurz.

Saxifraga, X. Steinbrech.

S. squarrosa *Sieb.*, sparriger St. (In Felsritzen.)

Dianthus, X. Nelke.

D. monspessulanus *L.*, Vorgebirgs-Nelke.

Silene, X. Leimkraut.

S. alpestris *L.* (*Lychnis alpestris* *L.*), Alpen-L.

b) *In Kalkalpen auf Gerölle.*

Gypsophila, X. Gypskraut.

G. repens *L.*, kriechendes Gypskraut.

c) *Auf Kalkalpen an grasigen, steinigen Orten.*

Erigeron, XIX. Berufungskraut.

E. alpinum L., Alpen-Berufkraut.

d) *Auf Kalkalpenwiesen.*

Hieracium, XIX. Habichtskraut.

H. staticifolium All., grasnelkenblättriges *H.*

Crepis, XIX. Pippau.

C. blattarioides Rchb. (*Hieracium blattarioides L.*, *Picris pyrenaica L.*), schabenkrautartiger *P.*

Senecio, XIX. Kreuzkraut.

S. Doronicum L., Gebirgs-Kreuzkraut.

e) *Auf hohen Kalkalpen.*

Saxifraga (s. oben) oppositifolia, heideförmiger Steinbrech.

Papaver (s. oben) pyrenaicum W., pyrenäischer Mohn.

Auf hohen Kalkalpenwiesen.

Pedicularis, XIV. Läusekraut.

P. rosea Jacq., rosenfarbiges Läusekraut.

f) *Auf höhern Kalkalpen.*

Silene (s. oben) quadrifida L., vierspaltiges Leimkrt.

Auf höhern Kalkalpenwiesen.

Geracium, XIX. Sperberkraut.

G. chondrilloides (*Hieracium chondrilloides Jacq.*) knorpelsalatartiges Habichtskraut.

g) *Auf den höchsten Kalkalpen.*

Saxifraga (s. oben) Hohenwartii Vest., Hohenwart's Steinbrech.

Potentilla, XII. Fingerkraut.

P. Clusiana Murr., gegranntes Fingerkraut.

(*Noccaea alpina*. — *Silene rupestris* s. May S. 259 f. und alle im Jun S. 457 ff. aufgezeichneten Pflanzen.)

52) *An und auf Kalkbergen.*

Gypsophila fastigiata (s. auf Hügeln.)

Leontodon, XIX. Löwenzahn.

L. asper *Rchb.*, rauher Löwenzahn.

Cirsium, XIX. Kratzdistel.

C. eriophorum *Scop.* (*Carduus eriophorus* *L.*),
wollköpfige Distel.

a) *An Kalkbergen auf grasigen Abhängen.*

Gentiana, V. Enzian.

G. ciliata *L.*, gefranzter Enzian.

b) *In Kalkbergen an felsigen Plätzen.*

Galeopsis, XIV. Hohlzahn.

G. angustifolia *Ehrh.*, schmalblättrige Hanfnessel.

c) *An sonnigen Kalkbergen.*

Serratula, XIX. Scharte.

S. radiata *M. B.*, strahlenblüthige Scharte.

In niedern Kalkberggegenden.

Clematis Vitalba (s. in Gebüsch.)

(*Tragopogon major* s. May S. 260 und alle im Jun S. 459 f. angegebenen Pflanzen.)

53) *Auf Kalkboden.*

Asterocephalus suaveolens (s. auf dürrer Anhöhen).

Seseli Hippomarathrum (s. an sonnigen Hügeln).

Bupleurum falcatum (s. in Berggegenden).

Nigella arvensis (s. unter Getreide).

Teucrium Chamaedrys (s. an sonnigen Anhöhen).

Alectorolophus, XIV. Hahnenkamm.

A. hirsutus *All.* (*Rhinanthus Christa galli* *γ.*
Linn.), raubhaariger Hahnenkamm.

Carlina acaulis (s. an Ackerrändern.)

Auf Kalkboden an sonnigen Felsen und Hügeln.

Dianthus vaginatus (s. an sonnigen Felsen).

Auf Kalkboden an sonnigen Waldhügeln.

Veronica, II. Ehrenpreis.

V. orchidea Crntz., knabenkrautblüthiger E.

(Reseda lutea, Isatis tinctoria, Neslia paniculata, Hieracium glaucescens, Dianthus Armeria s. May S. 262 und alle im Jun S. 460 ff. angemerkten Pflanzen.)

54) An Kalkfelsen.

Laserpitium asperum (s. in Gebirgswaldungen.)

L. latifolium (s. zwischen Gebüsch.)

Bupleurum, V. Hasenohr.

B. longifolium L., langblättriger Hasenohr.

Libanotis, V. Heilwurz.

L. montana All. (Athamantha Libanotis L.), weisse Weihrauchwurz.

Prunella, XIV. Prunelle.

Pr. grandiflora L., grossblumiger Brunnheil.

Jurinea, XIX. Jurinea.

J. mollis Rchb. (Carduus mollis L.), weiche Distel.

An Kalkfelsen in Gebirgswäldern.

Aquilegia pyrenaica (s. in Gebirgswäldern).

An sonnigen Kalkfelsen.

Codonoprasum flavum (s. an grasigen Hügeln.)

Linaria, XIV. Maulblume.

L. genistaefolia Mill. (Antirrhinum genistaefolium Jacq.), ginsterblättriges Löwenmaul.

(Arenaria grandiflora, Dictamnus Fraxinella, Ruta divaricata, Hypericum elegans s. May S. 263 ff. und die im Jun S. 462 ff. aufgeführten Pflanzen.)

55) *Auf Kalkgebirgen.*

Dianthus, X. Nelke.

D. caryophylloides (s. an sonnigen Felsen der Kalkgebirge.)

D. virgineus L., Jungfern-Nelke. Var. β . *elongatus* (*Dianthus Caryophyllus inodorus* L.).

Auf hohen Kalkgebirgen.

Draba, XIV. Hungerblümchen.

Dr. Sauteri Hoppe, Sauter's Hungerblümchen.

(*Ranunculus Thora*, *Arabis alpina*, *Trifolium rubens* s. May S. 265 f. und alle im Jun S. 464 f. bemerkten Pflanzen.)

56) *In Kalkgegenden.*

An Kalkhügeln.

Poa cenisia b. badensis (s. an Felsen).

Sempervivum, XI. Hauswurz.

S. hirtum L., rauhblüthige Hauswurz.

An sonnigen Kalkhügeln.

Laserpitium, V. Laser.

L. Siler L., Berg-Rosskümmel.

Seseli, V. Sesel.

S. elatum L., hoher Bergfenchel.

S. Hippomarathrum L., gemeiner Rossfenchel.

(*Barkhausia pinguis*, *Cytisus austriacus*, *Pinus austriaca*, *Trinia pumila* s. May S. 266. — *Sonchus arvensis*, *Dorycnium pentaphyllum*, *Genista procumbens*, *Anthyllis montana*, *Coronilla vaginalis* (s. Jun S. 465 f.)

57) *Auf Kalkvoralpen.*

Valeriana, II. Baldrian.

V. saxatilis L., Stein-Baldrian.

Dianthus, X. Nelke.

D. alpinus L., Alpen-Nelke.

Centaurea, XIX. Flockenblume.

C. montana L., Berg-Flockenblume.

Auf Kalkvorälpen.

(*Buphthalmum salicifolium*, *Potentilla caulescens*, *Veronica urticaefolia* s. May S. 268 f. — *Potentilla minima*, *Adenostyles alpina* s. Jun S. 467.)

58) *In Kieferwäldungen.*

Monotropa Hypopithys s. Jun S. 467.)

59) *In Lachen.*

Potamogeton, IV. Laichkraut.

P. trichoides *Cham.*, haarförmiges Laichkraut oder Saamkraut.

(*Callitriche verna* s. May S. 269.)

60) *In Laubwäldern.*

Campanula, V. Glockenblume.

C. Trachelium *L.*, Halskraut-Glockenblume.

Lamium, XIV. Bienensaug.

L. hirsutum *Lam.*, rauhhaariger Bienensaug.

Melampyrum, XIV. Wachtelweizen.

M. cristatum *L.*, kammartiger W. od. Kuhweizen.

a) *In feuchten Laubwäldern.*

Epipactis latifolia (s. in Gebirgswäldern an feuchten Orten).

In feuchten, schattigen Laubwäldern.

Circaea, II. Hexenkraut.

C. lutetiana *L.*, gemeines Hexenkraut.

b) *In schattigen Laubwäldern.*

Bromus, III. Trespe.

Br. asper *L.*, rauhe Trespe.

Myosotis, V. Vergissmeinnicht.

M. repens *Don.*, kriechendes V. (In Schlamm.)

Epipactis, XX. Sumpfwurz.

E. viridiflora (*Serapias viridiflora Hoffm.*), grünblühende Sumpfwurz.

In Laubwäldern.

(*Trientalis europaea*, *Stellaria nemorum*, *Anemone trifolia*, *Potentilla alba*, s. May S. 271 f. — *Arenaria trinervia* s. Jun S. 467. — *Dactylis glomerata* bis *Mylcelis muralis* Jun S. 467 ff. — *Urtica dioica* s. Jun 469.)

61) *Auf Lehm Boden.***Scirpus, III. Binse.**

Sc. radicans Schkr., wurzelnde Binse.

Limnochloa, III. Pfuhlbinsse.

L. acicularis (Scirpus acicularis L.), nadelförmige Binse.

In festem, lehmigen Boden auf feuchten Triften.

Trifolium, XVII. Klee.

Tr. fragiferum L., Erdbeer-Klee.

(*Spergula vulgaris*, *Sonchus arvensis* s. May S. 469.)

62) *Auf Leinäckern.***Cuscuta, IV. Flachsseide.**

C. Epilinum Weihe, gemeine Flachsseide.

(Ausserdem blühen noch alle im Jun S. 469 angegebenen Pflanzen.)

63) *Am südlichen Litorale.***Crypsis, III. Dorngras.**

Cr. schoenoides Lam. (Phleum schoenoides L.), knopfgrasartiges D. oder Lieschgras.

Andropogon, III. (XXIII) Bartgras.

A. hirtus L., rauhes Bartgras.

Pollinia, III. Pollinie.

P. distachys Spr. (Andropogon distachyos L.), zweiähriges Bartgras.

Agrostis, III. Straussgras.

A. maritima Lam., Meerstrands-Straussgras.

Am südlichen Litorale.

Eragrostis, III. Liebesgras.

E. verticillata *P. B.* (*Poa verticillata* *Cav.*),
quirlförmiges L. oder Rispengras.

Agropyrum, III. Queckengras.

A. littorale *Rchb.* (*Triticum littorale* *Host.*),
Meerstrands-Weizen.

Asterocephalus, III. Kronen-Scabiose.

A. Scopolii (*Scabiosa Scopolii* *Jacq. fil.*), Sco-
polische Scabiose.

Salsola, V. Salzkraut.

S. Soda *L.*, langblättriges Salzkraut.

S. Tragus *L.*, glattes Salzkraut.

Heracleum, V. Bärenklau.

H. pyrenaicum *Lam.*, pyrenaische Bärenklau.

Oenanthe, V. Rebdolde.

O. karstia *Hacq.*, karst'sche Rebendolde.

Bupleurum, V. Hasenohr.

B. semicompositum *L.*, halbzusammengesetztes H.

Linum, V. Lein, Flachs.

L. nodiflorum *L.*, knotenblüthiger Lein.

Hemerocallis, VI. Taglilie.

H. fulva *L.*, braunrothe Taglilie.

Dianthus, X. Nelke.

D. Waldsteinii *Strnb.*, Waldsteins-Nelke.

Punica, XII. Granatbaum.

P. Granatum *L.*, gemeiner Granatbaum.

Rosa, XII. Rose.

R. glandulosa *Bellard.*, drüsige Rose.

Nepeta, XIV. Katzenmünze.

N. violacea *Ait.*, violette Katzenmünze.

Calamintha, XIV. Calaminthe.

C. Nepeta *Lk.* (*Melissa Nepeta* *L.*), Katzen-
münzen-Melisse, Var. β . *praealta*.

Am südlichen Litorale.

Matthiola, XV. Levkoy.

M. annua Sw. (*Cheiranthus annuus* L.), Sommer-L.

Corydalis, XVII. Helmbusch, Lerchensporn.

C. ochroleuca Koch. (*Fumaria*) weissgelber L.

Lupinus, XVII. Wolfsbohne, Feigbohne.

L. varius L., bunte Wolfsbohne oder Feigb.

Barkhausia, XIX. Barkhausie.

B. stricta Rchb. (*Crepis stricta* Scop.), schnurgerader Pippau.

Leontodon, XIX. Löwenzahn.

L. Brumati Rchb.

Picridium, XIX. Bitterlattich.

P. vulgare Desf. (*Scorzonera picrioides* L.), gemeiner Bitterlattich.

Thrincia, XIX. Thrincie.

Th. tuberosa De C. (*Leontodon tuberosum* L.), knolliger Löwenzahn.

Onopordon, XIX. Krebsdistel.

O. illyricum L., illyrische Krebsdistel.

Carlina, XIX. Eberwurz.

C. lanata L., wollige Eberwurz.

Inula, XIX. Alant.

I. crithmoides L., dickblättriger Alant.

I. viscosa Desf. (*Erigeron viscosum* L.), klebriger Alant, klebriges Berufkraut.

Achillea, XIX. Garbe.

A. Ageratum L., gewürzhafte Schaafgarbe.

Buphthalmum, XIX. Rindsauge.

B. spinosum L., stachelhülliges Rindsauge.

Centaurea, XIX. Flockenblume.

C. karschtiana Scop., karschtische Flockenbl.

Ecbalium, XXI. Spritzgurke.

E. agreste Rchb. (*Momordica Elaterium* L.), Esels-Balsamapfel.

*Am südlichen Littorale.***Mercurialis, XXII. Bingelkraut.***M. ambigua L. fl.*

(*Asterocephalus ucranicus*, *Anchusa angustifolia*, *A. undulata*, *Rhamnus pumilus*, *Linum gallicum*, *Statice angustifolia*, *Ranunculus muricatus*, *R. verrucosus*, *Burgsdorfia romana*, *Linaria litoralis*, *Berteroa viridis*, *Erysimum odoratum*, *Matthiola incana*, *Medicago marina* s. May S. 276 ff. — Ausser diesen noch die meisten der im Jun S. 470 ff. angemerkten Pflanzen, nämlich: *Schoenus mucronatus*, *Polypogon monspeliensis*, *Dactylis maritima* bis *Linum narbonense*, *Polygonum maritimum* bis *Trifolium tomentosum*, *Bellis silvestris*, *Inula Bubonium*, *Centaurea sordida*, *Aristolochia Clematitis*, *Andrachne telephioides*.)

64) Auf lockerem Boden.

(Arenaria trinervia s. May S. 280.)

65) An und auf Mauern.**Digitaria, III. Fingergras.**

D. sanguinalis Scop. (*Panicum sanguinale L.*),
gemeines F., Bluthirse.

Poa compressa (s. auf Felsen).*Festuca rubra* (s. auf Anhöhen).**Parietaria, IV. Wandkraut, Glaskraut.***P. officinalis L.*, gemeines W. oder Gl.**Echinospermum, V. Igelnüsschen.**

E. Lappula Sw. (*Myosotis Lappula L.*), kletten-
saamiges Vergissmeinnicht.

E. squarrosum Rchb. (*Myosotis squarrosa Rtz.*),
sparriges Vergissmeinnicht.

Campanula, V. Glockenblume.*C. pyramidalis L.*, pyramidenförmige Gl.**Chenopodium murale** (s. an Dünger).*Ch. olidum* (s. ebendasselbst).*Ch. urbicum* (s. an Häusern).

An und auf Mauern.

Atriplex, V. (XXIII). Melde.

A. alba Scop., weisse Melde.

A. angustifolia Sm., schmalblättrige Melde.

A. tatarica L., tatarische Melde.

Crithmum maritimum (s. an felsigen Orten).

Epilobium collinum (s. in Berggegenden an Mauern.)

Gypsophila muralis (s. auf trocknen, besonders sandigen Aeckern).

Arenaria serpyllifolia (s. auf Hügeln.)

Sedum anopetalum (s. an Felsen).

S. maximum (s. ebendasselbst).

S. rupestre (s. an dürren Anhöhen).

Phytolacca decandra (s. auf bebautem Boden).

Sempervivum tectorum (s. auf Dächern).

Teucrium Chamaedrys (s. an sonnigen Anhöhen).

Leonurus, XIV. Löwenschweif.

L. Cardiaca L., gemeiner Löwenschweif.

Galeopsis, XIV. Hohlzahn.

G. pubescens Bess., weichhaarige Hanfnessel.

Ballota, XIV. Ballote.

B. nigra L., schwarzwerdende Ballote.

B. urticifolia Ortm., nesselblättrige Ballote.

Marrubium, XIV. Andorn.

M. apulum Ten.

M. vulgare L., gemeiner Andorn.

Nepeta Cataria (s. an Feldrainen.)

Verbena officinalis (s. in Gräben.)

Linaria vulgaris (s. auf Feldrainen).

Phoenixopus, XIX. Ruthensalat.

Ph. vimineus Rchb. (*Prenanthes viminea L.*),
ruthenförmiger Hasenlattig.

Lactuca, XIX. Salat.

L. Scariola L., wilder Salat.

An und auf Mauern.

Scolymus, XIX. Golddistel.

Sc. maculatus L., gefleckte G. (Verwildert.)

Lappa tomentosa (s. an Feldrainen).

Artemisia, XIX. Beifuss.

A. Absynthium L., gemeiner Wermuth.

A. vulgaris L., gemeiner Beifuss.

Centaurea paniculata (s. an Feldrändern).

Xanthium, XXI. Spitzklette.

X. Strumarium L., gemeine Spitzklette.

Ficus Carica (s. an Felsen).

(*Veronica arvensis*, *Cynoglossum officinale*, *Campanula rotundifolia*, *Gypsophila rigida*, *Chelidonium majus*, *Linaria Cymbalaria*, *Camelina microcarpa*, *Berteroa incana*, *Lepidium campestre*, *L. ruderales*, *Erysimum diffusum*, *Sisymbrium Columnae*, *S. Irio*, *S. officinale*, *Diploaxis muralis*, *Erodium malacoides*, *Geranium lucidum*, *G. molle*, *G. pusillum*, *Corydalis lutea*, *Erigeron acris* s. May S. 280 ff. — Ausser diesen noch die meisten der im Jun S. 472 ff. aufgezeichneten Pflanzen, nämlich: *Jasminum officinale*, *Centranthus ruber*, *Poa nemoralis*, *Bromus sterilis* bis *Sedum album*, *Sedum annuum*, *S. hispanicum* bis *Andrachne telephoides*.)

66) *Am und im Meere.**A. Am Meere.*

Scirpus, III. Binse.

S. maritimus L., See-Binse.

Ammophila, III. Sandrohr.

A. arenaria Lk. (*Arundo arenaria L.*), Sandrohr.

Glyceria, III. Schwaden, Mannagras.

G. maritima Wahlb. (*Poa maritima Huds.*),
Meerstrands-Schwingel.

Agropyrum, III. Queckengras.

A. junceum R. S. (*Triticum junceum L.*), Bin-
sen-Weizen.

Plantago, IV. Wegerich.

Pl. Coronopus L., krähenfussartiger Wegerich.

Am Meere.

Convolvulus, V. Winde.

C. Soldanella L., Meerstrands-Winde.

Jasione, V. Jasione.

J. montana L., Var. *maritima* Meerstrands-J.

Atriplex, V. (XXIII.) Melde.

A. laciniata L., gerissene Melde.

A. litoralis L., Ufer-Melde.

A. triangularis W. (Auf Salzboden).

Halimus, V. Keilmelde.

H. portulacoides Wallr. (*Atriplex portulacoides L.*), Portulak-Melde.

Eryngium, V. Mannstreu.

E. maritimum L., Meerstands-Mannstreu.

Crithmum, V. Bacille.

Cr. maritimum L., schmalblättriger Meerfenchel.

Alsine, V. Miere.

A. marginata Rchb. (*Arenaria media L.*), mittleres Sandkraut.

Statice, V. Statice.

St. Limonium L., Meerstrands-Grasnelke.

St. Pseudo-Limonium Rchb.

Armeria, V. Grasnelke.

A. maritima W. (*Statice pubescens Drev. Hayne*), feinhaarige Grasnelke.

Juncus, VI. Simse.

J. Gerardi Lois., Gerards-Simse.

Rumex maritimus (s. an Gräben.)

Portulaca, XI. Portulak.

P. oleracea L., gemeiner Portulak.

Senebiera Coronopus Poir. (s. auf bebaut. Bod.)

Cakile, XV. Meersenf.

C. maritima L., gemeiner Meersenf.

Aster, XIX. Sternblume.

A. Tripolium L., Meerstrands-Sternblume.

Am Meere.

Centaurea, XIX. Flockenblume.

C. Calcitrapa L., Sterndistel.

a) *Am nördlichen Meere.*

Chara, I. Armlencher.

Ch. canescens Lois.

Polypogon, III. Bürstengras.

P. littoralis Sm. (Agrostis littoralis Sm.), Ufer-B.

Ammophila (s. oben) baltica Lk., Belt-Sandrohr.

Briza, III. Zittergras.

Br. media L. β . repens Roth.

Lobelia, V. Lobelie.

L. Dortmanna L., Wasser-Langhals.

Atriplex (s. oben) marina L., Meer-Melde.

A. hastata L., spiessförmige Melde. (Auf Wiesen.)

Juncus (s. oben) balticus W., Belt-Simse.

Polygonum, VIII. Knöterig.

P. amphibium L. β . maritimum, Meerstrands-Kn.

Linaria, XIV. Maulblume.

L. maritima Loesel. (Antirrhinum junceum Poll.),

Meerstrands-Löwenmaul.

Malva, XVI. Malve, Käspappel.

M. littoralis Dethard, Ufer-Malve.

Sonchus, XIX. Distelsalat.

S. maritimus L., Meerstrands-Gänsedistel.

Senecio, XIX. Kreuzkraut.

S. denticulatus Müll., gezähneltes Kreuzkraut.

Zannichellia, XXI. Zannichellie.

Z. major Bnnggh., grosse Strahlenscheide.

Z. polycarpa Nolte, vielsaamige Strahlenscheide.

b) *Am südlichen Meere.*

Cyperus, III. Cypergras.

C. esculentus L., essbares C., Erdmandel.

*Am südlichen Meere.***Holoschoenus, III.** Kugelriet.*H. australis Rchb.* (*Scirpus australis L.*), südliche Binse.**Clematis, XII.** Waldrebe.*Cl. angustifolia Jacq.*, schmalblättrige Waldr.**Stachys, XIV.** Ziest.*St. maritima L.*, Meerstrands-Ziest.**Sonchus (s. oben) littoralis Rchb.**, Ufer-Gänsedistel.*B. Im Meere.***Chara (s. oben) baltica Fr.** (An seichten Stellen des baltischen Meeres.)**Potamogeton, IV.** Laichkraut.*P. marinus L.*, Meer-L., Meer-Saamkraut.**Ruppia, IV.** Ruppie.*R. maritima L.*, Meerstrands-Schirmsaame.*R. rostellata Koch.*, schnabelfrüchtiger Sch.

(*Festuca glauca*, *Sagina procumbens*, *Polygonum aviculare* α . *triviale*, *Linum maritimum* s. May S. 284 ff. — Ausser diesen noch die meisten der im Jun S. 475 ff. bemerkten Pflanzen, nämlich: *Veronica maritima* bis *Plantago maritima*, *Silene maritima* bis *Littorella lacustris*, *Blysmus rufus* bis *Euphorbia Paralias*.)

67) *Auf Moorboden.***Gentiana, V.** Enzian.*G. Pneumonanthe L.*, gemeiner, langer Enzian.**Helosciadium, V.** Sumpfdoldchen.*H. repens Koch.* (*Sium rep. L.*), kriechender Merk.**Drosera, V.** Sonnentau.*Dr. intermedia Drev. et Hayne*, ovalblättriger S.*Dr. rotundifolia L.*, rundblättriger Sonnentau.**Erica, VIII.** Heide.*E. Tetralix L.*, Sumpf-Heide.**Teucrium, XIV.** Gamander.*T. Scordium L.*, knoblauchduftiger Gamander.

Auf Moorboden.

Scutellaria, XIV. Helmkraut.

Sc. minor L., kleines Helmkraut.

Cirsium, XIX. Kratzdistel.

C. palustre Scop. (Carduus palustris L.), Sumpf-K.

a) *Auf Moorboden in den Alpen.*

Juncus, VI. Simse.

J. triglumis L., dreiblüthige Simse.

b) *Auf Moorboden in Gebirgen.*

Trifolium, XVII. Klee.

Tr. spadiceum L., brauner Klee.

c) *Auf sandigem Moorboden.*

Cicendia, V. Cicendie.

C. filiformis Rchb. (Gentiana filiformis L.),
fadenförmiger Enzian.

d) *In Moorbrüchen.*

Narthecium, VI. Beinheil.

N. ossifragum Huds. (Anthericum ossifragum L.),
Sumpf-Aehrenlilie.

e) *Auf Moorwiesen.*

Swertia, V. Swertie.

Sw. perennis L., ausdauernder Tarant.

Parnassia, V. Parnassie.

P. palustris L., Sumpf-P., weisse Leberblume.

Auf überschwemmten Moorwiesen.

Potamogeton oblongus (s. in Bächen).

(Pinguicula flavescens, Limnochloa cespitosa, Polygonum Bistorta, Comarum palustre. — Primula farinosa, Salix myrtilloides, Stellaria glauca s. May S. 286 ff.

Ausser diesen noch fast alle im Jun S. 477 ff. angegebenen Pflanzen, nämlich: Schoenus nigricans bis Hermium Monorchis, Utricularia minor, Nasturtium microphyllum, Polygala serpyllacea bis Orchis latifolia.)

68) Auf Moos in schattigen Waldungen.

(*Tormentilla reptans* s. Jun S. 480.)

69) In Morast.

Rhynchospora, III. Schnabelriet.

Rh. alba Vahl. (*Schoenus albus L.*), weisses Knopfgras.

Juncus, VI. Simse.

J. acutiflorus Ehrh. (*Juncus articulatus c. Linn.*), spitzblüthige Simse.

Malaxis, XX. Zart-Orche.

M. paludosa Sw. (*Ophrys paludosa L.*), Sumpf-Weichkrant.

Sparganium, XXI Igelskolbe.

Sp. natans L., schwimmende Igelskolbe.

(*Helosciadium inundatum* s. Jun S. 480.)

70) In Nadelwäldern.

(Vergl. Fichten- und Kieferwaldungen.)

Silene chlorantha (s. an sandigen Hügeln).

Goodyera, XX. Goodyere.

G. repens R. Br. (*Satyrium repens L.*), kriechende G., kriechende Geilwurz.

a) *An Rändern der Nadelwälder auf Sandboden.*

Sedum, X. Fetthenne.

S. recurvatum W.

b) *In feuchten und schattigen Nadelwäldungen der höhern Berggegenden.*

Corallorrhiza, XX. Corallenwurz.

C. innata R. Br. (*Ophrys Corallorrhiza L.*), gemeine Corallenwurzel.

(*Arctostaphylos Uva ursi* s. May S. 290. — *Hypericum pulchrum* s. Jun S. 481.)

71) *Auf nassem Boden.*

Schelhammeria, III. Schelhammerie.

Sch. cyperioides *Mnch.* (*Carex cyperioides L.*),
cypergrasartiges Riedgras.

Auf nassem, sandigen Boden.

Saccharum, III. Zuckergras.

S. Ravennae *Murr.* (*Andropogon Ravennae L.*),
Ravenna-Zuckerrohr.

(*Hordeum pratense* s. Jun S. 481.)

72) *In Obstgärten.*

Serratula, XIX. Scharte.

S. tinctoria *L.*, Färber-Scharte. Var. δ . dissecta
Wallr.

(*Leucoium aestivum* s. Jun S. 481.)

73) *An und in Pfützen.*

An Pfützen.

Anthemis, XIX. Chamille.

A. Cotula *L.*, stinkende Chamille.

(*Juncus compressus* s. Jun S. 482.)

In Pfützen.

Pulicaria, XIX. Badekraut.

P. vulgaris *Gaertn.* (*Inula Pulicaria L.*), Floh-
Alant.

(*Callitriche verna*, *C. stagnalis*, *Potamogeton gramineus*
s. Jun S. 481 f.)

74) *An Planken.*

Chenopodium olidum (s. an Dünger).

Amaranthus, XXI. Amaranth.

A. adscendens *Lois.*

(*Geranium molle*, *G. pusillum* s. May S. 292. — *Bromus*
sterilis, *Hordeum murinum* s. Jun S. 482.)

75) *An Quellen.*

Glyceria, III. Schwaden, Mannagras.

Gl. airoides Koel. (Aira aquatica L.), Wasserschmiele.

Epilobium obscurum (s. an Bächen).

Aconitum Cammarum (s. ebendasselbst).

An Quellen in Berggegenden.

Impatiens Noli tangere (s. Berggegenden).

An quelligen Orten der Voralpen.

Pleurospërmum, V. Rippnüsschen.

Fl. austriacum Hoffm. (Ligusticum austriacum L.), österreichischer Liebstöckel.

An quelligen, steinigen Orten in Alpenthälern.

Imperatoria Ostruthium (s. Alpenthäler).

(Nasturtium officinale, Ephemeron nemorum, Montia fontana, Larebrea uliginosa s. May S. 292 und alle im Jun S. 482 angemerkten Pflanzen.)

76) *Auf Ruinen.*

(Festuca glauca, Dianthus Caryophyllus, Geranium macrorrhizon, G. robertanum, Corydalis lutea s. May S. 293. Antirrhinum majus s. Jun S. 483.)

77) *Auf Saatäckern.*

Eragrostis, III. Liebesgras.

E. pilosa P. B. (Poa pilosa L.), haariges Rispengras.

(Bunias Erucago s. May S. 294. — Galium spurium, Prismaocarpus Speculum, Linum usitatissimum, Neslia paniculata, Lathyrus Aphaca, Silene noctiflora, Hypochaeris glabra s. Jun S. 483 f.)

78) *An Salinen und auf Salzboden.*

a) *An Salinen.*

Ruppia maritima (s. im Meere).

An Salinen.

Atriplex alba (s. an Mauern).

A. laciniata (s. am Meere).

A. triangularis (s. ebend.).

Alsine marginata (s. ebend.).

Juncus Gerardi (s. ebend.).

Senebiera Coronopus (s. ebend. und auf bebautem Boden).

Centaurea Calcitrapa (s. an Gräben).

b) Auf Salzboden.

Picreus, III. Picreus.

P. pannonicus P. B. (*Cyperus pannonicus L.*),
ungarisches Cypergras.

Holoschoenus australis (s. am südlichen Meere).

Crypsis, III. Dorngras.

Cr. schoenoides Lam. (*Phleum schoenoides L.*),
knopfgrasartiges D. oder Lieschgras.

Erythraea, V. Tausendguldenkraut.

E. pulchella Fries. (*Gentiana Centaurium β. Linn.*),
hübsches Tausendguldenkraut.

Atriplex triangularis (s. oben unter a).

Apium graveolens (s. an Bächen).

Bupleurum, V. Hasenohr.

B. tenuissimum L., feines Hasenohr.

Alsine, V. Miere.

A. marginata Rchb. (*Arenaria media L.*), mitt-
leres Sandkraut.

A. marina Rchb. (*Alsina rubra β. marina L.*),
Meer-Miere.

Melilotus, XVII. Melotte.

M. Kochiana Willd. (*Trifolium Kochianum Hayne*),

Aster Tripolium (s. am Meere).

Auf Salzwiesen.

Juncus Gerardi (s. am Meere).

Auf Salzwiesen.

Althaea, XVI. Eibisch.

A. officinalis L., gemeiner Eibisch.

Lotus, XVII. Hornklee.

L. tenuifolius Poll., feinblättriger Hornklee.

Trifolium, XVII. Klee.

Tr. fragiferum L., Erdbeerklee.

(*Polygonum aviculare* δ . *polycnemum*, *Glyceria distans*, *Samolus Valerandi* s. May S. 294 und vom Jun S. 484 *Glyceria festucaeformis* bis *Triglochin maritimum*.)

79) *Auf Sand, Sandplätzen u. dergl.*

a) *Auf Sand.*

Chenopodium acutifolium (s. auf bebautem Boden).

Armeria, V. Grasnelke.

A. plantaginea W. (*Statice arenaria Pers.*),
Sand-Grasnelke.

b) *Auf Sandäckern.*

Sabulina fastigiata (s. an felsigen Anhöhen).

Galeopsis Ladanum (s. auf Brachen.)

Linaria XIV. Maulblume.

L. arvensis Desf. (*Antirrhinum arvense L.*),
Acker-Löwenmaul.

L. Elatine Desf. (*Antirrhinum Elatine L.*), lie-
gendes Löwenmaul.

Gnaphalium, XIX. Ruhrkraut.

Gn. pyramidatum W. (*Filago pyramidata L.*),
pyramidenförmiges Ruhrkraut.

c) *Auf Sandbergen.*

Gypsophila fastigiata (s. auf Hügeln.)

d) *Auf Sandboden.*

Cynodon, III. Hundszahngras.

C. Dactylon Rich. (*Panicum Dactylon L.*),
Finger-Hirse.

Auf Sandboden.

Poa compressa (s. auf Felsen).

Asterocephalus ochroleucus (s. an Feldrainen).

A. suaveolens (s. auf dürren Anhöhen).

Herniaria, V. Bruchkraut.

H. hirsuta *L.*, haariges Bruchkraut.

Asparagus officinalis (s. auf bebautem Boden).

Calluna, VIII. Besenheide.

C. vulgaris *Salisb.* (*Erica vulgaris* *L.*), gemeines Heidekraut.

Linaria (s. oben) *striata* *De C.* (*Antirrhinum repens* *L.* *Ant. monspessulanum* *L.*), gestreiftes Löwenmaul.

Hieracium XIX. Habichtskraut.

H. staticifolium *All.* grasnelkenblättriges H.

Chondrilla, XIX. Knorpelsalat.

Ch. juncea *L.*, binsenartiger Knorpelsalat, gelbe Wegwarte, gelber Sonnenwirbel.

Jurinea, XIX. Jurinee.

J. cyanoides *Rchb.* (*Carduus cyanoides* *L.*), kornblumenartige Distel.

J. mollis *Rchb.* (*Carduus mollis* *L.*, weiche D.

Gnaphalium, XIX. Ruhrkraut.

Gn. arvense *Fr. Rchb.* (*Filago arvensis* *L.*), Acker-Ruhrkraut.

Gn. germanicum *W.* (*Filago germanica* *L.*), deutsches Ruhrkraut.

Gn. montanum *Fr.* (*Filago montana* *L.*), Berg-R.

Helichrysum, XIX. Immortelle.

H. arenarium *Mnch.* (*Gnaphalium arenarium* *L.*), Sand-Ruhrkraut.

In Sandboden auf Aeckern.

Nigella arvensis (s. auf Aeckern).

Auf Sandboden unter dem Getreide.

Alectorolophus hirsutus (s. unter dem Getreide).

Auf Sandboden grosser Landseen und Teiche.

Subularia, XV. Pfriemenkresse.

S. aquatica L., Wasser-Pfriemenkresse.

Auf Sandboden an Flussufern.

Silene tatarica (s. an Flüssen).

Auf Sandboden in Gebüsch und an Zäunen.

Saponaria officinalis (s. auf bebautem Boden).

Auf Sandboden an den Rändern der Nadelwälder.

Sedum recurvatum (s. Nadelwälder).

Auf feuchtem Sandboden.

Picreus pannonicus (s. auf Salzboden.)

Helichrysum (s. oben) *luteo-album Rchb.* (*Gnaphalium luteo-album L.*), gelblich-weisses Ruhrkraut.

Centaurea Calcitrapa (s. an Gräben).

Auf feuchtem Sandboden in der Nähe von Seen, Sümpfen und Teichen.

Radiola, IV. Zwerg-Lein.

R. Millegrana Sm. (Linum Radiola L.), tausendkörniger Lein.

Auf überschwemmtem Sandboden.

Illeborum, V. Knorpelkraut.

I. verticillatum L., quirlförmiger Knorpelkelch. (In der Nähe von Seen und Teichen.)

Lindernia, XIV. Lindernie.

L. pyxidaria L., gemeines Büchsenkraut.

Auf wüsten Sandplätzen.

Phoenixopus, XIX. Ruthensalat.

Ph. ramosissimus (Prenanthes ramosissima All.), ästiger Hasensalat.

e) *Auf Sandebenen und Sandfeldern.*

Plantago, IV. Wegerich.

Pl. arenaria *W. Kit.*, Sand-Wegerich.

Verbascum, V. Wollkraut.

V. versiflorum *Schrad.*, rostfarbiges Wollkraut.

Arenaria serpyllifolia (s. auf Hügeln).

f) *In Sandgegenden.*

Camphorosma, IV. Campherkraut.

C. monspeliaca *L.*, haariges Campherkraut.

Jasione, V. Jasione.

J. montana *L.*, Berg-Schafscabiose.

In sandigen Gegenden auf feuchten Wiesen.

Scirpus, III. Binse.

Sc. radicans *Schk.*, wurzelnde Binse.

g) *In Sandgräben.*

Xanthium Strumarium (s. an Mauern).

h) *Auf Sandhügeln.*

Dianthus, X. Nelke.

D. serotinus *W. Kit.*, späte Nelke.

Silene chlorantha (s. in Fichtenwäldern).

Sabulina fastigiata (s. an felsigen Anhöhen).

i) *An sonnigen Sandsteinfelsen.*

Codonoprasum flavum (s. an grasigen Hügeln).

Linaria genistaefolia (s. an sonnigen Kalkfelsen).

(Reseda lutea, Sagina apetala, Silene conica, Nardus stricta, Alsine rubra, Dianthus Armeria, Neslia paniculata, Astragalus Cicer, Ornithopus intermedius, O. perpusillus, Trifolium repens, Carex Oederi, Festuca glauca, Hypericum elegans, Berteroa incana, Agropyrum cristatum, A. intermedium, Ajuga montana, Armeria vulgaris s. May S. 295 ff. und fast alle im Jun S. 485. ff. aufgezeichneten Pflanzen, nämlich: Plantago major bis Thymus angustifolius, Sagina depressa bis Monotropa Hypopithys, Scleranthus perennis bis Ononis repens, Vicia cassubica bis Thymus Serpyllum, Agropyrum strictum bis Senecio abrotanifolius, Linum hirsutum, Dianthus arenarius, Astragalus asper.)

80) *An schattigen Orten.*

Rumex obtusifolius (s. auf bebaulichem Boden).

Polygonum Persicaria (s. an feuchten Orten).

Menziesia, X. Menziesie.

M. coerulea Sm. (Andromeda coerulea L.),
blaue M. oder Andromeda.

Melissa, XIV. Melisse.

M. officinalis L., Citronen-Melisse.

*An schattigen Orten in Berggegenden und
Wäldern.*

Impatiens Noli tangere (s. in Berggegenden).

An schattigen Orten in Gebirgen.

Laserpitium Archangelica (s. in Gebirgen).

An schattigen, steinigen Orten.

Saxifraga, X. Steinbrech.

S. arachnoidea Sternb., spinnenwebartiger St.

(Oxalis stricta, Geranium pyrenaicum, G. lucidum, G. robertianum s. May S. 302 f. und alle im Jun S. 492 f. aufgezeichneten Pflanzen.)

81) *Auf Schiefergebirge.*

(Pedicularis asplenifolia s. Jun S. 493).

82) *Auf Schlamm.*

Myosotis, V. Vergissmeinnicht.

M. repens Don., kriechendes V. (In schattigen
Laubwäldern).

Allium, VI. Lauch.

A. suaveolens Jacq., wohlriechender Lauch.

Pulicaria vulgaris (s. in Pfützen).

Auf Schlammboden.

Limnochloa acicularis (s. auf Lehm Boden).

An schlammigen Orten.

Succisa, IV. Abbiss-Scabiose.

S. australis (*Scabiosa australis Wulff.*), südliche Scabiose.

Erythraea spicata (s. an feuchten, schlammigen Ort.).

(*Holoschoenus Linnaei*, *Spartina stricta* s. Jun S. 493 f.)

83) *Schmarotzend.*

Cuscuta, IV. Flachsseide.

C. alba Prsl., weisse Flachsseide. (Auf *Colutea arborescens*.)

C. Epilinum (s. auf Leinäckern).

C. Epithymum Sm., Thymseide. (An niedrigen Kräutern auf trocknen Wiesen.)

C. europaea L., europäische Flachsseide. (Auf Hopfen und Nesseln).

C. monogyna Vahl., einweibige Fl. (Auf Beifuss, Pappeln, in Weidengebüsch.)

Orobanche, XIV. Ervenwürger.

O. loricata Rchb., bepanzerte Sommerwurz. (Auf *Berberis vulgaris* und *Tussilago Petasites*.)

(Hiezu noch die im Jun S. 494 bemerkten Arten.)

84) *Auf Schutt.*

Blitum, I. Erdbeerspinat.

Bl. virgatum L., ruthenförmiger E. β . *Blitum chenopodioides Lam.*

Salvia nemorosa (s. auf Hügeln).

Digitaria sanguinalis (s. auf Mauern).

Parietaria officinalis (s. auf Mauern).

Echinospermum Lappula (s. auf Mauern).

E. squarrosum (s. ebendasselbst).

Datura Stramonium (s. auf bebautem Boden).

Solanum, V. Nachtschatten.

S. Dulcamara L., Bittersüss.

Auf Schütt.

Solanum flavum Kit., gelber Nachtschatten.

S. humile Bernh., niedriger Nachtschatten.

S. miniatum Bernh., fahlrother Nachtschatten.

S. nigrum L., schwarzer Nachtschatten.

S. nodiflorum Jacq., knotenblüthiger N.

S. oleraceum Rich., gemüseartiger N.

S. pterocaulon (s. auf bebaute Boden).

S. rubrum Mill., rother Nachtschatten.

S. villosum Lam., zottiger Nachtschatten.

Chenopodium murale (s. auf Dünger.)

Ch. olidum (s. ebendasselbst).

Ch. polyspermum (s. auf hebaute Boden).

Ch. urbicum (s. an Häusern).

Ch. viride (s. auf bebaute Boden).

Atriplex alba (s. an Mauern).

A. microsperma (s. auf Dünger).

A. patula (s. auf bebaute Boden).

Heracleum Sphondylium (s. in Gebüsch).

Ammi majus (s. auf bebaute Boden).

Torilis Anthriscus (s. in Gebüsch).

Polygonum Persicaria (s. an feuchten, schattigen Orten).

Euphorbia exigua (s. auf Aeckern).

E. platyphyllos (s. auf bebaute Boden).

Teucrium Chamaedrys (s. an sonnigen Anhöhen).

Leonurus Cardiaca (s. an Mauern).

Chaiturus, XIV. Katzenschwanz.

Ch. Marrubiastrum Ehrh. (*Leonurus Marrubiastrum* L.), andornförmiger Katzenschwanz oder Löwenschwanz.

Galeopsis acuminata (s. an Ackerrändern).

G. bifida (s. ebendasselbst).

G. pubescens (s. an Mauern).

G. Tetrahit L. (s. auf bebaute Boden).

Auf Schutt.

Ballota, XIV. Ballote.

B. foetida Lam., stinkende Ballote.

B. urticifolia Ortm., nesselblättrige Ballote.

Marrubium, XIV. Andorn.

M. apulum (s. an Mauern).

M. creticum Lob. L., kretischer Andorn.

M. pannonicum Clus., ungarischer Andorn.

M. vulgare (s. an Mauern).

Nepeta Cataria (s. an Feldrainen.)

Verbena officinalis (s. in Gräben).

Iberis pinnata (s. auf bebaute Boden).

Lepidium, XV. Kresse.

L. Iberis L., schmalblättrige Kresse.

Senebiera Coronopus (s. auf bebaute Boden).

Malva, XVI. Malve, Käspappel.

M. Alcea (s. in Gebüsch).

M. crispa L., krause Malve oder Käspappel.

M. moschata (s. an Ackerrändern).

M. silvestris L., wilde Malve, Rosspappel.

M. vulgaris Trag., gemeine M. oder Käspappel.

Melilotus alba (s. auf bebaute Boden).

Phoenixopus vimineus (s. an Mauern.)

Crepis, XIX. Pippau.

Cr. pulchra L., schöner Pippau.

Lactuca Scariola (s. an Mauern).

Scolymus maculatus (s. an Mauern).

Onopordon, XIX. Krebsdistel.

O. Acanthium L., gemeine Krebsdistel.

Lappa tomentosa (s. an Feldrainen).

Carduus, XIX. Distel.

C. polyacanthos Curt., vieldornige Distel.

Cirsium, XIX. Kratzdistel.

C. lanceolatum Scop. (*Carduus lanceolatus L.*),
lanzetblättrige Kratzdistel.

Auf Schutt.

Artemisia Absynthium (s. an Mauern).

A. vulgaris (s. ebendasselbst).

Anthemis Cotula (s. in Dörfern, an Gräben).

Centaurea paniculata (s. an Feldrändern).

Amaranthus retroflexus (s. auf bebautem Boden.)

A. spicatus (s. ebendasselbst.)

Xanthium, XXI. Spitzklette.

X. spinosum L., dornige Spitzklette.

X. Strumarium (s. an Mauern).

(*Blitum Bonus Henricus*, *Veronica arvensis*, *Cynoglossum officinale*, *Hyoscyamus niger*, *Polygonum aviculare* α . *triviale*, *Reseda lutea*, *Chelidonium majus*, *Capsella Bursa pastoris*, *Lepidium campestre*, *L. ruderales*, *Sinapis nigra*, *Sisymbrium Columnae*, *S. Irio*, *S. officinale*, *Diplotaxis muralis*, *Erodium cicutarium*, *E. malacoides*, *E. moschatum*, *Geranium molle*, *G. robertianum*, *Malva rotundifolia*, *Medicago lupulina*, *Senecio vulgaris* s. May S. 303 ff. und alle im Jun S. 494 ff. angegebenen Pflanzen.)

§5) *An und in Seen.**A. An Seen.*

Scirpus, III. Binse.

Sc. mucronatus L., steifgespitzte Binse.

Radiola Millegrana (s. auf feuchtem Sandboden).

Lobelia, V. Lobelie.

L. Dortmanna L., Wasser-Langhals.

Illecebrum verticillatum (s. auf überschwemmtem Sandboden).

Rumex maritimus (s. an Gräben).

Lythrum tomentosum (s. an Gräben).

Genista, XVII. Ginster.

G. sibirica L., sibirischer Ginster.

Malaxis, XX. Zart-Orche.

M. paludosa Sw. (*Ophrys paludosa* L.), Sumpf-Weichkraut.

B. In Seen.

Chara, I. Armleuchter.

Ch. tomentosa L. filziger Armleuchter.

Potamogeton pectinatus (s. in Flüssen).

Ruppia maritima (s. im Meere).

Villarsia, V. Villarsie.

V. nymphoides Vent. (Menyanthes nymphoides L.), seerosenartige Zottenblume.

Rumex Hydrolapathum (s. in Gräben).

Polygonum, VIII. Knöterig.

P. amphibium L., Wechsel-Knöterig.

Elatine, VIII. Tännel.

E. Alsinastrum L., quirlblättriger Tännel.

Nuphar, XIII. Nixblume.

N. pumilum De C. (Nymphaea minima Sm.), kleinste Seerose.

Zannichellia, XXI. Zannichellie.

Z. repens Bönningh., kriechende Zannichellie.

In salzigen Landseen.

Chara (s. oben) canescens Lois., graulicher Armleuchter.

(Trapa natans s. May S. 307 und alle im Jun S. 498 f. angemerkten Pflanzen.)

*Am Seestrande (s. am Meere.)**86) An sonnigen Orten.*

(Veronica prostrata, V. Chamaedrys s. May S. 307 und alle im Jun S. 499 aufgezeichneten Pflanzen.)

An sonnigen, steinigen Orten.

Stipa, III. Pfriemengras.

St. Aristella L., kurzgranniges Pfriemengras.

Marrubium, XIV. Andorn.

M. peregrinum L., fremder Andorn.

87) *Um Städte.*

(Tilia europaea s. Jun S. 499.)

88) *An Steinbrüchen.*

(Verbascum phlomoides s. Jun S. 499.)

89) *Auf Steinhäufen.*

(Sedum Telephium, Rubus caesius s. Jun S. 500.)

90) *An steinigen Plätzen.***Pollinia, III. Pollinie.**P. distachys *Spr.* (Andropogon distachyos *L.*),
zweiähriges Bartgras.**Plantago, IV. Wegerich.**Pl. saxatilis *M. B.* Stein-Wegerich.**Cnidium, V. Brenndolde.**Cn. apioides *Hoffm.* (Ligusticum apioides *Lam.*),
silgeblättrige Brenndolde.**Clematis, XIII. Waldrebe.**Cl. Flammula *L.*, brennende Waldrebe.**Malva silvestris (s. auf Schutt).****Leontodon, XIX. Löwenzahn.**L. saxatilis *Rchb.*, Stein-Löwenzahn.**Carlina, XIX. Eberwurz.**C. corymbosa *L.*, doldentraubige Eberwurz.**Inula, XIX. Alant.**I. montana *L.*, Berg-Alant. (In Steingerölle.)a) *An steinigen Orten auf Flussinseln.***Galium, IV. Labkraut.**G. helveticum *Weig.*, schweizerisches Labkraut.b) *An steinigen Orten in Gebüsch.***Picris, XIX. Bitterkraut.**P. umbellata *N. v. E.*, doldiges Bitterkraut.c) *An steinigen Orten in Voralpengegenden.***Galeopsis, XIV. Hohlzahn.**G. intermedia *Vill.*, mittlere Hanfnessel.

d) *An steinigen Orten in Weinbergen.*

Malva, XVI. Malve, Käspappel.

M. italica Pollin., italische Käspappel.

e) *An steinigen, sonnigen Orten.*

Stipa Aristella, Marrubium peregrinum (s. an sonnigen Orten).

f) *An steinigen, trocknen Plätzen.*

Silene Otites (s. an Bergabhängen).

Xeranthemum, XIX. Strohblume.

X. annuum L., einjährige Strohblume.

(*Agropyrum cristatum*, *Galium ochroleucum*, *Geranium nodosum*, *Cynanchum Vincetoxicum*, *Geranium robertianum*, *Agropyrum intermedium* s. May S. 308 ff. und die meisten der im Jun S. 500 f. bemerkten Pflanzen, nämlich: *Melica ciliata* bis *Cornus sanguinea*, *Arenaria ciliata*, *Andrachne telephioides* bis *Sedum Telephium*, *Senecio abrotanifolius*.)

91) *Auf Stoppeläckern.*

(*Polygonum aviculare* γ . *neglectum* s. May S. 310.)

92) *An Strassen.*

Chenopodium ficifolium (s. auf Aeckern).

(*Polygonum aviculare* α . *triviale* s. May S. 310. — *Cardaria Draba*, *Barkhausia graveolens*, *Tribulus terrestris* s. Jun S. 502.)

An Strassengräben.

Ammi majus (s. auf bebautem Boden).

Melissa officinalis (s. an schattigen Orten).

93) *An und in Sümpfen und an sumpfigen Orten.*

A. *An Sümpfen und sumpfigen Orten.*

a) *An Sümpfen.*

Picreus, III. Picreus.

P. flavescens P. B. (*Cyperus flavescens L.*), gelbliches Cypergras.

An Sümpfen.

Scirpus maritimus (s. am Meere).

Isolepis, III. Zartriet.

I. supina R. Br. (*Scirpus supinus* L.), niedrige Binse.

Glyceria airoides (s. an Bächen).

Poa angustifolia (s. an Gräben).

Radiola Millegrana (s. auf feuchtem Sandboden).

Lysimachia, V. Lysimachie.

L. guestphalica Weihe, westphälische Lysimachie.

L. punctata L., punctirte Lysimachie.

L. vulgaris L., gemeine Lysimachie.

Solanum Dulcamara (s. auf Schutt).

Drosera intermedia (s. auf Moorboden).

Dr. rotundifolia (s. ebendasselbst).

Allium suaveolens (s. in Schlamm).

Juncus acutiflorus (s. ebendasselbst).

J. lamprocarpos (s. an Gräben).

Rumex, VI. Ampfer.

R. crispus L., krauser Ampfer.

R. maritimus L., Meerstrands-Ampfer.

Epilobium, VIII. Schotenweiderich.

E. persicinum Rchb., pfirsichfarbenes Weidenröslein.

E. roseum Schrb., rosenfarbiges Weidenröslein.

E. tetragonum L., vierkantiges Weidenröslein.

Cucubalus baccifer (s. an feuchten Orten zwischen Gebüsch).

Lythrum Salicaria (s. an Flüssen).

Teucrium Scordium (s. in Moorboden).

Mentha viridis (s. an Bächen).

Melilotus, XVII. Melotte.

M. officinalis Pers. (*Trifolium Melilotus officinalis* L.), gemeiner, gebräuchlicher Steinklee.

Senecio paludosus (s. an Flüssen).

S. sarracenicus (s. ebendasselbst).

An Sümpfen.

Pulicaria dysenterica (s. an feuchten Plätzen).

Humulus Lupulus (s. an Flüssen).

An Sümpfen in Waldgebüsch.

Carduus crispus β . *integrifolius* (s. an Bächen.)

An Sümpfen in Waldungen.

Eupatorium cannabinum (s. an Bächen).

b) *An sumpfigen Orten.*

Crypsis, III. Dorngras.

Cr. aculeata Ait. (*Anthoxanthum aculeatum* L.,
Schoenus aculeatus L.), stechendes D.

Cr. alopecuroides Ait., fuchsschwanzartiges D.

Cr. schoenoides Lam. (*Phleum schoenoides* L.),
knopfgrasartiges D. oder Lieschgras.

Succisa australis (s. an schlammigen Stellen).

Hemerocallis, VI. Taglilie.

H. fulva L., braunrothe Taglilie.

Pavonia, XVI. Pavonie.

P. pentacarpos Rchb. (*Hibiscus pentacarpos* L.),
fünffrüchtiger Hibiscus.

Auf sumpfigem, salzigen Boden.

Melilotus Kochiana (s. auf Salzboden).

Auf Sumpfwiesen.

Ostericum, V. Osterik.

O. palustre Bess. (*Imperatoria palustris* Bess.),
Sumpf-Osterik.

Juncus, VI. Simse.

J. melananthos Rchb., schwarzblüthige Simse.

Stellaria, X. Sternkraut.

St. longifolia Fries., langblättriges Sternkraut.

Euphorbia, XI. Wolfsmilch.

E. lucida W. Kit., glänzende Wolfsmilch.

Auf Sumpfwiesen.

Pedicularis, XIV. Läusekraut.

P. palustris L., Sumpf-Läusekraut.

B. In Sümpfen.

Veronica scutellata (s. in Gräben).

Lycopus europaeus (s. ebendasselbst).

Cladium, III. Nussriet.

C. Mariscus R. Br. (*Schoenus Mariscus R. Br.*),
grosses Knopfgras.

Rhynchospora alba (s. in Morästen).

Cyperus longus (s. an Gräben).

Dichostylis, III. Wasserriet.

D. fluitans P. B. (*Scirpus fluitans L.*), fluthende,
schwimmende Binse.

Scirpus mucronatus (s. an Seen.)

Holoschoenus australis (s. am südlichen Meere).

Phragmites, III. Schilf.

Ph. communis Trin. (*Arundo Phragmites L.*),
gemeines Schilfrohr.

Glyceria, III. Mannagrass, Schwaden.

Gl. aquatica Wahlb. (*Poa aquatica L.*), Wasser-
Rispengras.

Isnardia palustris (s. an feuchten Orten).

Potamogeton rufescens (s. in Bächen).

Gentiana Pneumonanthe (s. auf Moorboden.)

Thysselinum palustre (s. an Gräben).

Cicuta virosa (s. in Gräben).

Oenanthe, V. Rebendolde.

O. Phellandrium Lam. (*Phellandrium aquaticum L.*), gemeiner Wasser-Fenchel.

Sium angustifolium und *S. latifolium* (s. in Gräben).

Rumex palustris (s. ebendasselbst).

Epilobium, VIII. Schoten-Weiderich.

E. hirsutum L., zotiges, grossblumiges Wei-
denröslein.

In Sümpfen.

Epilobium intermedium *Merat.*, mittleres W.

E. palustre *L.*, Sumpf-Weidenröslein.

E. parviflorum *Schreb.*, kleinblumiges W.

E. rivulare *Wahlnb.*, Bach-Weidenröslein.

Elatine Alsinastrum (s. in Seen.)

Ranunculus, XIII. Ranunkel, Hahnenfuss.

R. Lingua *L.*, zungenblättriger R. oder H.,
grosser Sumpf-Ranunkel.

Mentha, XIV. Minze, Münze.

M. aquatica *L.*, Wasser-Minze.

M. arvensis *L.*, Var. *parietariaefolia* *Beck.*

M. palustris *Mnch.*, Sumpf-Minze.

Clinopodium vulgare (s. an sonnigen Anhöhen.)

Scrofularia aquatica (s. in Gräben).

Trifolium, XVII. Klee.

T. hybridum *L.*, Bastard-Klee.

Sonchus, X. Distelsalat.

S. palustris *L.*, Sumpf-Distelsalat.

Cirsium palustre (s. auf Moorboden).

Hoppea, XIX. Hoppea.

H. sibirica *Rchb.* (*Cineraria sibirica* *L.*), sibi-
rische Aschenpflanze. (In Gebirgsgegenden.)

(*Glyceria distans*, *Larbraea uliginosa*, *Spiraea denudata*,
Sp. Ulmaria, *Nasturtium officinale*, *N. palustre*, *N. silvestre*,
Ranunculus hirsutus, *Comarum palustre*, *Salix myrtilloides*,
Gratiola officinalis s. May S. 310 ff. und die meisten der
im Jun S. 502 ff. angegebenen Pflanzen, nämlich: *Veronica*
Anagallis bis *Agropyrum rigidum*, *Euphorbia pilosa*
bis *Inula salicina*, *Thypha angustifolia*, *T. elatior*, *T. latifolia*,
Callitriche autumnalis bis *Vignea axillaris*, *Eriophorum*
capitatum.)

94) *An und in Teichen.*a) *An Teichen.*

Coleanthus, III. Scheidenklappgras.

C. subtilis *Seid.* (*Schmidtia subtilis* *Tratt.*)

An Teichen.

Scirpus maritimus (s. am Meere).

Heleogiton pungens (s. an Flüssen).

Isolepis, III. Zartriet.

I. setacea R. Br. (*Scirpus setaceus* L.), borstenförmige Binse.

Echinochloa Crus galli (s. auf feuchten Aeckern).

Festuca III. Schwingel.

F. rubra L., rother Schw. Var. γ . *Festuca duriuscula* Sm. (Im Sande).

Radiola Millegrana (s. auf feuchtem Sandboden).

Illecebrum verticillatum (s. auf überschwemmtem Sandboden).

Cicuta virosa (s. in Gräben).

Peplis VI. Portulkraut.

P. Portula L., gem. After-Quendel, Zipfelkraut.

Epilobium roseum (s. an Bächen).

E. tetragonum (s. an Sümpfen).

Polygonum nodosum und **lapathifolium-nodosum** (s. an feuchten Orten).

Lythrum Salicaria (s. an Flüssen).

An bespülten Teichrändern.

Elatine Hydropiper (s. an bespülten Flussumfern).

b) In Teichen.

Chara, I. Armleuchter.

Ch. fragilis Desv., zerbrechlicher Armleuchter.

Ch. hispida L., borstiger Armleuchter.

Ch. syncarpa Thuill. (In Teichen mit Leimboden.)

Cladium Mariscus (s. in Sümpfen).

Glyceria aquatica (s. ebendasselbst).

Potamogeton gramineus (s. in Seen).

P. nitens (s. in Bächen).

P. pectinatus (s. in Seen.)

Villarsia nymphoides (s. ebendasselbst).

In Teichen.

Rumex Hyprolapathum u. R. maximus (s. in Gräben).
 Polygonum amphibium (s. in Seen).
 Elatine Alsinastrum (s. ebendasselbst).
 Nuphar pumilum (s. ebend.)
 Schelhammeria cyperoides (s. in Gräben).
 Sparganium erectum und Sp. simplex (s. in Gräben).
 Najas marina (s. in langsamen Flüssen).

In ausgetrockneten Teichen.

Veronica scutellata (s. in Gräben).

(Samolus Valerandi, Potentilla Anserina, Carex Oederi, Trapa natans, Potamogeton crispus, P. perfoliatus s. May S. 314 ff. und alle im Jun S. 507 ff. angemerkten Pflanzen.)

95) *In Thälern.*

Galeopsis XIV. Hohlzahn.

G. versicolor Curt., bunte Hanfnessel. (An feuchten Orten).

In feuchten, schattigen Thälern.

Jirasekia, V. Jirasekie.

J. tenella Rchb. (Anagallis tenella L.), zartes Gauchheil.

(Rubus hirtus, Silene acaulis, Trifolium spadiceum siehe Jun. S. 509 f.)

96) *Auf Thonboden.*

Gnaphalium germanicum (s. auf Sandboden).

Auf Thonäckern.

Galeopsis (s. oben) Tetrahit L., breitblättrige Hanfnessel. Var. β . teucrioides Bnng.

Auf Thonschieferalpen.

Crepis, XIX. Pippau.

Cr. montana Rchb. (Hypochaeris montana L.), Berg-Pippau.

Auf Thonboden.

(*Dianthus Armeria* s. May S. 316. — *Sonchus arvensis*,
Taraxacum serotinum s. Jun S. 510.)

97) *Auf Torfboden.*

Rhynchospora alba (s. in Morästen).

Succisa, IV. Abbiss-Scabiose.

S. pratensis Mnch. (*Scabiosa Succisa L.*), Teufels-Abbiss.

Auf überschwemmtem Torfboden.

Isnardia palustris (s. an feuchten Orten).

Larbreia, X. Larbreia.

L. crassifolia Rchb. (*Stellaria crassifolia Ehrh.*), dickblättrige Sternmiere.

Auf Torfmoor.

Saxifraga, X. Steinbrech.

S. Hirculus L., gelber Wiesen-Steinbrech.

Auf Torfwiesen.

Epipactis, XX. Sumpfwurz.

E. palustris Sw. (*Serapias longifolia L.*), gemeine Sumpfwurz.

Auf feuchten Torfwiesen in Wäldern.

Cirsium, XIX. Kratzdistel.

C. semidecurrens Richt., halbherablaufende Kr.

(*Rhynchospora fusca* s. May S. 316 und die meisten der im Jun S. 510 f. aufgezeichneten Pflanzen, nämlich: *Heleocharis uniglumis* bis *Juncus filiformis*, *Callitriche autumnalis* bis *Oenanthe Lachenalii*).

98) *Auf Triften.*

Festuca rubra (s. auf Alpen, auf Anhöhen).

Asterocephalus suaveolens (s. auf dürren Anhöhen).

Erythraea Centaurium (s. an grasigen Anhöhen).

Auf Triften.

Rumex, VI. Ampfer.

R. crispus L., krauser Ampfer.

Dianthus Carthusianorum (s. auf Feldrainen).

Spergella nodosa (s. auf feuchten, sandigen Aeck.).

Potentilla reptans (s. an Gräben).

Ononis, XVII. Hauhechel.

O. hircina Jacq. (Ononis spinosa α . mitis Linn.),
stinkende Hauhechel.

Senecio Doria (s. auf feuchten Bergwiesen).

*Auf Triften der Alpen, Gebirge, Hochgebirge,
Kalkvorpalen, Urgebirge und Wälder (siehe
diese Rubriken).*

Auf Triften zwischen Weidengebüsch.

Euphorbia lucida (s. auf Sumpfwiesen).

Auf dürrer Triften.

Thrincia, XIX. Thrincie, Hundslattich.

Thr. Leysseri Wallr., Leysser's-Thrincie.

Auf feuchten Triften.

Dipsacus laciniatus und D. silvestris (s. an Gräben).

Spiranthes, XX. Drehähre.

Sp. aestivalis Rich.. (Ophrys aestivalis Lam.),
Sommer-Drehähre, Sommer-Ragwurz.

Auf feuchten Triften in festem, lehmigen Boden.

Trifolium, XVII. Klee.

Tr. fragiferum L., Erdbeer-Klee.

Auf trocknen Triften.

Euphrasia, XIV. Augentrost.

E. officinalis L., gemeiner Augentrost.

Hypericum perforatum (s. auf Feldrainen).

(Festuca duriuscula, Armeria vulgaris, Stellaria graminea, Cerastium triviale, Alectorolophus minor, Bonjeanea hirc-

Auf Triften.

suta, Trifolium repens, Bellis perennis, Nardus stricta, Euphorbia Esula, Helianthemum grandiflorum, Genista decumbens, Astragalus exscapus, Stellaria media s. May S. 318 ff. und alle vom Jun S. 511 — 514.)

99) *An trocknen Orten.*

Medicago media (s. an Ackerrändern).

Carduus, XIX. Distel.

C. crispus L., krause Distel. Var. α . pinnatifidus. **Carduus acanthoides Schk.**

(Sisymbrium Columnae, Agropyrum intermedium s. May S. 321 und vom Jun S. 514 Veronica latifolia bis Melilotus Petitpierreana.)

100) *In Tümpeln.*

(Chara flexilis s. Jun S. 514.)

101) *Ueberall.*

Blitum rubrum (s. um Dünger).

Sagina, IV. Mastkraut.

S. procumbens L., liegendes Mastkraut.

Chenopodium murale (s. auf Dünger).

Heracleum Sphondylium (s. in Gebüsch).

Trifolium arvense (s. auf Aeckern).

Hypericum perforatum (s. auf Feldrainen).

Sonchus oleraceus (s. auf bebautem Boden).

Leontodon hispidus (s. auf Anhöhen).

Cichorium, XIX. Cichorie.

C. Intybus L., Wegwarte.

Centaurea, XIX. Flockenblume.

C. Jacea L., gemeine Flockenblume.

(Nardus stricta, Poa annua, Bromus sterilis, Dactylis glomerata, Agropyrum repens, Plantago major, Pl. media, Pl. lanceolata, Anchusa officinalis, Aegopodium Podagraria, Polygonum aviculare, P. Persicaria, Stellaria media, Arena-

Ueberall.

ria serpyllifolia, Cerastium triviale, Chelidonium majus, Capsella Bursa pastoris, Erodium cicutarium, Trifolium pratense, Tr. repens, Taraxacum officinale, Senecio vulgaris, Bellis perennis s. May S. 322 ff. und fast alle im Jun S. 515 bemerkten Pflanzen.)

102) *An überschwemmten Orten.*

Picreus, III. Picreus.

P. flavescens P. B. (Cyperus flavescens L.), gelbliches Cypergras.

P. Monti P. B. (Cyperus Monti L.), Montisches Cypergras.

Fimbristylis Micheliana (s. an feuchten Plätzen).

Heleogiton trigonum (s. an feuchten Plätzen).

H. triquetrum (s. an Flüssen).

Isolepis setacea (s. an Teichen).

I. supina (s. an Flüssen).

Limnochloa, III. Pfuhlbinsse.

L. parvula (Scirpus parvulus R. S.), Zwerg-Binsse.

L. acicularis L., nadelförmige Binsse.

Juncus lamprocarpos (s. an Gräben).

Rumex maritimus (ebendasselbst).

Elatine, VIII. Tännel.

E. Schkuhriana Hayne, Schkuhrischer Tännel.

E. triandra Schk., dreifädiger T. (In der Nähe grosser Flüsse).

Lythrum, XI. Weiderich.

L. Hyssopifolia L., ysopblättriger Weiderich.

Limosella, XIV. Limoselle.

L. aquatica L., Wasser-Limoselle.

Gnaphalium uliginosum (s. an feuchten Orten).

Helichrysum luteo-album (s. in Gräben).

Inula britannica (s. an Bächen).

I. Oetteliana (s. an feuchten Plätzen).

Pulicaria vulgaris (s. an Pfützen).

Auf überschwemmtem Torfboden.

Isnardia palustris (s. an feuchten Orten).

An überschwemmten, austrocknenden Orten.

Cicuta, V. Wütherich.

C. virosa L., Gift-W. Var. **tenuifolia** Schrk.

An überschwemmten, sandigen Plätzen.

Lindernia pyxidaria (s. an sandigen überschwemmten Plätzen).

An überschwemmtgewesenen Plätzen.

Veronica scutellata (s. in Gräben).

Chenopodium polyspermum (s. auf bebaut. Bod.).

Peplis Portula (s. an Teichen).

Gnaphalium, XIX. Ruhrkraut.

Gn. nudum Hoffm., nacktes Ruhrkraut.

An niedrigen, überschwemmtgewesenen Orten.

Pulegium XIV. Poley.

P. vulgare Mill. (**Mentha Pulegium** L.)

An überschwemmten Plätzen auf Teichboden nach Ablassung des Wassers.

Schelhammeria cyperioides (s. in Gräben).

(**Ranunculus hirsutus**, **Carex Oederi**, **Callitriche verna**, **Nasturtium anceps**, **N. palustre** s. May S. 325 und alle im Jun S. 517 angegebenen Pflanzen.)

103) *An Ufern.*

Heleogiton trigonum (s. an feuchten Plätzen, an Flüssen).

H. triquetrum (s. an Flüssen).

Cynodon Dactylon (s. an Flüssen).

Solanum Dulcamara (s. an steinigen Felsen).

Anthemis Cotula (s. in Dörfern, an Gräben.)

Torilis infesta (s. in Gebüsch).

Corrigiola littoralis (s. an Bergströmen).

An felsigen Ufern.

Carlina, XIX. Eberwurz.

C. racemosa L., traubenartige Eberwurz.

An sandigen Ufern.

Chenopodium, V. Gänsefuss.

Ch. album L., weisser G. Var. β . riparium.

In Ufersand.

Epilobium, VIII. Schotenweiderich.

E. rosmarinifolium Hänk., rosmarinblättriges Weidenröslein.

(Eryngium planum, Spergula arvensis, Cyperus patulus, Camelina austriaca s. Jun. S. 518.)

104) Auf unbebautem Boden.

(Die im Jun S. 518 angemerkten Pflanzen.)

105) Auf Urgebirgen.

Androsace, V. Mannsschild.

A. obtusifolia All., stumpfblättriger Mannssch.

Rhododendron ferrugineum (s. auf Kalkalpen.)

Dianthus, X. Nelke.

D. caesius Sm., graublättrige N. (An Felsen.)

Sempervivum, XI. Hauswurz.

S. montanum L., Berg-H. (Auf hohen Felsen.)

Aconitum, III. Eisenhut.

A. Cammarum Jacq., langhelmiger E. Var. α .

gracile Rchb. (In niederen Urgebirgen an Bächen, Bergströmen, Quellen.)

Saussurea, XIX. Saussurea.

S. alpina De C. (Serratula alpina L.), Alpen-Scharte.

a) Auf Urgebirgsalpen.

Androsace obtusifolia (s. oben).

Sibbaldia, V. Sibbaldie.

S. procumbens L., liegendes Scheidenkraut.

*Auf Urgebirgsalpen.***Saxifraga, X. Steinbrech.***S. bryoides* L., stamm-moosartiger St. (An nackten Felsen).*S. bryoides*, Var. β . *laxa* (*Saxifraga aspera* L.), scharfer St. (An feuchten Orten).*S. muscoides* Wulff., moosartiger Steinbrech. (An feuchten Orten.)**Sabulina, X. Sändling.***S. polygonoides* (*Arenaria pylygonoides* Wulff.), knöterigartiges Sandkraut. (Auf Gerölle und steinigen Triften.)**Potentilla, XII. Fingerkraut.***P. frigida* Vill., Forst-Fingerkraut.**Pedicularis, XIV. Läusekraut.***P. tuberosa* L., dickwurzeliges Läusekraut.**Phaca, XVII. Berglinse.***Ph. astragalina* De C. (*Astragalus alpinus* L.), Alpen-Wirbelkraut. (Auf Triften).**Oxytropis, XVII. Spitzfahne.***O. uralensis* De C. (*Astragalus uralensis* L.), uralisches Wirbelkraut. (An sandigen Plätzen.)**Erigeron, XIX. Berufungskraut.***E. uniflorus* L., einblumiges B. (Auf Gerölle.)*Auf höhern Urgebirgsalpen.***Stellaria, X. Sternkraut.***St. cerastoides* L., hornkrautartiges Sternkraut. (An feuchten Orten.)**Arenaria, X. Sandkraut.***A. multicaulis* Wulff., vielstieliges Sandkr. (An Felsen und Gerölle.)*Auf höhern Urgebirgsalpenwiesen.***Phyteuma, V. Rapunzel.***Ph. hemisphaericum* L., halbkugelköpfige R.

Auf höhern Urgebirgsalpenwiesen.

Hieracium, XIX. Habichtskraut.

H. alpinum L., Alpen-Habichtskraut.

H. Halleri Vill., Haller's Habichtskraut.

H. intybaceum Jacq., cichorienartiges *H.*

H. Schraderi De C., Schrader's Habichtskraut.

Artemisia, XIX. Beifuss.

A. Mutellina L., kleiner Beifuss.

Auf den höchsten Urgebirgsalpen.

Eritrichium, V. Himmelsherold.

E. nanum Schrad. (*Myosotis nana Vill.*), Zwerg-Vergissmeinnicht.

Phyteuma (s. oben) globulariaefolium Sternb. Hpp.,
kugelblumblättrige Rapunzel.

Pachypleurum, V. Dicksaumdolde.

P. simplex (*Laserpitium simplex L.*), einfaches
Laserkraut.

Arenaria (s. oben) biflora L., zweiblumiges Sandkrt.

Potentilla frigida (s. oben).

P. nitida L., mattglänzendes Fingerkraut.

Senecio, XIX. Kreuzkraut.

S. incanus L., weissfilziges Kreuzkraut.

Achillea, XIX. Garbe.

A. moschata L., Bisam-Schafgarbe.

b) In Urvoralpen an Quellen, Bergströmen.

Adenostyles, XIX. Drüsengriffel.

A. albifrons (*Cacalia albifrons L.*), geöhrte
Pestwurz.

(*Primula glutinosa*, *Potentilla salisburgensis* s. May S.
326 und alle im Jun S. 518 — 520 aufgezeichneten Pflanzen.)

106) *Verwildert.*

(Vergleiche *Angebaut.*)

Borrago, V. Borretsch.

B. officinalis L., gemeiner Borretsch.

Verwildert.

Nicandra, V. Giftbeere.

N. physaloides Gaertn. (*Atropa physaloides Jacq.*),
schlottenartige Giftbeere.

Portulaca, XI. Portulak.

P. oleracea L., gemeiner Portulak.

Elsholzia, XIV. Elsholzie.

E. cristata W., hahnenkammförmige Elsholzie.

Antirrhinum, XIV. Löwenmaul.

A. Asarina L., gundermannblättriges L.

Malva, XVII. Malve, Käspappel.

M. mauritiana L., mauritanisches Pappelkraut.

Silybum, XIX. Mariendistel.

S. marianum Gaertn. (*Carduus marianus L.*),
gefleckte Mariendistel, Stechkörnerdistel.

Wiborgia, XIX. Wiborgie.

W. parviflora K. H. B., kleinblumige Wiborgie.

Echinops sphaerocephalus (s. an steinigen Orten).

107) Auf und in Voralpen.

Calamagrostis, III. Reithgras.

C. montana Host. (*Arundo montana Gaud.*),
Berg-Ranunkel.

Festuca III. Schwingel.

F. rubra L., rother Schwingel.

Avena, III. Hafer.

A. argentea W., fächerblättriger Hafer.

Scabiosa, IV. Scabiose.

Sc. longifolia W. Kit., langblättrige Scabiose.

Asperula, IV. Waldmeister.

A. longiflora W. Kit., langblumiger Waldmeister.

Laserpitium Siler (s. an sonnigen Kalkhügeln).

Allium VI. Lauch.

A. ochroleucum W. Kit., weissgelber Lauch.

A. Victorialis L., Allermannsharnisch.

Auf und in Voralpen.

Sabulina, X. Sändling.

S. macrocarpa (*Arenaria macrocarpa* *Kit.*), grossfruchtiges Sandkraut.

Cerastium, X. Hornkraut.

C. ciliatum *W. Kit.*, wimperblättriges H.

Aconitum, XIII. Eisenhut.

A. Bernhardianum *Rchb.*, Bernhardischer E.

A. Neubergense *Clus.*, neubergischer Eisenhut.

Aquilegia pyrenaica (siehe in Gebirgswäldern an Kalkfelsen).

Galeopsis, XIV. Hohlzahn.

G. versicolor *Curt.*, bunte Hanfnessel.

Linnaea borealis (s. in Fichtenwäldern).

Geracium succisaefolium (s. in Gebirgsgegenden auf Wiesen).

Hieracium, XIX. Habichtskraut.

H. flexuosum *W. Kit.*, bogiges Habichtskraut.

Carduus Personata (s. an Bächen in Gebüsch).

Cirsium heterophyllum (s. in Bergwäld. auf Wiesen).

Doronicum, XIX. Gemswurz.

D. austriacum *W.* (*Doronicum Pardalianches* *α. Linn.*), österreichische Gemswurz.

Salix, XXII. Weide.

S. herbacea *L.*, krautartige Weide.

a) *In Voralpen an Bächen.*

Epilobium, VIII. Schotenweiderich.

E. organifolium *L.*, dostenblättr. Weidenröslein.

Gypsophila repens (s. auf Hochgebirge).

b) *In Voralpen an dürrer, sonnigen Orten.*

Dianthus, X. Nelke.

D. Scheuchzeri *Rchb.*, Scheuchzer's Nelke.

c) *Auf Voralpen an Felsen.*

Athamanta cretensis (s. auf Kalkalpen).

*Auf Voralpen an Felsen.***Libanotis, V.** Heilwurz.**L. gracilis Rchb.**, schlanke Heilwurz.**Silene, X.** Leimkraut.**S. quadrifida L.**, vierspaltiges Leimkraut. (An feuchten Orten).**Leontodon, XIX.** Löwenzahn.**L. hyoseroides Welw.**, schweinsalatartiger L.*An Felsen zwischen Gebüsch.***Sonchus alpinus** (s. in Gebirgswäldern).*An nackten Felsen.***Saxifraga bryoides** (s. auf Urgebirgsalpen).*An felsigen, sonnigen Orten.***Sabulina, X.** Sändling.**S. striata (Arenaria str. L.)**, gestreiftes Sandkraut.*In Voralpen an felsigen und steinigen Orten.***Rhodiola, XXII.** Rosenwurz.**Rh. rosea L.**, gemeine Rosenwurz.*d) In Voralpen an feuchten Stellen.***Veratrum, VI. (XXIII.)** Germer.**V. nigrum L.**, schwarzer Germer.**Epilobium** (s. oben) alpestre **Jacq.**, Voralpen-Weidenröslein.**Saxifraga, X.** Steinbrech.**S. aizoides L.**, immergrüner Steinbrech.**S. bryoides L.**, Var. β . **laxa (Saxifraga aspera L.)**, scharfer Steinbrech.**Silene quadrifida** (s. oben unter c).**Cirsium, XIX.** Kratzdistel.**C. ambiguum All.****Senecio, XIX.** Kreuzkraut.**S. lyratifolius Rchb.** (**Cineraria alpina β . Linn.**), leierblättriges Kreuzkraut.

e) *In Voralpen auf Gerölle.*

Saxifraga Aizoides (s. unter d).

Gypsophila repens (s. auf Hochgebirge).

f) *In Voralpen an Quellen.*

Epilobium organifolium (s. unter d).

Saxifraga Aizoides (s. unter d).

An quelligen Orten.

Pleurospermum, X. Rippnüsschen.

Pl. austriacum Hoffm. (*Ligusticum austriacum L.*),
österreichischer Liebstöckel.

g) *In Voralpen an sonnigen, dürren Orten* (s. b).

An sonnigen, felsigen Orten (s. unter c).

h) *In Voralpen an steinigen Orten.*

Rumex, VI. Ampfer.

R. arifolius All. (*Rumex Acetosa* δ . *Linn.*), aron-
blätteriger Ampfer.

Homogyne alpina (s. in höhern Gebirgen an stei-
nigen Orten).

Rhodiola rosea (s. oben unter c).

i) *In Voralpen an Strömen.*

Gypsophila repens (s. auf Hochgebirge).

k) *In Voralpenthälern.*

Aconitum multifidum (s. in Gebirgsthälern).

Anemone, XIII. Windblume.

A. narcissiflora L., narcissenblüthige W. (An
feuchten, steinigen Orten).

Linaria, XIV. Maulblume.

L. angustifolia De C. (*Antirrhinum angustissimum*
Lois.), schmalblättriges Löwenmaul.

l) *In Voralpen auf Triften.*

Gentiana, V. Enzian.

G. lutea L., gelber, grosser Enzian.

In Voralpen auf Triften.

Meum athamanticum (s. in Gebirgen auf Triften).

Orchis speciosa (s. ebendasselbst).

Auf feuchten Voralpen-Triften.

Gentiana (s. oben) **punctata L.**, punctirter Enzian.

m) *In Voralpengegenden an Waldrändern.*

Senecio lyratifolius (s. unter d).

In Voralpenwäldern.

Adenophora, V. Becherglocke.

A. suaveolens Fisch. (*Campanula suaveolens Schrad.*), wohlriechende Glockenblume.

Cimicifuga, XIII. Wanzenkraut.

C. foetida L., stinkendes Wanzenkraut.

n) *Auf Voralpenwiesen.*

Veronica spicata (s. in Gebirgen auf Wiesen).

Asterocephalus, IV. Kronen-Scabiose.

A. lucidus (*Scabiosa lucida Vill.*), glänzende Scabiose.

Myosotis, V. Vergissmeinnicht.

M. suaveolens Kit., wohlriechendes Vergissm.

Pedicularis, XIV. Läusekraut.

P. foliosa L., beblättertes Läusekraut.

Sonchus alpinus (s. in Gebirgswäldern).

Crepis, XIX. Pippau.

Cr. grandiflora W., grossblumiger Pippau. (Im Urgebirge).

Picris umbellata (s. auf Bergwiesen).

Hypochaeris, XIX. Ferkelkraut.

H. helvetica Jacq., schweizerisches Ferkelkraut.

Cirsium, XIX. Kratzdistel.

C. Erisithales Scop. (*Carduus Erisithales Jacq.*), klebrige Kratzdistel.

Auf Voralpenwiesen.

Gnaphalium, XIX. Ruhrkraut.

Gn. fuscum Scop., braunes Ruhrkraut.

Senecio, XIX. Kreuzkraut.

S. alpinus Scop. (Cineraria alpina α . L. Cineraria cordifolia Linn. suppl.), Alpen-Kreuzkraut.

S. Doronicum L.), Gebirgs-Kreuzkraut.

(Bunium Bulbocastanum, Arabis alpina, Achillea tomentosa, Buphthalmum salicifolium, Arctostaphylos Uva ursi, Cardamine hirsuta, Scrofularia glandulosa, Habenaria albidula, Primula farinosa, Corydalis capnoides, Cardamine trifolia s. May S. 327 ff. und vom Jun S. 520 ff.: Veronica officinalis bis Campanula pulla, Ligusticum Seguieri bis Gentiana utriculosa.)

108) *In Vorhölzern.*

Geranium, XVI. Storchschnabel.

G. bohemicum L., böhmischer Storchschnabel.

Althaea, XVI. Eibisch.

A. cannabina L., hanfblättriger Eibisch.

(Cytisus hirsutus s. May S. 331. — Melica ciliata, Elymus europaeus, Brachypodium gracile, Pyrola rotundifolia, Trifolium agrarium s. Jun S. 526 f.)

109) *An und in Wäldern und waldigen Orten.**A. An Waldrändern.*

Verbascum, V. Wollkraut.

V. speciosum Schrad., prächtige Königskerze.

Campanula, V. Glockenblume.

C. Hostii Baumg., Hostische Glockenblume.

Pteroselinum anstriacum (s. an felsigen Orten).

Siler aquilegifolium (s. an Hügeln.)

Sambucus Ebulus (s. auf feuchten, thonigen Aeck.)

Scorodonia, XIV. Scorodonie.

Sc. heteromalla Mnch. (Teucrium Scorodonia L.), salbeyblättriger Gamander.

An Waldrändern.

Galeopsis, XIV. Hohlzahn.

G. versicolor Curt., bunte Hanfnessel.

Stachys recta (s. an Ackerrändern).

Thymus, Chamaedrys (s. auf Bergen).

Odontites lutea (s. an grasigen Hügeln).

Lavatera, XVI. Lavatere.

L. thuringiaca L., thüringische Lavatere, ungarischer Eibisch.

Medicago media (s. an Ackerrändern).

Hieracium laevigatum (s. an bewachsenen Felsen).

Serratula tinctoria L. δ . dissecta (s. in Obstgärten).

Senecio Jacobaea (s. an Feldrainen).

a) *An Waldrändern in Gebüsch.*

Codonoprasum oleraceum (s. an Aeckern).

Rubus Sprengelii (s. in Gebüsch).

b) *An Wäldern der Voralpen.*

Senecio lyratifolius (s. Voralpen).

c) *An Wäldern auf Wiesen und Triften.*

Pedicularis, XIV. Läusekraut.

P. silvatica L., Wald-Läusekraut.

B. *In Wäldern.*

Festuca rubra (s. auf Alpen).

Heracleum, V. Bärenklau.

H. angustifolium L., schmalblättrige Bärenklau.

Armeria, V. Grasnelke.

A. plantaginea W. (Statice plantaginea All.), wegerichartige Grasnelke.

Polygonum laxiflorum (s. an feuchten Orten).

Tilia parviflora (s. um Dörfer).

Clematis Flammula (s. an steinigen Orten).

Euphrasia, XIV. Augentrost.

E. nemorosa Pers., Wald-Augentrost.

In Wäldern.

Melampyrum, XIV. Wachtelweizen.

M. nemorosum L., Hain-Wachtelweizen.

M. pratense L., Wiesen-Wachtelweizen.

Cytisus austriacus (s. an Kalkhügeln).

Hypericum quadrangulum (s. am Fusse von Bergen an feuchten Orten).

H. tetrapterum (s. an Bächen).

Lactuca, XIX. Salat.

L. augustana All., aostanischer Salat.

L. quercina L., eichblättriger Salat.

L. sagittata W. Kit., pfeilblättriger Salat.

Picris hieracioides (s. an Feldrainen).

Cirsium, XIX. Kratzdistel.

C. nemorale Rchb., Wald-Kratzdistel.

Inula, XIX. Alant.

I. montana L., Berg-Alant.

a) *In Wäldern höherer Berge.*

Melampyrum (s. ob.) **silvaticum L.**, Wald-Wachtelweizen.

b) *In Wäldern an feuchten Orten.*

Epilobium montanum (s. in Berggegenden zwischen Gebüsch).

Cucubalus baccifer (s. an feuchten Orten).

c) *In Wäldern auf begrasten Plätzen.*

Jasione montana (s. in Sandgegenden).

d) *In Wäldern auf lichten Plätzen.*

Galeopsis versicolor (s. oben unter A.).

e) *In Wäldern an lichten, steinigen Plätzen.*

Cynanchum, V. Hundswürger.

C. Vincetoxicum P. (Asclepias Vincetoxicum L.),
gemeine Schwalbenwurz.

f) *In Wäldern an sumpfigen Orten.*

Veronica scutellata (s. in Gräben).

g) *In Wäldern auf feuchten Torfwiesen.*

Cirsium semidecurrens (s. Torfwiesen).

h) *In Voralpenwäldern (s. Voralpen).*

i) *In bergigen, sandigen Wäldern auf lichten Plätzen.*

Epilobium angustifolium (s. an Flüssen).

k) *In schattigen Wäldern.*

Polygonum Hydropiper (s. an feuchten Orten).

Melittis, XIV. Immenblatt.

M. grandiflora Sm., grossblumiges Immenblatt.

M. Melissophyllum L., melissenblättriges I.

Lappa major (s. in Gebüsch).

In schattigen Wäldern in Berggegenden an Bächen, Gräben, Quellen.

Impatiens Noli tangere (s. in Berggegenden).

l) *In trocknen Wäldern.*

Clinopodium vulgare (s. an sonnigen Anhöhen).

C. *An waldigen Orten.*

a) *Auf Waldblößen.*

Calamagrostis, III. Reithgras.

C. pulchella Saut. (In Alpengegenden.)

b) *Auf Waldgebirgswiesen.*

Achillea, XIX. Garbe.

A. Seidlii Prsl., Seidlische Schafgarbe.

c) *Zwischen Waldgebüsch.*

Carduus crispus β . *integrifolius* (s. an Bächen).

Inula hirta (s. auf Kalkboden).

Humulus Lupulus (s. an Flüssen).

In feuchtem Waldgebüsch.

Scutellaria, XIV. Helmkraut.

Sc. hastifolia L., spontonblättriges Helmkraut.

d) In Waldgegenden.

Aconitum neubergense (s. auf Alpen).

In sandigen Waldgegenden.

Gnaphalium, XIX. Ruhrkraut.

Gn. silvaticum L., Wald-Ruhrkraut.

e) An Waldhügeln.

Phyteuma, V. Rapunzel.

Ph. canescens W. Kit., grauliche Rapunzel.

An sonnigen Waldhügeln.

Veronica orchidea (s. auf Kalkboden).

Auf trocknen Waldhügeln.

Jurinea mollis (s. an Kalkfelsen).

f) An feuchten Waldplätzen.

Dipsacus pilosus (s. in Gräben).

g) An Waldsümpfen.

Molinia, III. Steifhalm.

*M. litoralis Host. (Melica coerulea major Rth.),
grosses, blaues Perlgras.*

h) In Waldungen.

Angelica, V. Angelica.

A. silvestris L., Wald-Angelica.

Mentha viridis (s. an Bächen).

In Waldungen an Bächen, Gräben und Sümpfen.

Eupatorium cannabinum (s. an Bächen).

In Waldungen an feuchten Orten.

Lotus uliginosus (s. an feuchten Orten).

In schattigen Waldungen.

Rumex nemorosus (s. um Dörfer).

i) *Auf Waldwiesen.*

Campanula, V. Glockenblume.

C. lanceolata Prsl., lanzettblättrige Glockenbl.

Thesium pratense (s. auf Bergwiesen.)

Thysselinum, V. Thysselin.

Th. palustre Hoffm. (*Selinum palustre Sm.*),
Sumpf-Thysselin.

Th. silvestre Rchb. (*Selinum silvestre L.*), Wald-
Silge.

Betonica hirta (s. auf Bergwiesen).

Calamintha officinalis (s. in Gebirgen).

Centaurea, XIX. Flockenblume.

C. austriaca W., österreichische Flockenblume.

C. nigra L., schwarze Flockenblume.

Auf feuchten Waldwiesen.

Cnidium, V. Brenndolde.

Cn. palustre (*Selinum palustre L.*), Sumpf-Br.
Sumpf-Silge.

Dianthus superbus (s. zwischen Gebüsch.)

Trifolium hybridum (s. in Sümpfen).

(*Rhamnus catharticus*, *Dianthus Armeria*, *D. atrorubens*, *Euphorbia salicifolia*, *Festuca duriuscula*, *Scabiosa arvensis*, *Ranunculus polyanthemus*, *Evonymus verrucosus*, *Larbraea uliginosa*, *Valeriana tripteris*, *Veronica urticaefolia*, *Arenaria trinervia*, *Arabis nemorensis*, *Veronica officinalis*, *Galium silvestre*, *Orobanche Rapum*, *Geranium pyrenaicum*, *Lychnis Viscaria*, *Trifolium montanum*, *Colutea arborescens*, *Ophrys apifera*, *Stellaria glauca*, *Tormentilla erecta*, *Ornithopus perpusillus*, *Trifolium rubens* s. May S. 332 ff. und der grösste Theil der im Jun S. 527 ff. bemerkten Pflanzen, nämlich: *Veronica latifolia* bis *Lychnis dioica*, *Rosa inodora*, *R. micrantha*, *R. rubiginosa*, *Rubus caesius*, *Carduus nutans* bis *Myrtus communis*, *Rubus corylifolius* bis *Prunella vulgaris*, *Lactuca stricta* bis *Pyrethrum corymbosum*, *Geum urbanum* bis *Geranium sanguineum*, *Rubus candicans* bis *Vicia pisiformis*, *Vicia silvatica* bis *Peucedanum officinale*.)

110) *An Wällen.*

Solanum miniatum (s. auf Schutt).

Linum austriacum (s. an Hügeln).

Marrubium creticum (s. ebendasselbst).

Ononis spinosa (s. an sandigen Feldrainen).

Melilotus alba (s. auf bebautem Boden).

(*Erysimum diffusum* s. May S. 345. — *Cardaria Draba* s. Jun S. 539.)

111) *An und in Wasser.*a) *An stehendem Wasser.*

Alisma VI. Froschlöffel.

A. Plantago L., gemeiner Froschlöffel, Wasser-Wegerich.

b) *An Wassergräben.*

Apium graveolens (s. an Bächen).

Mentha, XIV. Minze, Münze.

M. pubescens W., feinhaarige Minze.

M. undulata W., wellenblättrige Minze.

c) *An wasserreichen Orten.*

Picreus Monti (s. an überschwemmten Plätzen).

d) *In Wasser.*

Potamogeton, IV. Laichkraut.

P. plantagineus du Croz., wegerichblättriges L. oder Saamkraut.

P. praelongus Wulff., langes L. oder Saamkraut.

Zannichellia, XXI. Zannichellie.

Z. pedunculata Rchb., blüthenstielige Z.

e) *Auf ausgetretenem Wasser.*

Elatine hexandra (s. an Flussufern).

f) *In klarem Wasser.*

Chara fragilis (s. in Teichen).

g) *In langsam fliessenden Wassern.*

Villarsia Nymphoides (s. in Seen).

h) *In langsam fliessenden oder stehenden Wassern.*

Najas XXII. Najade.

N. minor *Rth.*, kleine Najade.

i) *In stehendem Wasser.*

Potamogeton (s. oben) *densus L.*, dichtblättriges Saamkraut.

P. *natans L.*, gemeines Saamkraut.

Zannichellia (s. oben) *repens Bnng.*, kriechende Zannichellie.

Auf stehendem Wasser schwimmend.

Hydrocharis, XXII. Froschbiss.

H. *Morsus ranae L.*, gemeiner Froschbiss.

Stratiotes, XXII. Wasserscheer.

Str. *Aloides L.*, gemeiner W., Wasseraloe.

k) *In Wasserbächen.*

Mentha (s. oben) *aquatica L.*, Wasser-Münze.

M. *crispata Schrad.*, gekrauste Münze.

(*Larbraea uliginosa*, *Lemna trisulca* s. May S. 346 und fast alle im Jun S. 539 f. angegebenen Pflanzen, nämlich: *Oenanthe silaifolia* bis *Sagittaria sagittaeifolia*, *Ranunculus tripartitus* bis *Myriophyllum spicatum*.)

112) *An Wegen.*

Salvia nemorosa (s. an Hügeln).

Andropogon Ischaemum (s. an Feldrainen).

Diplachne serotina (s. auf rauhen Anhöhen).

Setaria glauca (s. auf Aeckern).

Lolium, III. Lolch.

L. *perenne L.*, ausdauernder Lolch.

Dipsacus ferox (s. an Gräben).

Succisa transylvanica (s. auf Aeckern).

Atriplex tatarica (s. an trocknen Feldrändern).

An Wegen.

- Eryngium amethystinum* (s. an dürrer Orten).
Sambucus Ebulus (s. auf feuchten, thonigen Aeck.).
Linum austriacum (s. an Hügeln.)
Silene Otites (s. an Bergabhängen).
Euphorbia platyphyllos (s. auf bebaudem Boden).
Potentilla reptans (s. an Gräben).
Chaiturus Marrubiastrum (s. auf Schutt).
Galeopsis acuminata (s. an Ackerrändern).
 G. bifida (s. ebendasselbst).
 G. pubescens (s. an Mauern).
 G. Tetrahit s. auf bebaudem Boden).
Marrubium creticum (s. auf Schutt).
 M. pannonicum (s. ebendasselbst).
 M. peregrinum (s. an sonnigen, steinigen Plätzen).
Mentha undulata (s. an Wassergräben).
Lepidium Iberis (s. auf Schutt).
Lavatera thuringiaca (s. an Waldrändern).
Malva, XVI. Malve, Käspappel.
 M. Alcea L., Rosenpappel.
 M. nicaeensis All., nicäensische Malve.
 M. vulgaris Trag., gemeine Malve.
Ononis hircina (s. auf Triften).
 O. Natrix (s. an Flüssen).
Crepis pulchra (s. auf Schutt).
 Cr. virens (s. an Feldrainen).
Chondrilla juncea (s. an Mauern).
Lactuca Scariola (s. ebendasselbst).
Thrincia Leysseri (s. auf dürrer Triften).
Cichorium, XIX. Cichorie.
 C. Intybus L., gemeine Cichorie, Wegwarte.
Scolymus, XIX. Golddistel.
 Sc. hispanicus L., spanische Golddistel.
 Sc. maculatus L., gefleckte Golddistel.
Onopordon Acanthium (s. auf Schutt).

An Wegen.

Centrophyllum lanatum (s. an durren Plätzen).

Lappa, XIX. Klette.

L. minor De C. (*Arctium Lappa* α . *Linn.*), kleine Kl.
Carduus, XIX. Distel.

C. acanthoides L., krebsdistelartige Distel.

C. crispus L., krause D. Var. α . *pinnatifidus*.

C. tenuiflorus Sm., dünnblumige Distel.

Cirsium lanceolatum (s. auf Schutt).

Carpesium cernuum (s. an feuchten Plätzen).

Cotula coronopifolia (s. an Gräben).

Senecio Doria (s. auf feuchten Bergwiesen).

Anthemis Cotula (s. um Dörfer).

Centaurea, XIX. Flockenblume.

C. nigrescens W., schwärzliche Flockenblume.

Xanthium spinosum (s. auf Schutt).

(*Veronica prostrata*, *V. serpyllifolia*, *Alopecurus creticus*, *Triticum villosum*, *Agropyrum cristatum*, *Scabiosa arvensis*, *Campanula rotundifolia*, *Polygonum aviculare*, *Cerastium triviale*, *Reseda lutea*, *Euphorbia salicifolia*, *Potentilla Anserina*, *Berteroa incana*, *Capsella Bursa pastoris*, *Isatis tinctoria*, *Sisymbrium officinale*, *Erodium malacoides*, *Cytisus austriacus*, *C. leucanthus*, *Medicago lupulina*, *Taraxacum officinale*, *Scorzonera laciniata* s. May S. 346 ff. und vom Jun S. 541 *Salvia verticillata* bis *Hordeum pratense*, *Agropyrum glaucum* bis *Glaucium rubrum*, *Prunella vulgaris*, *Rapistrum perenne*, *Diploxaxis tenuifolia* bis *Urtica dioica*.)

113) *Auf Weideplätzen.*

(*Ranunculus Thora* s. May S. 351. — *Juncus compressus*, *Cirsium acaule* s. Jun S. 544.)

114) *In Weidengebüsch.*

Cuscuta, IV. Flachsseide.

C. monogyna Vahl., einweibige Flachsseide.

Euphorbia lucida (s. auf Sumpfwiesen).

115) *An Weihern (s. an Teichen).*

116) *An und in Weinbergen.*

Salvia silvestris (s. an Ackerrändern).

Digitaria sanguinalis (s. auf Ackerrändern).

Setaria verticillata (s. ebendasselbst).

Succisa transylvanica (s. ebend.).

Bupleurum, V. Hasenohr.

B. *Gerardi Jacq.*, Gerards-Hasenohr.

Codonoprasum carinatum (s. an Aeckern).

Scilla autumnalis (s. auf bebautem Boden).

Euphorbia falcata (s. auf Aeckern).

Nigella, XIII. Schwarzkümmel.

N. *damascena L.*, Garten-Schwarzkümmel.

Lavatera thuringiaca (s. an Waldrändern).

Malva Alcea (s. in Gebüsch).

M. *italica* (s. an steinigen Orten in Weinbergen).

Lactuca saligna (s. auf bebautem Boden).

Serratula tinctoria δ . *dissecta* (s. in Obstgärten).

Centrophyllum lanatum (s. an dürren Plätzen).

Centaurea Scabiosa (s. auf Aeckern).

(*Alopecurus creticus*, *Trinia pumila*, *Dianthus Armeria*, *Euphorbia salicifolia*, *Bunias Erucago*, *Fumaria parviflora*, *Cytisus leucanthus*, *Astragalus Cicer*, *A. exscapus*, *Hypericum elegans*, *Tragopogon major* s. May S. 352 und vom Jun S. 544 *Jasminum officinale* bis *Galium saccharatum*, *Verbascum Blattaria* bis *Phlomis tuberosa*, *Abutilon Avicennae* bis *Melilotus Petitpierreana*.)

117) *Auf Wiesen.*

Veronica scutellata (s. in Gräben.)

Festuca rubra (s. auf Alpen).

Bromus erectus (s. auf Grasplätzen).

Campanula, V. Glockenblume.

C. *Baumgartenii Beck.*, Baumgartens-Gl.

Pastinaca sativa (s. an Ackerrändern).

Heracleum Sphondylium (s. in Gebüsch).

Auf Wiesen.

Cnidium Monnieri (s. auf Grasplätzen).

Angelica silvestris (s. in Waldungen).

Euphrasia, XIV. Augentrost.

E. pratensis Scheuchz., Wiesen-Augentrost.

Oxytropis montana (s. in Bergwaldungen).

Serratula, XIX. Scharte.

S. tinctoria L., Färber-Scharte.

Senecio Jacobaea (s. an Feldrainen).

Centaurea, XIX. Flockenblume.

C. decipiens Thuill., trügerische Flockenblume.

C. nigrescens W., schwärzliche Flockenblume.

C. pratensis Thuill., Wiesen-Flockenblume.

Chrysocoma Linosyris (s. an Felsen).

a) *Auf Wiesen der Alpen* (s. unter Alpen).

b) *Auf Wiesen in Bergwäldern.*

Cirsium heterophyllum (s. in Bergwäldern).

c) *Auf Wiesen in Gebirgen.*

Veronica spicata (s. Gebirge).

Geracium succisaefolium (s. in Gebirgsgegenden).

Leontodon pratensis (s. ebendasselbst).

Achillea lanata (s. in Gebüsch in Gebirgsgegenden).

d) *Auf Wiesen am Seestrande.*

Atriplex, V. (XXIII.) Melde.

A. hastata L., spontonblättrige Melde.

Aster Tripolium (s. auf Salzboden).

e) *Auf Wiesen der Voralpen* (siehe Voralpen).

f) *Auf Wiesen der Wälder.*

Pedicularis, XIV. Läusekraut.

P. silvatica L., Wald-Läusekraut.

g) *Auf fetten Wiesen.*

Selinum, V. Silge.

S. Carvifolia L., kümmelblättrige Silge.

h) *Auf feuchten Wiesen.*

Veronica, II. Ehrenpreis.

V. media *Schrad.*, mittlerer Ehrenpreis.

Molinia, III. Steifhalm.

M. coerulea *Mnch.* (*Melica coerulea L.*), blaues
Perlgras.

Succisa pratensis (s. in Torfboden).

Lysimachia punctata (s. an Sümpfen).

Erythraea pulchella (s. auf Salzboden).

Gentiana Pneumonanthe (s. auf Moorboden).

Epilobium palustre (s. in Gräben).

Trifolium, XVII. Klee.

Tr. expansum *W. Kit.*, ausgebreiteter Klee.

Tr. pannonicum *L.*, ungarischer Klee.

Cirsium, XIX. Kratzdistel.

C. canum *M.* (*Cardus canus L.*), graues
Kratzkraut.

C. hybridum *Koch.*, Bastard-Kratzdistel.

C. inermis *Hall.*, wehrlose Kratzdistel.

C. rigens *Ait.*, steife Kratzdistel.

C. tuberosum *All.* (*Cardus tuberosus L.*).

Senecio, XIX. Kreuzkraut.

S. barbareaefolius *Krock.*, barbenkrautblättriges
Kreuzkraut.

Achillea, XIX. Garbe.

A. Ptarmica *L.*, Sumpf-Garbe.

Spiranthes aestivalis (s. auf feuchten Triften).

Auf feuchten Wiesen in Sandgegenden.

Scirpus radicans (s. in Sandgegenden).

i) *Auf höhern Wiesen der Gebirge.*

Pedicularis, XIV. Läusekraut.

P. sudetica *W.* Riesengebirgs-Läusekraut.

k) *Auf höhern Wiesen der Urgebirgsalpen.*

Erigeron uniflorus (s. Urgebirgsalpen).

l) *Auf nassen Wiesen.*

Isolepis setacea (s. auf Teichrändern).

Auf nassen Wiesen in Gebirgsgegenden.

Cineraria, XIX. Aschenpflanze.

C. aurantiaca Hpp., pomeranzenfarbige A.

m) *Auf sandigen, steinigen, trocknen Wiesen.*

Prunella grandiflora (s. an Kalkfelsen).

n) *Auf sonnigen, trocknen Wiesen.*

Gentiana Crucjata (s. an sonnigen, trocknen Hügeln).

o) *Auf steinigen Wiesen.*

Ferula, V. Steckenkraut.

F. Ferulago L., sicilisches Steckenkraut.

F. sulcata Desf., gefurchtes Steckenkraut.

Centaurea, XIX. Flockenblume.

C. adonidifolia Rchb., feuerroschenblättrige Gl.

p) *Auf trocknen Wiesen.*

Asterocephalus agrestis (s. auf Feldrainen).

Medicago procumbens (s. auf trocknen Hügeln).

Auf trocknen Wiesen an niedrigen Kräutern.

Cuscuta, IV. Flachsseide.

C. Epithymum Sm., Thymseide.

q) *An Wiesenrändern.*

Odontites lutea (s. an grasigen Hügeln).

Melilotus officinalis (s. an Sümpfen).

Crepis virens (s. an Feldrainen).

Picris hieracioides (s. ebend.).

Lappa tomentosa (s. ebend.).

(*Veronica Chamaedrys, V. serpyllifolia, Iris sibirica. Festuca duriuscula, F. pratensis, Arrhenatherum avenaceum, Galium Mollugo, Alchimilla vulgaris, Stellaria graminea, Larbrea uliginosa, Alectorolophus minor, Lathyrus sepium, Vicia onobrychioides, V. pannonica, V. sepium, V. sordida, Trifolium pratense, Tragopogon pratensis, Chrysanthemum*

Auf Wiesen.

Leucanthemum, Lolium festucaceum, Tormentilla erecta, Carex Oederi, Viola rothomagensis, Nasturtium officinale, Euphorbia Esula s. May S. 355 ff. und vom Jun S. 546 ff. Veronica latifolia, V. maritima, Phleum pratense bis Sanguisorba officinalis, Verbascum mixtum bis Linum catharticum, Rumex pratensis bis Vicia grandiflora, Oxytropis montana, Trifolium procumbens, Crepis lodomeriensis bis Orchis ustulata, Vigna Bönninghausenia, Althaea officinalis, Viola palustris, Calamagrostis stricta bis Silene viscosa, Festuca vaginata, Milium multiflorum bis Orobus palustris, Avena flavescens, Galium verum, Orobanche adenostemon, O. caryophyllacea, O. galii, O. strobiligena, Polygala comosa bis Lathyrus tuberosus.)

118) *Auf wüsten Plätzen.*

Atriplex angustifolia (s. auf bebautem Boden).

Polygonum Convolvulus (s. auf Aeckern).

Phoenixopus vimineus (s. an Mauern).

Lactuca saligna (s. an bebauten Plätzen).

Lappa minor (s. an Wegen).

Carduus acanthoides (s. ebendasselbst).

C. polyacanthus (s. auf Schutt).

Cirsium lanceolatum (s. ebend.).

Artemisia Absinthium (s. an Mauern).

Artemisia vulgaris (s. ebendasselbst).

(Hyoscyamus niger, Ornithopus perpusillus (s. May S. 364. und die im Jun. S. 556. angegebenen Pflanzen).

119) *An Zäunen.*

Cuscuta monogyna (s. schmarotzend).

Convolvulus sepium (s. an feuchten Orten).

Chenopodium urbicum (s. an Häusern).

Atriplex alba (s. an Mauern).

A. angustifolia (s. auf bebautem Boden).

A. nitens (s. an Ackerrändern).

A. patula (s. auf bebautem Boden).

*An Zäunen.***Bupleurum Gerardi** (s. an Weinbergen.)**Torilis infesta** (s. in Gebüsch).**Polygonum dumetorum** (s. in Gebüsch).**P. tataricum** (s. auf Aeckern).**Saponaria officinalis** (s. auf bebautem Boden).**Rubus Sprengelii** (s. in Gebüsch an Wäldern und Zäunen).**Clematis Vitalba** (s. in Gebüsch).**Leonurus Cardiaca** (s. an Mauern).**Galeopsis bifida** (s. an Ackerrändern).**Ballota nigra** (s. an Mauern).**Verbena officinalis** (s. in Gräben).**Vitex XIV.** Müllen.**V. Agnus castus** L. gemeine Müllen.**Malva Alcea** (s. in Gebüsch).**M. vulgaris** (s. auf Schutt).**Lappa major** (s. in Gebüsch).

(*Veronica Chamaedrys*, *V. prostrata*, *Festuca duriuscula*, *Arrhenatherum avenaceum*, *Triticum villosum*, *Stellaria graminea*, *Chelidonium majus*, *Clematis Viticella*, *Lepidium ruderales*, *Geranium pusillum*, *G. pyrenaicum*, *Lathyrus sepium*, *Tamus communis* s. May S. 365. ff. und vom Jun. S. 556. ff. *Melica ciliata* bis *Scabiosa hybrida*, *Rubia tinctorum* bis *Agrimonia Eupatorium*, *Rosa rubiginosa*, *R. sempervirens*, *Rubus apiculatus* bis *Bryonia dioica*).

AUGUST.

1) An Abhängen.

Gentiana V. Enzian.

G. chloraefolia N. o. *E. chlorablätteriger*, bitterlingblätteriger *E.* (an grasigen Abhängen).

(*Chlora perfoliata* (s. Jun. S. 368. *Veronica fruticulosa*, *Cyperus longus*, *Gentiana ciliata* s. Jul. S. 559).

2) An Ackerrändern.

Kochia V. Kochie.

K. scoparia Schrad. (*Chenopodium Scoparia* L.) besenartiger Gänsefuss.

(*Reseda lutea*, *Sisymbrium officinale*, *Lotus corniculatus* s. May S. 157 f. *Agrostis stolonifera*, *Bromus sterilis*, *Lolium perenne*, *Eryngium campestre*, *Euphorbia nicaeensis*, *Coronilla varia* s. Jun. S. 368. ff. und alle im Jul S. 559 f. aufgeführten Pflanzen.

3) Auf Aeckern.

Valerianella olitoria (zweite Generation, die erste s. May S. 159.)

Papaver XIII. Mohn.

P. trilobum Wallr. dreilappiger M. (unter Sommergetreide.)

*Auf Aeckern.***Linaria XIV. Maulblume.**

L. commutata *Brnh.* verwechselte *M.*

L. spuria *Mill.* (*Antirrhinum spurium* *L.*) Bastard - Löwenmaul.

Bidens XIX. Zweizahn.

B. bipinnata *L.* doppeltgefiederter Zweizahn.

*Auf feuchten Aeckern.***Odontites XIV. Odontite.**

O. serotina *Rchb.* (*Euphrasia Odontites* $\beta.$ *L.*)
späte Odontite.

*Auf sandigen Aeckern.***Gypsophila X. Gypskraut.**

G. serotina *Hayne* spätes *G.*

(*Veronica arvensis*, *V. opaca*, *Alopecurus agrestis*, *Scabiosa arvensis*, *Sagina procumbens*, *Myosotis intermedia*, *M. versicolor*, *Anagallis arvensis*, *Stellaria media*, *Sinapis arvensis*, *Raphanistrum segetum*, *Erodium moschatum*, *Geranium rotundifolium*, *Fumaria parviflora*, *Medicago Gerardii*, *Matricaria Chamomilla*. *Bunium Bulbocastanum*, *Nasturtium palustre*, *N. silvestre*, *Erodium cicutarium* s. *May* S. 158 ff. *Eragrostis megastachya*, *Galium Aparine*, *G. saccharatum*, *G. tricorne*, *Alchimilla arvensis*, *Sagina ciliata*, *Coriandrum sativum*, *Tribulus terrestris*, *Saponaria Vaccaria*, *Spergula arvensis*, *Papaver Argemone*, *P. Rhoeas*, *Delphinium Ajacis*, *Adonis flammea*, *Phlomis tuberosa*, *Stachys palustris*, *Antirrhinum Orontium*, *Rapistrum perenne*, *Malva rotundifolia*, *Pisum arvense*, *Lathyrus hirsutus*, *Crepis tectorum*, *Anthemis arvensis*, *Calendula arvensis*. *Orobanche ramosa*, *Centunculus minimus*, *Sonchus arvensis*, *Chenopodium Botrys*, *Acinos thymoides*, *Echium italicum*, *E. vulgare*, *E. Wierzbickii* s. *Jun.* S. 370 ff. und vom *Jul* S. 560 ff. *Digitaria ciliaris* bis *Setaria verticillata*, *Plantago Psyllium* bis *Torilis helvetica*, *Porum rotundum* bis *Euphorbia falcata*, *Adonis autumnalis* bis *Melampyrum arvense*, *Vicia hirta*, *V. lutea*, *Trifolium arvense* bis *Spergella nodosa*, *Hypericum humifusum*, *Gypsophila muralis*.

4) Auf Alpen und in Alpengegenden.

(Vergl. Kalkalpen, Urgebirge, Voralpen).

A) Auf Alpen.

Galium IV. Labkraut.

G. trifidum L. dreispaltiges Labkraut.

Pleurospermum V. Rippnüsschen.

Pl. Golaka Rchb. (Athamanta Golaka Hacq.).

Aconitum XIII. Eisenhut.

A. variegatum L. bunter Eisenhut.

Oxytropis XVII. Spitzfahne.

O. sordida Dec. (Astragalus sordidus Willd.)
schmutziger Traganth.

Hieracium XIX. Habichtskraut.

H. furcatum Hoppe gabelförmiges H.

Leontodon XIX. Löwenzahn.

L. caucasicus Rchb. caucasischer L.

Carlina XIX. Eberwurz.

C. longifolia Rchb. langblättrige Eberwurz.

Aronicum XIX. Krebswurz.

A. Baubini Rchb. (Doronicum Baubini Saut.)
Bauhins-Krebskraut.

Achillea XIX. Garbe.

A. atrata L. schwarzkelchige Schaafgarbe

A. impunctata Vest. ungetüpfelte Schaafgarbe.

Carex XXI. Riedgras.

C. ustulata Wahlb. angebranntes Riedgras.

Kobresia XXI. Kobresie.

K. caricina Willd (Carex hybrida Schrnk.)
seggenartige Kobresie.

a) Auf Alpen an grasigen steinigen Orten.

Trifolium XVII. Klee.

Tr. cespitosum Reyn, Rasenklee.

b) *Auf Alpentriften.***Gentiana V. Enzian.**G. pannonica *Scrp.* ungarischer Enzian.c) *Auf Alpenwiesen.***Geracium XIX. Sperberkraut.**G. cydoniaefolium (*Hieracium cydoniaefolium* Will.) quittenblättriges Sperberkraut.**Hieracium** (s. o.) pilosellaeforme, *Hoppe*, mäuse-
öhrchenartiges Habichtskraut.**Chrysanthemum Leucanthemum** (s. M. auf Wiesen.)Valeriana montana, Galium silvestre, Alchimilla alpina, A. pubescens, Androsace Chamaejasme, Iuncus bufonius, Dryas octopetala, Pulsatilla alba, P. vernalis, Arabis ovi-
rensis, Salix retusa. Arabis alpina, Ranunculus alpestris. Pinguicula flavescens, Saxifraga stellaris. Veronica alpina, V. aphylla, Potentilla aurea, Sieversia montana s. May S. 165 ff.)

Poa nemoralis, Gentiana verna, Laserpitium peucedanoides, Iuncus alpinus, Toffieldia calyculata, Saxifraga Hostii, Dianthus silvestris, Silene inflata Var., Arenaria villosa, Potentilla affinis, Geranium argenteum, Centaurea variegata, Gentiana obtusifolia, Scorzonera rosea, Saxifraga caesia, Sabulina Gerardi, S. lanceolata, Ranunculus alpestris. Luzula spadicea, Anemone narcissiflora, Lloydia serotina, Festuca nigrescens, Androsace lactea, Vignea Grypos, Senecio alpinus, Valeriana tripteris, Homogyne alpina, Poa sudetica, Campanula Alpini, C. rhomboidalis, Luzula spadicea, Willemetia apargioides s. Jun. S. 376 ff. und vom Jul. S. 565 ff. Veronica bellidiodes bis Agrostis rupestris, Aira flexuosa bis Avena argentea, Galium helveticum, Primula truncata, Androsace carnea, Phyteuma Michellii bis Viola alpina, Eryngium alpinum bis Drosera obovata, Daphne striata, Saxifraga tenella bis Cerastium ciliatum, Potentilla salisburgensis, Aconitum Cammarum, A. cernuum, A. formosum, A. Napellus, A. neubergense, Ranunculus Phthora bis Euphrasia tricuspidata, Draba lapponica bis Astragalus leontinus, Trifolium noricum bis Hieracium flexuosum, Crepis grandiflora bis Poa distichophylla (S. 570.) Bupleurum graminifolium bis Hieracium porrifolium, Sabulina striata bis Saxifraga Aizoides, Sabulina austriaca, Noccaea rotundifolia, Hieracium glaucum, Taraxacum nigricans bis Hieracium dentatum, Plantago

Auf Alpen.

alpina bis *Myosotis suaveolens*, *Phyteuma Scheuchzeri*,
Campanula linifolia, *Euphrasia salisburgensis* bis *Chamae-*
repes alpina.

B) *Auf Hochalpen.*

Avena III. Hafer.

A. distichophylla Vill. zweireihigblättriger H.
Pedicularis, XIV. Läusekraut.

P. rostrata L. schnabelartiges L.

Auf hohen Alpenjochen.

Lomatogonium V. Saumnarbe.

L. carinthiacum Rchb. (*Swertia carinthiaca Wulff.*)
 kärnthnische Saumnarbe oder Swertie.

(*Campanula barbata*, *Saxifraga androsacea*, *S. exarata*
S. stellaris, *Silene acaulis*, *Ranunculus aconitifolius*, *R. alpes-*
tris, *R. parnassifolius*, *Anthyllis alpestris* s. Jun. S. 384 f. und
 vom Jul. S. 575 ff. *Poa minor* bis *Saxifraga hieracifolia*, *Sie-*
bera cherlerioides bis *Scrofularia canina*, *Draba carinthiaca*,
Oxytropis uralensis bis *Noccaea rotundifolia*, *Viola calcarata*,
Laserpitium hirsutum, *Aconitum tauricum* bis *Koeleria*,
hirsuta, *Czackia Liliastrum* bis *Luzula lutea*.)

C) *Auf den höchsten Alpen.*

Ranunculus XIII. Ranunkel.

R. crenatus W. Kit. gekerbter Ranunkel oder
 Hahnenfuss.

Thlaspi XV. Täschelkraut.

Thl. alpinum Jacq. Alpen-T.

Aronicum XIX. Krebswurz.

A. glaciale Rchb. (*Arnica galsialis Jacq.*) Glet-
 scher-Kr., Gletscher-Wolverley.

Achillea XIX. Garbe.

A. moschata L. Bisam-Schaafgarbe.

A. nana L. Zwerg-Schaafgarbe.

Carex XXI. Riedgras.

C. aterrima Hoppe rabenschwarzes Riedgras.

Auf den höchsten Alpen.

Carex frigida *All.* Frost - Riedgras..

C. fuliginosa *Strub.* russfarbiges R.

a) *Auf den höchsten Alpenjochen.*

Ranunculus (s. o.) *acris* *L.* *Var. a.* **Ranunculus**
Villarsii *Dec.*

b) *In den höchsten Alpen auf Morast.*

Tofieldia VI. Tofieldie.

T. borealis *Wahlb.* (*Anthericum calyculatum*
b. Linn.) nordische T.

c) *Auf den höchsten Alpen an nassen steinigen*
Orten.

Carex (s. oben) *clavaeformis* *Hoppe* keulenförmiges Riedgras.

d) *Auf den höchsten Alpen an steinigen Orten.*

Phaca XVII. Berglinse.

Ph. astragalina *Dec.* (*Astragalus alpinus* *L.*)
traganthartige B., Alpen - Traganth.

Ph. australis *L.* südliche Berglinse.

Ph. frigida *L.* kalte Berglinse.

(*Koeleria subspicata*, *Lloydia serotina*, *Pulsatilla vernalis*, *Carex capillaris* s. *Jun. S.* 385. vom *Jul. S.* 579 ff. *Valeriana elongata* bis *Saponaria lutea*, *Anemone baldensis*, *Draba laevigata* bis *Crepis hyoseridifolia*, *Gnaphalium fuscum* bis *Saxifraga Seguieri*, *Viola cenisia* bis *Crepis montana*.)

D) *In Alpenegegenden und Alpenthälern.*

Nardus, III. Borstengras.

N. stricta *L.* steifes B., der Wolf, Nätsch.

Aira, III. Schmiele.

A. cespitosa *L.*, Rasen - Schmiele. *Var. c. alpina.*

Avena, III. Hafer.

A. pubescens *L.*, feinhaariger H. *Var. b. alpina.*

Silene, X. Leimkraut.

S. pudibunda *Hffgg.*

Thlaspi alpinum s. oben unter C.

a) *In Alpengegenden auf trocknen grasigen Plätzen.*

Carex, XXI. Riedgras.

C. nigra All., schwarzes R.

b) *In Alpengegenden an steinigen Orten.*

Leontodon, XIX. Löwenzahn.

L. dubius Rchb., zweifelhafter L.

(*Campanula barbata*, *Acinos alpinus*, *Pedicularis recutita*, *Geracium aureum*, *Carduus carlinaefolius*, *Saxifraga oppositifolia*, *Gypsophila repens*, *Noccaea alpina*, *N. rotundifolia*, *Biscutella laevigata*, *Kernera saxatilis*, *Helianthemum alpestre*, *Atragene alpina*, *Arabis alpina*, *Moehringia muscosa*, *Streptopus amplexifolius*, *Potentilla aurea*, *Silene acaulis*, *Leontodon Taraxaci*, *Lotus corniculatus*, *Pinguicula flavescens*, *Sieversia montana*, *Ranunculus montanus*, *Valeriana tripteris*, *Homogyne alpina*, *Senecio alpinus*, s. May S. 169 ff. — *Chaerophyllum Cicutaria*, *Noccaea cepeaefolia*, *Hieracium amplexicaule*, *Saxifraga mutata*, *Galium silvestre*, *Rhododendron ferrugineum*, *Rh. hirsutum*, *Silene inflata* Var., *Carex capillaris* s. Jun. S. 386 ff. und vom Jul. S. 582 ff. *Scabiosa dipsacifolia* bis *Ostericum verticillare*, *Calamintha grandiflora* bis *Molopospermum cicutarium*, *Sabulina Villarsii* bis *Epilobium rosmarinifolium*, *Imperatoria Ostruthium*, *Phyteuma Halleri*.)

5) *Angebaut oder angepflanzt (und zum Theil verwildert).*

Dipsacus, IV. Karden.

D. fullonum Mill., (*Dipsacus fullonum* β . *Linn.*)

Weber - Karden.

Artemisia, XIX. Beifuss.

A. Dracunculus L. Dragen - Beifuss.

(*Rosa damascena*, *Rubus odoratus*, *Medicago sativa*, *Citrus Aurantium*, *C. medica*, *Calendula officinalis* s. May S. 178 f. *Asterocephalus atropurpureus*, *Lycium barbarum*, *L. europaeum*, *Zizyphus vulgaris*, *Anethum graveolens*, *Levisticum vulgare*, *Petroselinum sativum*, *Allium fistulosum*, *A. Schoenoprasum*, *Porrum sativum*, *Silene inflata*,

Angebaut oder angepflanzt (und zum Theil verwildert.)

Prunus semperflorens, *Papaver officinale*, *P. somniferum*, *Raphanus sativus*, *Geranium striatum*, *Lavatera trimestris*, *Althaea rosea*, *Lupinus luteus*, *Phaseolus multiflorus*, *Ph. nanus*, *Ph. vulgaris*, *Pisum leptolobum*, *P. quadratum*, *P. saccharatum*, *Lathyrus odoratus*, *Cicer arietinum*, *Anthemis nobilis*, *Cucurbita maxima*, *C. Melopepo*, *C. Pepo*, *Lagenaria vulgaris*, *Cannabis sativa*, *Acacia Farnesiana* s. *Jun S. 391 ff.* und vom *Jul S. 584 ff.* *Phalaris canariensis* bis *Avena orientalis* *Nicotiana macrophylla* bis *Sium Sisarum*, *Porrum Cepa*, *Rumex Patientia* bis *Dracocephalum Moldavica*, *Hibiscus syriacus* bis *Cucumis sativus*).

6) Auf Anhöhen.

Oreoselium, V. Grundheil.

O. legitimum M. B., (*Athamanta Oreoselinum L.*) petersilienartige Augenwurz, kleine Bergpetersilie.

a) *An bewachsenen Anhöhen.*

Hieracium, XIX. Habichtskraut.

H. sabaudum L. savoyer Habichtskraut.

b) *An grasigen Anhöhen.*

Achillea XIX. Garbe.

A. nobilis L. edle Schaafgarbe.

c) *An sonnigen Anhöhen.*

Cervaria, V. Hirschwurz.

C. Rivini Gaertn. (*Athamanta Cervaria L.*) gemeine schwarze Hirschwurz).

Seseli, V. Sesel.

S. bienne Crtz. (*Seseli annuum L.*)

Allium, VI. Lauch.

A. senescens L. alternder Lauch.

d) *An sonnigen Anhöhen in kurzem Grase.*

Spiranthes, XX. Drehähre.

Sp. autumnalis Rich. (*Ophrys spiralis L.*) spiralförmige Ragwurz.

c) *An trocknen Anhöhen.***Erigeron, XIX. Berufungskraut.**E. serotinus *Weihe* spätblühendes B.

(Leontodon hispidus, Myosotis intermedia, Armeria vulgaris, Hieracium Pilosella, Lepidium campestre s. May S. 181 ff. Poa nemoralis, Asterocephalus columbarius, Geranium columbinum, Helianthemum piliferum, H. vulgare, Teucrium Botrys, s. Jun S. 396 f. und vom Jul S. 587. Festuca rubra, Avena pratensis, Asterocephalus suaveolens, Sabulina fastigiata bis Codonoprasum carinatum, Porrum rotundum, Teucrium Chamaedrys bis Asterocephalus graminum.)

7) *Auf aufgeschwemmtem Boden.*

(Reseda lutea, Nasturtium anceps, N. silvestre s. May S. 185. Erodium pimpinellifolium s. Jun S. 398. Reseda Luteola s. Jul S. 589.)

S) *An und in Bächen.*A) *An Bächen.***Mentha, XIV. Minze, Münze.**

M. gentilis L. Edel-M.

Salix amygdalina (manchmal zum zweitenmal s. May.)

a) *An Bächen in Gebüsch.*

Mentha sativa L. zahme Münze.

Hieracium, XIX Habichtskraut.

H. silvestre Tsch. Forst-Habichtskraut.

b) *An Bächen in Voralpen.*

Aconitum variegatum s. auf Alpen.

B) *In Bächen.***Chara, I. (XXI.) Armleuchter.**

Ch. longibracteata Ktzig. Armleuchter mit langen Nebenblättern.

(Veronica serpyllifolia, Myosotis palustris, Spiraea denudata, Nasturtium officinale, N. silvestre, Sisymbrium strictissimum s. May S. 186. Veronica maritima, Nasturtium-rivulare, Malachium aquaticum, Geranium silvaticum, Callitriche autumnalis, C. platycarpa, Veronica Beccabunga,

In Bächen.

Ranunculus fluitans s. Jun S. 399 f. und alle im Jul. S. 589 f. angegebenen Pflanzen, wozu noch *Potamogeton plantagineus* Du Croz, wegerichartiges Laichkraut oder Saamkraut).

9) *In Baumgärten.*

Aegopodium Podagraria s. Jun S. 400.

10) *Auf bebautem Boden.*

Mentha, XIV. Minze, Münze.

M. crispa L. krause M.

M. sativa L. zahme M.

Fumaria XVII. Erdrauch.

F. media Lois., mittlerer F.

(*Blitum Bonus Henricus*, *Veronica serpyllifolia*, *Valerianella coronata*, *Stellaria media*, *Cerastium triviale*, *C. vulgatum*, *Oxalis corniculata*, *O. stricta*, *Euphorbia Lathyris*, *Lamium album*, *L. amplexicaule*, *Capsella Bursa pastoris*, *Lepidium campestre*, *Geranium molle*, *G. pusillum*, *G. pyrenaicum*, *Fumaria Vaillantii*, *Medicago lupulina*, *Lapsana communis*, *Sonchus asper*, *S. oleraceus*, *Pyrethrum Parthenium*, *Senecio vulgaris*, *Poa annua* s. May S. 188 ff. *Agropyrum repens*, *Solanum nigrum*, *Lamium maculatum*, *Aethusa Cynapium*, *Aegopodium Podagraria*, *Rapistrum glabrum*, *Erysimum cheiranthoides*, *Althaea hirsuta*, *Hibiscus Trionum*, *Fumaria officinalis*, *Vicia sativa*, *Senecio squalidus*, *Urtica urens* s. Jun. S. 461 ff. und die im Jul S. 591. 93. angemerkten Pflanzen, mit Ausnahme von *Vicia hybrida*).

11) *An und auf Bergen.*

Oreoselinum legitimum s. auf Anhöhen.

Angelica V. Angelik.

A. pyrenaica Spr., pyrenäische A.

Hieracium, XIX. Habichtskraut.

H. racemosum W. K., traubenartiges H.

Artemisia, XIX. Beifuss.

A. austriaca Jacq., österreichischer B.

*An und auf Bergen.***Cineraria, XIX. Aschenpflanze.****C. crassifolia Kit., dickblättrige A.****C. Schkuhrii Rchb., Schkuhrs A.**

(*Agropyrum cristatum*, *Trifolium montanum* s. May S. 192 f. *Veronica officinalis*, *Verbascum Lychnitis*, *Physopermum aquilegifolium*, *Pimpinella Saxifraga*, *Euphorbia pilosa*, *Potentilla micrantha*, *Micromeria variegata*, *Veronica prostrata*, *V. maritima* s. Jun S. 403 ff. und vom Jul S. 593. *Calamagrostis montana* bis *Adenophora suaveolens*, *Thymus Chamaedrys*, *Rhaponticum scariosum* bis *Corydalis lutea*, *Bupthalmum speciosissimum*, *Cirsium montanum*).

12) In Berggegenden.**a) Zwischen Gebüsch.****Epilobium, VIII. Schotenweidrich.****E. montanum L., Berg - Sch.****b) Auf Wiesen.****Gentiana, V. Enzian.****G. campestris L., Feld - Enzian.****c) An Bergströmen auf Gries.****Avena III. Hafer.****A. distichophylla Vill., zweireihigblättriger H.**

(*Neslia paniculata*, *Geranium pyrenaicum*, *Trollius europaeus* s. May S. 195 bis 198. *Agropyrum caninum*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Verbascum sinuatum*, *Chaerophyllum Cicutaria*, *Agrostemma Coronaria*, *Spiraea salicifolia*, *Cardamine asarifolia* s. Jun S. 407 ff. und alle im Jul S. 595 f. aufgeführten Pflanzen).

13) In Bergwäldern.**Senecio, XIX. Kreuzkraut.****S. tenuifolius Jacq., schmalblättriges Kr.**

(*Fragaria semperflorens* s. May S. 199. *Cornus sanguinea* *Sagina ciliata*, *Origanum vulgare*, *Hieracium silvaticum*, *Salvia glutinosa*, *Dianthus Seguieri* s. Jun S. 409 ff. und vom Jul S. 596. *Astrantia intermedia*, *Pteroselinum Chabraei*, *Senecio Fuchsii* bis *Astrantia major*).

14) *Auf Bergwiesen.*

Seseli bienne s. auf Anhöhen.

(*Ranunculus Thora*, *Leontodon hastilis* s. May S. 202. *Cirsium serratuloides*, *Euphorbia nicaeensis* s. Jun S. 412 und vom Jul S. 597 *Avena pratensis*, *Betonica hirta*, *Pieris umbellata*, *Senecio Doria*).

15) *An bewässerten Plätzen.*

(*Alopecurus fulvus*, *H. geniculatus*, *Festuca rubra* s. Jul S. 598.)

16) *Auf Brachen.*

Valerianella olitoria (zweite Generation; die erste siehe May 203.

Myosotis arvensis s. April.

Erigeron, XIX. Berufungskraut.

C. canadensis L., gemeines B.

Lamium amplexicaule, *L. purpureum* s. May S. 204. *Alchimilla arvensis*, *Echium vulgare*, *E. Wierzbickii*, *Verbascum floccosum*, *Rubus caesius*, *Carduus nutans*, *Anthemis arvensis* s. Jun S. 412 f. und alle im Jul S. 598. aufgezeichneten Pflanzen.

17) *Auf Brüchen.*

Polygonum, VIII. Knöterig.

P. minus Act., kleiner Knöterig.

Drosera longifolia s. Jul. S. 598.

18) *In Buchenwäldern.*

Epipogium aphyllum und **Vignea guestphalica** s. Jul S. 598.

19) *In Canülen.*

Chara I (XXI.) Armleuchter.

Ch. opaca Ag. dunkler Armleuchter.

20) *Auf Dächern.*

Sempervivum tectorum s. Jul S. 599

21) *An Dämmen.*

Ranunculus repens s. May S. 205.

22) *Auf Dammerde.*

Spergula vulgaris s. Jun S. 414.

23) *In Dörfern.*

Polygonum, VIII. Knöterig.

P. Hydropiper L. Wasserpfeffer (An feuchten Orten).

(*Rumex nemorosus*, *Anthemis Cotula* s. Jul. S. 599.)

24) *Auf Dünen.*

Gentiana, V. Enzian.

G. Amarcella L., kleiner E. seitenblüthiger E.

(*Senecio denticulatus* s. Jul S. 599.)

25) *Auf und um Dünger.*

(*Blitum rubrum*, *Echinochloa Crus galli*, *Chenopodium glaucum*, *Ch. murale*, *Ch. olidum*, *Ch. rhombifolium*, *Atriplex microsperma* s. Jul S. 599 ff.)

26) *Auf dürren Plätzen.*

Euphorbia, XI. Wolfsmilch.

E. serotina Host, späte W. (An steinigen Orten).

Centaurea, XIX. Flockenblume.

C. cristata Barth., (An sonnigen Orten).

(*Pimpinella Saxifraga*, *Rubus caesius* s. Jun. S. 414. und alle im Jul S. 600 bemerkten Pflanzen).

27) *Auf Feldern.*

(*Veronica agrestis*, *V. opaca*, *V. serpyllifolia* s. May S. 207. *Agropyrum repens*, *Hypochaeris radicata* s. Jun S. 415. *Carduus platylepis* s. Jul S. 600.)

28) An Feldrainen und Feldrändern.**Mentha, XIV. Minze, Münze.***M. arvensis* L., Acker - Münze.**Hieracium, XIX. Habichtskraut.***H. umbellatum* L., schirmblumiges H.**Leontodon, XIX. Löwenzahn.***L. autumnalis* L. Herbst - Löwenzahn.**Artemisia, XIX. Beifuss.***A. campestris* L. Feld - Beifuss.*A. scoparia* W. K. Besen - B.**Erigeron serotinus s. an trocknen Anhöhen.**

(*Armeria vulgaris*, *Polygonum aviculare*, *Geranium rotundifolium* s. May S. 208 f. *Salvia verticillata*, *Briza media*, *Asterocephalus columbarius*, *Galium verum*, *Verbascum nigrum*, *Levisticum vulgare*, *Linum catharticum*, *Dianthus Armeria*, *Ervum tetraspermum*, *Hypochaeris radicata*, *Achillea Millefolium*, *Centaurea Jacea*, *Carduus nutans*, *Dianthus deltoides* s. Jun S. 415 ff. und alle im Jul S. 601 f. angegebenen Pflanzen.)

29) An Felsen.**Campanula, V. Glockenblume.***C. Morettiana* Rchb. Morettis Gl.**Laserpitium, V. Laser.***L. nitidum* Zanted. mattglänzendes Laserkraut.**Allyssum montanum** (manchmal zum zweitenmal s. May.)**Hieracium umbellatum s. an Feldrainen.****Achillea nobilis s. an grasigen Anhöhen.***An bewachsenen Felsen.***Hieracium silvestre s. an Bächen in Gebüsch.***An sonnigen trocknen Felsen.***Artemisia XIX. Beifuss.***A. pontica* L. römischer Beifuss.

(*Myosotis collina*, *Campanula rotundifolia*, *Cynanchum Vincetoxicum*, *Dianthus caesius*, *Linaria Cymbalaria*, *Biscutella laevigata*, *Arabis alpina*, *Geranium lucidum*, *Coryda-*

An Felsen.

lis lutea, Hieracium murorum, Myosotis intermedia, Nocca alpina s. May S. 211 ff. Centranthus ruber, Poa nemoralis, Plantago sericea, Verbascum Lychnitis, Authericum Liago, Ruta graveolens, Dianthus prolifer, Hyssopus officinalis, Acinos thymoides, Origanum vulgare, Geranium columbinum, Coronilla varia, Hypericum hirsutum, H. montanum, Barkhausia foetida, Centaurea Jacea, Arabis alpina, Sabulina Gerardi, Moehringia muscosa, Agrostemma Coronaria, Sedum atratum, Calamintha thymifolia, Hieracium amplexicaule s. Jun S. 415 ff. und vom Jul S. 602. Heteropogon Allionii, Poa cenisia, Asterocephalus gramuntius bis Bupleurum ranunculoides, Epilobium collinum, Sedum anopetalum, S. maximum, Phytolacca decandra, Sempervivum globiferum, Punica Granatum, Teucrium Chamaedrys bis Linaria vulgaris, Hypericum perforatum, Lactua virosa bis Veronica saxatilis, Hieracium laevigatum, Semprevivum montanum, Sedum repens bis Anthemis tinctoria.)

30) *Auf fettem Boden.*

Blitum rubrum, Chenopodium rhombifolium s. Jul S. 606.

31) *An feuchten Orten.*

Fimbristylis, III. Faserriet.

F. annua R. S. (Scirpus dichotomus All.) einjährige Binse.

F. dichotoma Vahl. (Scirpus dichotomus Rottb.) gabelförmige Binse.

Mentha, XIV. Minze, Münze.

M. rotundifolia L. rundblättrige M.

a) *An feuchten Orten in Alpenthälern.*

Heracleum V. Bärenklau.

H. flavescens Bess. gelbliche B.

H. longifolium Jacq. langblättrige B.

b) *An feuchten Orten der Voralpen.*

Senecio, XIX. Kreuzkraut.

S. lyratifolius Rchb. (Cineraria alpina β . Linn.)

leierblättriges Kr.

c) *An feuchten grasigen Orten.*

Chlora, VIII. Chlora.

Chl. serotina Korh. späte Chlora.

d) *An feuchten sumpfigen Orten.*

Polygonum minus s. auf Brüchen.

(*Sagina maritima*, *S. procumbens*, *Ranunculus repens*, *Myrrhis odorata*, *Poa annua*, *Sisymbrium strictissimum* s. May S. 217 ff. *Veronica Anagallis*, *Galium palustre*, *Iuncus bufonius*, *Stachys palustris*, *Chaerophyllum aureum*, *Stachys silvatica*, *Rubus caesius*, *Scrofularia nodosa*, *Gernium palustre* s. Jun S. 424 ff. und vom Jul S. 607. *Veronica scutellata* bis *Heleogiton triquetrum*, *Isnardia palustris* bis *Streptopus amplexifolius*, *Convolvulus sepium* bis *Chenopodium glaucum*.)

32) *In Fichtenwäldern.*

Silene, X. Leimkraut.

S. chlorantha Ehrh., (*Cucubalus catholicus* β . *Linn.*) grünblühendes L.

(*Linnaea borealis* s. Jul S. 609.)

33) *In Flugsand.*

Corispermum, V. Wanzensaame.

C. intermedium Schægg., mittlerer W.

(*Tribulus terrestris*, *Achillea pectinata* s. Jun S. 426. *Holoschoenus exserens* s. Jul. S. 610).

34) *An und in Flüssen.*

Blitum I Erdbeerspinat

Bl. crassifolium Rchb. (*Chenopodium crassifolium Schrad.*) dickblättriger E. oder Gänsefuss.

Bulliarda, IV. Bulliarde.

B. aquatica Dec., (*Tillaea aquatica L.*) Wasser-Bulliarde., Wasser-Tilläa.

Salsola, V. Salzkraut.

S. Kali L. gemeines Salzkraut.

An Flüssen.

Mentha gentilis s. an Bächen.

Leontodon, XIX. Löwenzahn.

L. pratensis *Rchb.* Wiesen - Löwenzahn.

Aster, XIX. Sternblume.

A. salignus *Willd.*, weidenblättrige St.

Salix amygdalina (manchmal zum zweitenmal s. May)

An Flüssen in Gebüsch.

Mentha sativa (s. an Bächen).

Hieracium silvestre (s. an bewachsenen Felsen).

Auf Flussinseln.

Trifolium, XVII. Klee.

Tr. pannonicum *L.* ungarischer Klee.

(*Gratiola officinalis*, *Potamogeton crispus*, *P. perfoliatus*, *Nasturtium anceps*, *N. silvestre*, *Sisymbrium strictissimum*, *Chaerophyllum aromaticum* s. May S. 221 ff. *Agropyrum glaucum*, *Allium Schoenoprasum*, *Oenothera biennis*, *Dianthus caesius*, *Malachium aquaticum*, *Callitriche autumnalis*, *Potamogeton compressus*, *P. gramineus*, *Ranunculus fluitans* s. Jun S. 426 ff. und vom Jul S. 610. *Blitum virgatum* bis *Apium graveolens*, *Oenothera muricata* bis *Lythrum virgatum*).

35) *In Gärten.*

Mentha, XIV. Minze, Münze.

M. piperita *Huds.*, Pfeffer - Münze.

(*Oxalis stricta* s. May S. 223. *Agropyrum repens* s. Jun S. 428. *Digitaria sanguinalis*, *Setaria verticillata*, *Atriplex nitens* s. Jul S. 612).

36) *Auf und in Gebirgen.*

Aconitum, XIII. Eisenhut.

A. autumnale *Clus.*, Herbst - Eisenhut.

Solidago, XIX. Goldrute.

S. alpestris *W. K.*, Alpen - G.

S. Virgaurea *L.* gemeine G.

Auf und in Gebirgen.

Cineraria, XIX. Aschenpflanze.

C. crispa L. fil., krause Aschenpflanze.

C. crocea Tratt., safranfarbene A.

C. sudetica Koch., Riesengebirgs - A.

a) *Auf hohen Gebirgen.*

Aconitum variegatum (s. auf Alpen).

b) *In Hochgebirgsgegenden.*

Silene pudibunda (s. in Alpengegenden).

c) *In Gebirgsgegenden an Felsen.*

Laserpitium nitidum (s. an Felsen).

d) *In Gebirgsgegenden auf faulem Holze.*

Sagina, IV. Mastkraut.

S. bryoides v. Froel., knotenmoosartiges M.

e) *In Gebirgsgegenden an quelligen Orten.*

Gentiana, V. Enzian.

G. asclepiadea L. schwalbenwurzartiger E.

f) *In Gebirgsgegenden auf Wiesen.*

Colchicum, VI. Zeitlose.

C. autumnale L. Herbst - Z.

g) *Am Fusse von Gebirgen.*

Nepeta, XIV. Katzenminze,

N. pannonica, Jacq., ungarische K.

h) *An Gebirgsbächen.*

Allium, VI. Lauch.

A. sibiricum W., sibirischer Lauch.

i) *Auf fruchtbaren Gebirgswiesen.*

Gnaphalium, XIX. Ruhrkraut.

Gn. margaritaceum L. perlenartiges R.

Auf und in Gebirgen.

(*Geranium divaricatum*, *Bupthalmum salicifolium*, *Bunium Bulbocastanum*, *Myrrhis odorata* s. May S. 224 ff.) *Poa nemoralis*, *Silene inflata* Var., *Sieversia montana*, *Alectrolophus major*, *Moehringia muscosa*, *Vignea saxatilis*, *Saxifraga oppositifolia*, *Pulsatilla alba*, *P. vernalis*, *Gentiana obtusifolia*, *Elymus europaeus*, *Levisticum vulgare*, *Trifolium spadicum*, *Aquilegia Sternbergii*, *Cardamine asarifolia*, *C. resedifolia*, *Arnica montana*, *Trifolium elegans*, *Veratrum album*, *V. Lobelianum*, *Spiraea carpinifolia*, *Chaerophyllum aureum* s. Jun S. 429 ff. und vom Jul S. 612. *Calamagrostis nutans* bis *Dianthus neglectus*, *Aconitum hians*, *Hieracium murorum* bis *Archangelica officinalis*, *Sabulina Gerardi* bis *Aconitum laetum*, *Crepis grandiflora* bis *Centaurea austriaca*, *Epipactis latifolia* bis *Campanula latifolia*).

37) *In Gebüsch.*

Senecio, XIX. Kreuzkraut.

S. umbrosus Kit.

Aster, XIX. Sternblume.

A. amelloides Brnh. amellenartige St.

a) *In Gebüsch an Bächen und Flüssen.*

Mentha sativa (s. an Bächen).

Hieracium silvestre (s. an bewachsenen Felsen).

b) *Zwischen Gebüsch in Sümpfen.*

Mentha gentilis (s. an Bächen).

c) *In Gebüsch an Quellen.*

Senecio, XIX. Kreuzkraut.

S. Cacaliaster Lam., (*Cacalia saracenica* L.) pestwurzartiges Kr., goldruthenblättrige Pestwurz.

(*Galium Mollugo*, *Myosotis sparsiflora*, *Clematis Viti-cellula*, *Geranium robertianum*, *Vicia sepium* s. May S. 230 f. *Veronica officinalis*, *Galium Aparine*, *Oenanthe Lachenalii*, *Althaea officinalis*, *Hypericum hirsutum*, *Malachium aquaticum*, *Epilobium montanum*, *Arabis brassicaeformis*, *Lathyrus latifolius*, *Cytisus capitatus*, *Geranium columbinum* s. Jun S. 436 ff. und die im Jul S. 618 bis 621. angemerken Pflanzen, mit Ausnahme von *Coronilla montana*).

38) *In Gehauen.*

Torilis Anthriscus (s. Jul. S. 621.)

39) *Unter Getreide.*

(*Avena strigosa*, *Saponaria Vaccaria*, *Pisum arvense*, *Centaurea Cyanus*, *C. solstitialis* s. Jun. S. 440 f. und die im Jul. angezeigten Pflanzen.

40) *An und in Gräben.*A) *An Gräben.*

Tanacetum vulgare (s. Jul. an Bächen S. 596.)

An trocknen Gräben.

Mentha piperita (s. in Gärten.)

B) *In Gräben.*

Chara longibracteata (s. in Bächen.)

Hypericum, XVIII. Hartheu.

H. elodes L., Sumpf-Johanniskraut.

Bidens, XIX. Zweizahn.

B. cernua L., überhängender Zweizahn.

B. tripartita L., dreitheiliger Z.

Zannichellia, XXI. Zannichellie.

Z. pedunculata Rchb., blumenstielige Z.

Z. repens Bnng., kriechende Z.

In schlammigen Gräben.

Mentha, XIV. Minze, Münze.

M. intermedia Rchb., mittlere M.

(*Glyceria distans*; *Myosotis palustris*, *Spiraea denudata*, *Nasturtium palustre*, *N. silvestre*, *Potamogeton crispus*, *P. perfoliatus*, *Cerastium triviale*. *Ranunculus repens* s. May S. 234 ff. *Veronica Anagallis*, *V. maritima*, *Agrostis stolonifera*, *Juncus conglomeratus*, *J. effusus*, *Malachium aquaticum*, *Euphorbia pilosa*, *Phlomis tuberosa*, *Geranium palustre*, *Calitriche autumnalis*, *C. platycarpa*, *C. stagnalis*, *Veronica Beccabunga*, *Glyceria fluitans*, *Potamogeton gramineus*, *Stachys palustris*, *Scutellaria galericulata*, *Nasturtium am-*

In schlammigen Gräben.

phibium, Abutilon Avicennae s. Jun. S. 441 ff. und alle im Jul. S. 622. bis 625 aufgeführten Pflanzen).

41) *Im Grase.*

(Polygonum aviculare β . erectum, Veronica serpyllifolia, Geranium pusillum s. May S. 238. Prunella vulgaris s. Jun. S. 444).

42) *An grasigen Orten.*

Mentha, XIV. Minze, Münze.

M. hirta *W.* rauhaarige M.

An grasigen feuchten Orten s. an feuchten Orten.

An grasigen sonnigen Orten.

Pteroselinum, V. Flügelsilge.

Pt. alsaticum (Peucedanum alsaticum L.) elsassischer Haarstrang.

An grasigen überschwemmten Orten.

Cyperus, III. Cypergras.

C. fuscus L., braunes C.

C. virescens Hoffm., grünliches C.

(Alchimilla vulgaris, Polygonum aviculare α . triviale, Erodium cicutarium, Trifolium pratense, Taraxacum officinale, Pollinia distachys, Lotus corniculatus, s. May S. 240 f. Salvia Verbenaca, Plantago decumbens, Plantago major, Pl. media, Achillea Millefolium, Trifolium procumbens, Ervum tetraspermum, Trifolium incarnatum s. Jun. 445 f. und die im Jul. S. 625 f. aufgezeichneten Pflanzen).

43) *Auf Gries.*

Avena, IV. Hafer.

A. distichophylla Vill. zweireihigblättriger Hafer. (An Bergströmen).

(Saxifraga oppositifolia, Dryas octopetala, Acinos alpinus, Nocca alpina, Arabis alpina s. May S. 243 f. Gypsophila repens, Linaria alpina, Hieracium glaucum, H. staticifolium, Erigeron uniflorus s. Jul. S. 626 f.

44) *An Häusern.*

(*Blitum Bonus Henricus*, *Chenopodium urbicum*, *Amaranthus adscendens* s. Jul. S. 627.)

45) *An Hecken.*

Asparagus, V. Spargel.

A. acutifolius L. spitzblättriger Spargel.

(*Veronica latifolia*, *Lycium barbarum*, *L. europaeum*, *Rubus caesius* s. Jun. S. 447 f.)

46) *Auf Heiden.*

(*Leontodon hispidus* s. May S. 246. *Thymus Serpyllum* s. Jun S. 448. *Asterocephalus suaveolens*, *Thymus Chamaedrys*, *Euphrasia officinalis* s. Jul. S. 627.)

In Heidewäldern.

Oreoselinum legitimum (s. auf Anhöhen,
Cervaria Rivini (s. auf sonnigen Anhöhen.)

(*Arnica montana* s. Jun. S. 449. *Euphrasia micrantha*, *Laserpitium pruthenicum* s. Jul. S. 627 f.)

47) *Auf faulem Holze.*

Sagina bryoides (s. in Gebirgsgegenden unter d.)

Auf Holzerde.

Arenaria trinervia (s. May S. 248.)

48) *Auf Hügeln.*

(Vergl. Kalkhügel, Sandhügel.)

Evonymus europaeus (manchmal zum zweitenmal
s. May S. 249.)

Alyssum montanum (manchmal zum zweitenmal s.
May S. 253.)

Leontodon autumnalis (s. auf Feldrainen.)

Artemisia, XIX Beifuss.

A. campestris L. Feld - Beifuss.

A. camphorata Vill., Campher - Beifuss.

*Auf Hügeln.***Centaurea, XIX., Flockenblume.****C. amara L. bittere Flockenblume.****C. Stoebe L. schmalblättrige Fl.***An sandigen Hügeln.***Artemisia (s. oben) scoparia W. Kit., Besen-Beifuss.**

(Veronica arvensis, V. serpyllifolia, Plantago graminea, Pl. sericea, Cynanchum Vincetoxicum, Bunium Bulbocastanum, Erodium cicutarium, Lotus corniculatus, Trifolium montanum, Medicago lupulina, Berteroa incana, Gypsophila rigida, Bellis perennis, Dianthus, diutinus, Myosotis collina, Dianthus Armeria, Medicago Gerardi, s. May S. 248ff. Veronica officinalis, Salvia verticillata, Lolium perenne, Plantago maritima, Galium verum, Verbascum Lychnitis, V. nigrum, Eryngium campestre, Pimpinella Saxifraga, Oenothera biennis, Acinos thymoides, Prunella vulgaris, Geranium columbinum, Coronilla varia, Hypericum hirsutum, H. montanum, Barkhausia graveolens, Achillea Millefolium, Centaurea Jacea, Lathyrus latifolius, Scleranthus perennis, Helianthemum guttatum, Agrostemma Coronaria, Dianthus prolifer, Anthericum Liliago, Trifolium stellatum, Scorzonera muricata, Galium purpureum, Anthyllis alpestris, Cytisus capitatus, Barkhausia foetida s. Jun. S. 450ff. so wie die im Jul. S. 628. bis 631. bemerkten Pflanzen.)

49) Auf Kalkalpen.**Pedicularis rostrata (s. auf Alpen S. 703.)****Carduus defloratus (s. Jun. S. 460.)****Achillea, XIX. Garbe.****A. Clavennae L. bittere Schaafgarbe.***Auf den höchsten Kalkalpen.***Achillea Clusiana Tsch., Clusianische Schaafgarbe.***Auf sonnigen Kalkalpen.***Aconitum, XIII. Eisenhut.****A. Anthora L. heilsamer E. Giftheil.**

(Noccaea alpina s. May S. 259. Pulsatilla Burseriana, Saxifraga recta, Lloydia serotina, Senecio abrotanifolius,

Auf Kalkalpen.

Potentilla minima s. Jun. S. 457 ff. so wie die im Jul. S. 632 ff. angegebenen Pflanzen.

50) *An Kalkbergen.*

(*Daphne Cneorum* s. May S. 261. *Origanum vulgare*, *Astragalus Onobrychis* s. Jun. S. 459 ff. und alle im Jul. S. 634. angemerkten Pflanzen.)

51) *Auf Kalkboden.*

(*Reseda lutea*, *Hieracium glaucum*, *Dianthus Armeria* s. May S. 262. *Salvia verticillata*, *Scleranthus perennis*, *Rapistrum perenne*, *Coronilla varia*, *Barkhausia foetida*, *Teucrium Botrys*, *Geranium sanguineum* s. Jun. S. 460 ff. so wie alle im Jul. S. 634 ff. angezeigten Pflanzen.)

52) *An Kalkfelsen.*

Allium senescens (s. an sonnigen Anhöhen).

(*Teucrium montanum*, *Centaurea variegata*, *Arabis brassicaeformis* *Hieracium villosum* s. Jun. S. 462 ff. und alle im Jul. S. 635 ff. aufgeführten Pflanzen).

53) *Auf Kalkgebirgen.*

(*Ranunculus Thora*, *Arabis alpina* s. May S. 265 ff. *Saxifraga oppositifolia* s. Jun. 464. *Dianthus caryophylloides*, *D. virgineus* s. Jul. S. 636.)

54) *In Kalkgegenden.*a) *Auf Kalkhügeln.*

Artemisia camphorata (s. auf Hügeln)

b) *An sonnigen Kalkhügeln.*

Pulsatilla vulgaris (zuweilen zum zweitenmal s. April.)

(*Biscutella laevigata*, *Cytisus austriacus*, *Trinia pumila* s. May S. 267. *Sonchus arvensis* s. Jun. S. 465. und alle im Jul. S. 636. aufgezeichneten Pflanzen.)

55) *Auf Kalkvoralpen.*

Aconitum, XIII. Eisenhut.

Auf Kalkvoralpen.

Aconitum Anthora L. β . *tenuifolium* Rchb., feinblät-
teriger Eisenhut.

(*Potentilla caulescens* s. May S. 268. *Potentilla mi-
nima* s. Jun. S. 467. so wie die im Jul. S. 636. bemerk-
ten Pflanzen.)

56) *In Krautgärten.*

Fumaria media (s. auf bebautem Boden.)

57) *In Lachen.*

Potamogeton trichoides (s. Jul. S. 637.)

58) *Auf Lauberde.*

Arenaria trinervia (s. May S. 269.)

59) *In Laubwäldern.*

Hieracium silvestre (s. an Bächen.)

(*Potentilla alba* s. May S. 274. *Bromus giganteus*,
Mycelis muralis, *Urtica dioica* s. Jun. S. 468 ff. und alle
im Jul. S. 637. angeführten Pflanzen.)

60) *Auf Lehmboden.*

(*Spergula vulgaris*, *Sonchus arvensis* s. Jun. S. 469.
so wie die im Jul. S. 638. angegebenen Pflanzen.)

61) *Auf Leinäckern.*

(*Spergula maxima* s. Jun. S. 469. *Cuscuta Epilinum*
s. Jul. S. 638.)

62) *Am südlichen Litoralle.*

Plumbago, V. Bleiwurz.

Pl. europaea L. europäische Bl.

Beta, V. Mangold.

B. maritima L. Meerstrands-M.

*Am südlichen Litorale.***Asparagus, VI. Spargel.****A. aphyllus L., blattloser Sp.****Agave, VI. Agave.****A. americana L. amerikanische A.****Artemisia XIX. Beifuss.****A. caerulescens L. bläulicher B.****Smilax, XXII. Smilax.****Sm. aspera L. stachelblättrige Stechwinde.****Sm. nigra W., schwarzbeerige Stechwinde.**

(*Anchusa angustifolia*, *Statice angustifolia*, *Linaria litoralis*, *Berteroa viridis*, *Erysimum odoratum*, *Matthiola incana* s. May S. 276 ff. *Polypogon monspeliensis*, *Polygonum maritimum*, *Stachys spinulosa*, *Micromeria Juliana*, *Rapistrum glabrum*, *Trifolium tomentosum*, *Inula Bubonium*, *Aristolochia Clematitis* s. Jun. 470 ff. und vom Jul. S. 638. *Crypsis schoenoides*; *Andropogon hirtus*, *Pollinia distachys*, *Eragrostis verticillata*, *Asterocephalus Scopoli* bis *Heracleum pyrenaicum*, *Bupleurum semicompositum*, *Linum nodiflorum*, *Hemerocallis fulva*, *Punica Granatum*, *Nepeta violacea*, *Calamintha Nepeta*, *Corydalis ochroleuca*. *Leontodon Brumati* bis *Inula viscosa*, *Buphthalmum spinosum*, *Ecbalium agreste*, *Mercurialis ambigua*.)

63) Auf lockerem Boden.**Arenaria trinervia (s. May S. 280.)****64) An und auf Mauern.****Artemisia campestris (s. an Feldrainen.)****A. scoparia (s. ebendasselbst.)****Erigeron canadensis (s. auf Brachen.)****E. serotinus (s. an trocknen Anhöhen.)****Achillea nobilis (an grasigen Anhöhen.)**

(*Veronica arvensis*, *Campanula rotundifolia*, *Gypsophila rigida*, *Chelidonium majus*, *Linaria Cymbalaria*, *Berteroa incana*, *Lepidium campestre*, *L. ruderale*, *Sisymbrium officinale*, *Diplotaxis muralis*, *Geranium lucidum*, *G. molle*, *G. pusillum*, *Corydalis lutea*, *Hieracium murorum* s. May S.

An und auf Mauern.

280 ff. *Centranthus ruber*, *Poa nemoralis*, *Bromus sterilis*, *Hordeum murinum*, *Cerastium triviale*, *Potentilla argentea*, *Hyssopus officinalis*, *Antirrhinum majus*, *Sisymbrium polyceratum*, *Diplotaxis tenuifolia*, *Mycelis muralis*, *Crepis tectorum*, *Chondrilla juncea*, *Senecio squalidus*, *S. viscosus*, *Diplopappus annuus*, *Urtica urens* s. Jun. S. 472 ff. und vom Jul. S. 641. *Digitaria sanguinalis*, *Festuca rubra* bis *Ficus Carica*.)

65) *Am Meere.*

Salicornia, II. Glasschmalz.

S. herbacea L. krautartiges Glasschmalz.

Salsola Kali (s. an Flüssen.)

Erythraea, V. Tausendguldenkraut.

E. linarifolia Pers., schmalblättriges T.

Schoberia, V. Schoberia.

Sch. maritima C. A. May (*Chenopodium maritimum* L.) Meerstrands - Gänsefuss

a) *Am nördlichen Meere.*

Zostera, I, (XXI.) Wier, Wasserriemen.

Z. uninervis Vahl., Forks. einnervige W.

Chara, I. (XXI.) Armleuchter.

Ch. nidifica Müll.

Corispermum intermedium (s. in Flugsand.)

Suaeda, V. Sternhorn.

S. hirsuta Richb., (*Salsola hirsuta* L.) rauhes Salzkraut.

Halimus, V. Keilmelde.

H. pedunculatus Wallr., *Atriplex pedunculata* L.) stielfrüchtige Melde.

Pyrethrum, XIX. Bertramswurz.

P. maritimum Sm., Meerstrands - B.

b) *Am südlichen Meerstrande.*

Salicornia (s. oben) *fruticosa* L. strauchartiges Glasschmalz.

Am südlichen Meerstrande.

(*Sagina procumbens* γ ., *Polygonum aviculare* α . (s. May S. 284. *Veronica maritima*, *Plantago maritima*, *Orobis maritimus*. *Blysmus rufus* s. Jun. 475 f. sowie die im Jul. S. 643. bis 646. angemerkten Pflanzen.)

66) *Auf Moorboden.*

Galium, IV. Labkraut.

G. uliginosum L. Morast-Labkraut.

Gentiana verna zum zweitenmal (s. April.)

Polygonum minus (s. auf Brüchen.)

Hypericum elodes (s. in Gräben.)

(*Pinguicula flavescens* s. May S. 286. *Eriophorum alpinum*, *Calamagrostis silvatica*, *Tofieldia calyculata*, *Calla palustris*, *Alectorolophus major*, *Arnica montana*, *Nasturtium microphyllum*, *Listera cordata*, *Juncus squarrosus* s. Jun. S. 477 ff. und die im Jul. S. 646 f. aufgeführten Pflanzen.)

67) *In Morästen.*

Chara I. (XXI) Armleuchter.

Ch. gracilis Sm. schlanker A.

Aira III. Schmiele.

A. uliginosa Weihe, Morastschmiele.

(Ausser diesen blühen noch die im Jul. S. 648. aufgezzeichneten Pflanzen.)

68) *In Nadelwäldern.*

(*Silene chlorantha*, *Goodyera repens*, *Corallorrhiza innata* s. Jul. S. 648.)

69) *Auf nassem Boden.*

(*Scheuchzeria cyperoides*, *Saccharum Ravennae* s. Jul. S. 649.)

70) *In Obstgärten.*

(*Serratula tinctoria* δ . *dissecta* s. Jul. S. 649)

71) *An und in Pfützen.*

(*Callitriche stagnalis*, *Potamogeton gramineus* δ . *latifolius* s. Jun. S. 481f. *Anthemis* *Cotula*, *Pulicaria vulgaris* s. Jul. S. 649.)

72) *An Planken.*

(*Geranium molle*, *G. pusillum* s. May S. 292. *Bromus sterilis*, *Hordeum murinum* s. Jun. S. 482. *Chenopodium olidum*, *Amaranthus adscendens* s. Jul. 649.)

73) *An Quellen.*

Senecio Cacaliaster (s. in Gebüsch.)

Gentiana asclepiadea (s. in Gebirgsgegenden.)

(*Nasturtium officinale*, *Montia fontana* s. May S. 292 f. *Veronica Beccabunga*, *Chaerophyllum Cicutaria*, *Geranium palustre* s. Jun. S. 482. und alle im Jul. S. 650. angeführten Pflanzen.)

74) *Auf Ruinen.*

Alyssum montanum (s. an Felsen.)

(*Geranium robertianum*, *Corydalis lutea* s. May S. 293. *Antirrhinum majus* s. Jun. S. 483.)

75) *Auf Saatäckern.*

(*Scleranthus annuus* s. May S. 294. *Silene noctiflora* s. Jun. S. 483. *Eragrostis pilosa* s. Jul. S. 650.)

76) *An Salinen und auf Salzboden.*

a) *Um Salinen.*

Salicornia herbacea (s. am Meere.)

Salsola Kali (s. an Flüssen.)

Halimus pedunculatus (s. am nördlichen Meere.)

b) *Auf Salzboden.*

Kochia, V. *Kochie*.

K. prostrata *Schrad.*, (*Salsola prostrata* *L.*) liegendes Salzkraut.

Auf Salzboden.

(*Polygonum aviculare* δ . *polycnemum*, *Glyceria distans*, *Kochia Scoparia*, *Erythraea linarifolia* s. May S. 294f. *Plantago maritima*, *Triglochin maritimum* s. Jun. S. 484. und alle im Jul. S. 650 bis 652. angegebenen Pflanzen.)

77) *Auf Sand, Sandplätzen u. dgl.*a) *Auf Sandäckern.*

Myosotis arvensis (s. April.)

b) *Auf Sandebenen.*

Kochia prostrata (s. auf Salzboden.)

c) *Auf Sandboden.*

Polycarpon, IV. Saamling.

Polycarpon tetraphyllum L. *fil.*, (*Mollugo tetraphylla* L.) vierblättriges Nagelkraut.

d) *An sandigen Orten.*

Corispermum, I, Wanzensaame.

Corispermum nitidum Kit.

Artemisia campestris (s. auf Feldrainen.)

e) *Auf sandigem trocknem Boden.*

Syrenia, XV. Syrenie.

S. angustifolia Rchb., (*Erysimum angustifolium* Ehrh.) schmalblättriger Hederich.

f) *An sonnigen Sandhügeln.*

Pulsatilla vulgaris, zuweilen zum zweitenmale s. April S. 121.

(*Reseda lutea*, *Sagina apetala*, *Myosotis arvensis*, *Viola tricolor*, *Alsine rubra*, *Dianthus Armeria*, *Trifolium repens*, *Kochia arenaria*, *Carex Oederi*, *Berteroa incana*, *Agropyrum cristatum*, *Biscutella laevigata*, *Hieracium Pilosella*, *Armeria vulgaris* s. May S. 295ff. *Plantago major*, *Spergula vulgaris*, *Chondrilla acanthophylla*, *Corynephorus canescens*, *Arrhenatherum avenaceum* b. *nodosum*, *Scleranthus perennis*, *Spergula arvensis*, *Papaver Argemone*, *P. Rhoeas*, *Geranium sanguineum*, *Ononis repens*, *Coronilla varia*, *Eragrostis poaeformis*, *Juncus alpinus*, *J. supinus*,

An sonnigen Sandhügeln.

Silene inflata, *Plantago maritima*, *Juncus Tenageia*, *Polygonum arvense*, *Oenothera biennis*, *Hypochaeris radicata*, *Thymus Serpyllum*, *Potentilla norvegica*, *Agropyrum glaucum*, *Chenopodium Botrys*, *Rapistrum hirtum*, *Taraxacum serotinum*, *Eragrostis megastachys*, *Chondrilla rigens*, *Senecio abrotanifolius*, *Dianthus arenarius* s. Jun. S. 485 ff. und vom Jul. S. 652. bis 655. *Chenopodium acutifolium* bis *Cynodon Dactylon*, *Asterocephalus ochroleucus*, *A. suaveolens*, *Herniaria hirsuta*, *Calluna vulgaris* bis *Alectorolophus hirsutus*, *Silene tatarica*, *Saponaria officinalis*, *Picreus pannonicus* bis *Linaria genistaefolia*.)

78) An schattigen Orten.

Carpesium, Kragenblume.

C. abrotanoides L. stabwurzartige Kr.

(*Myosotis sparsiflora*, *Geranium pyrenaicum*, *G. lucidum* *G. robertianum*, *Cyclamen europaeum* s. May S. 302 f. *Rubus caesius*, *Geranium palustre* s. Jun. S. 493. und alle im Jul. S. 656. angemerkten Pflanzen.)

79) Auf Schlamm Boden.

Chara gracilis (s. in Morästen.)

(Ausserdem blühen noch die im Jul. S. 656f. angezeigten Pflanzen.)

80) Schmarotzend.

(*Orobanche ramosa* s. Jun. S. 494. so wie die im Jul. S. 657. aufgeführten Pflanzen.)

81) Auf Schutt.

Salsola Kali (s. an Flüssen.)

Kochia Scoparia (s. an Ackerrändern.)

Erigeron canadensis (s. auf Brachen.)

E. serotinus (s. an trocknen Anhöhen.)

(*Veronica arvensis*, *V. polita*, *Polygonum aviculare* α . *triviale*, *Cerastium triviale*, *Reseda lutea*, *Chelidonium majus*,

Auf Schutt.

Lamium amplexicaule, *Capsella Bursa pastoris*, *Lepidium campestre*, *L. ruderales*, *Sisymbrium officinale*, *Diploaxis muralis*, *Erodium cicutarium*, *E. moschatum*, *Geranium dissectum*, *G. molle*, *G. robertianum*, *Malva rotundifolia*, *Medicago lupulina*, *Lapsana communis*, *Pyrethrum Parthenium*, *Senecio vulgaris* s. May S. 303 ff. *Echium vulgare*, *E. Wierzbickii*, *Verbascum sinuatum*, *Solanum nigrum*, *Conium maculatum*, *Aethusa Cynapium*, *Anthriscus vulgaris*, *Tribulus terrestris*, *Silene inflata*, *Reseda Luteola*, *Agrimonia Eupatorium*, *Hyssopus officinalis*, *Erysimum cheiranthoides*, *Diploaxis tenuifolia*, *Abutilon Avicennae*, *Althaea hirsuta*, *Hibiscus Trionum*, *Mycelis muralis*, *Barkhausia foetida*, *B. graveolens*, *Senecio squalidus*, *S. viscosus*, *Diplopappus annuus*, *Urtica dioica*, *U. urens* s. Jun. S. 495 ff. und die im Jul. S. 657. bis 660. aufgezeichneten Pflanzen.)

S2) *An und in Seen.*A. *An Seen.*

Blitum crassifolium (s. an Flüssen.)

Um Seen auf Salzwiesen.

Erythraea, V. Tausendguldenkraut.

E. linarifolia Pers. (*Gentiana linarifolia Lam.*)
schmalblättriges T.

B. *In Seen.*

Chara, I, (XXI.) Armleuchter.

Ch. aspera W., rauher A.

Ch. barbata Meyen., bartiger A.

Ch. translucens Pers.

Ch. vulgaris L. gemeiner A.

(*Trapa natans* s. May S. 307. *Blysmus rufus*, *Euphorbia pilosa*, *Chara flexilis*, *Potamogeton compressus*, *P. gramineus*, *Alisma parnassifolium*, *Udora lithuanica* s. Jun. S. 498 f. und die im Jul. S. 660 f. hemerkten Pflanzen.)

Am Seestrande (s. am Meere.)

83) *An sonnigen Orten.*

Nepeta, XIV. Katzenmünze.

N. nuda L. kahle K.

An sonnigen grasigen Orten.

Pteroselinum alsaticum (s. an grasigen Orten.)

(Stachys palustris s. Jun. S. 499. Stipa Aristella, Marrubium peregrinum s. Jul. S. 661.)

84) *Auf Steinhaufen.*

(Rubus caesius s. Jun. S. 500.)

85) *An steinigen Plätzen.*

(Agropyrum cristatum, Viburnum Tinus, Corydalis lutea, Cynanchum Vincetoxicum, Geranium robertianum s. May S. 308 ff. Agropyrum glaucum, Arenaria ciliata, Geranium columbinum, Corydalis ochroleuca, Silene inflata Var., Senecio abrotanifolius s. Jun. S. 500 f. und alle im Jul. angeführten Pflanzen.)

86) *Auf Stoppeläckern.*

(Polygynum aviculare γ . neglectum s. May S. 310.)

87) *Auf Strandwiesen.*

Leontodon pratensis (s. an Flüssen.)

88) *An und in Strassen.*

(Polygonum aviculare α . triviale s. May S. 310. Barkhausia graveolens, Tribulus terrestris s. Jun. S. 502. Chenopodium ficifolium, Anni majus, Melissa officinalis s. Jul. S. 663.)

89) *An und in Sümpfen und an sumpfigen Orten.*

A. *An Sümpfen und sumpfigen Orten.*

a) *An Sümpfen.*

Leersia, III. Leersie.

L. oryzoides Sw. (Phalaris oryzoides L.) reissartiges Glanzgras.

*An Sümpfen.***Juncus**, VI. Simse.*J. diffusus* Hoppe, weitschweifige S.**Mentha**, XIV. Minze, Münze.*M. acutifolia* Sw., spitzblättrige M.*M. silvestris* L., Wald-M.**Odontites serotina** (s. auf feuchten Aeckern.)**Bidens cernua**, *B. tripartita* (s. in Gräben.)**Pyrethrum** XIX. Bertramswurz.*P. uliginosum* W. Kit.,b) *An sumpfigen Orten.***Orthopogon**, III. Geradbart.*P. Burmanni* R. B., (*Panicum hirtellum* Burm.)**Polygonum minus** (s. auf Brüchen.)**Hypericum elodes** (s. in Gräben.)**Aster**, XIX. Sternblume.*A. pannonicus* Jacq. ungarische Sternblume.*In Sümpfen in Gebüsch.***Mentha gentilis** (s. an Bächen.)

(*Glyceria distans*, *Spiraea denudata*, *Nasturtium officinale*, *N. palustre*, *N. silvestre*, *Myosotis palustris* s. May S. 310 ff. *Veronica Anagallis*, *V. maritima*, *Cyperus glomerata*, *Allium Schoenoprasum*, *Juncus conglomeratus*, *I. effusus*, *I. glaucus*, *Malachium aquaticum*, *Geranium palustre*, *Althaea officinalis*, *Euphorbia pilosa*, *Glyceria fluitans*, *Plantago major*, *Galium palustre*, *Alisma ranunculoides*, *Calla palustris*, *Scutellaria galericulata*, *Nasturtium amphibium*, *Cirsium oleraceum*, *Callitriche autumnalis*, *Plantago altissima*, *Triglochin maritimum*, *Lythrum virgatum*, *Pedicularis Sceptrum*, *Willemetia apargioides* s. Jun. S. 502 ff. und die im Jul. S. 663 ff. angegebenen Pflanzen.)

90) *An und in Teichen.*a) *An Teichen.***Blitum crassifolium** (s. an Flüssen.)

An Teichen.

Cyperus fuscus und **C. virescens** (s. an grasigen, überschwemmten Plätzen.)

Bidens cernua (s. in Gräben.)

b) In Teichen.

Chara, I. (XXI.) Armlauchter.

Ch. aculeolata Ktzig.

Ch. aspera W., rauher A.

Ch. Braunii Gmel., Braun's A.

Ch. vulgaris L., gemeiner A.

Potamogeton, IV. Laichkraut.

P. gramineus L., grasartiges L. oder Saamkraut.

P. obtusifolius M. K. stumpfblättriges L. oder S.

P. plantagineus du Croz, wegerichartiges L. oder S.

Chara nidifica (s. am nördlichen Meere.)

In ruhigen Teichen.

Chara opaca (s. in Canälen.)

In tiefen Teichen.

Chara translucens (s. in Seen.)

(*Potentilla supina*, *Vigna leporina*, *Carex Oederi*, *Trapa natans*, *Potamogeton crispus*, *P. perfoliatus* s. May S. 314 ff. *Heleocharis ovata*, *Myosotis cespitosa*, *Potentilla norvegica*, *Nasturtium siifolium*, *Chara flexilis*, *Callitriche autumnalis*, *C. platycarpa*, *Glyceria fluitans*, *Potamogeton trichoides* s. Jun. S. 507 ff. und alle im Jul. S. 667. bis 669. angemerkten Pflanzen.)

91) In Thälern.

(*Trifolium spadiceum* s. Jun. S. 510. *Galeopsis versicolor*, *Jirasekia tenella* s. Jul. S. 669.)

92) Auf Thonboden.

(*Dianthus Armeria* s. May S. 316. *Sonchus arvensis*, *Taraxacum serotinum* s. Jun. S. 510. *Gnaphalium germanicum*, *Galeopsis Tetrahit*, *Crepis montana* s. Jul. S. 669.)

93) *Auf Torf.*

Galium, IV. Labkraut.

G. trifidum L. dreispaltiges L.

Auf überschwemmtem Torfmoor.

Chara barbata (s. in Seen.)

(*Heleocharis uniglumis*, *Callitriche autumnalis*, *C. platycarpa*, *Wahlenbergia hederacea*, *Oenanthe Lachenalii* s. Jun. S. 510 f. und alle im Jul. S. 670. angezeigten Pflanzen.)

94) *Auf Triften.*

Leontodon autumnalis (s. an Feldrainen.)

An bergigen sonnigen Triften.

Erigeron serotinus (s. an trocknen Anhöhen.)

Auf feuchten Triften.

Thrincia, XIX. Thrincie, Hundslattich.

Thr. hispida Rth., (Hyoseris taraxacoides Vill.)

Auf sonnigen Triften in kurzem Grase.

Spiranthes autumnalis (s. an sonnigen Anhöhen.)

Auf trocknen ganz durren Triften.

Hypochaeris, XIX Ferkelkraut.

H. Balbisii Lois. Balbis's Ferkelkraut.

Auf wüsten Triften.

Carlina vulgaris (s. an Ackerrändern.)

(*Myosotis versicolor*, *Armeria vulgaris*, *Cerastium triviale*, *Trifolium repens*, *Hieracium Pilosella*, *Leontodon hastilis*, *L. hispidus*, *Bellis perennis*, *Cerastium vulgatum*, *Viola tricolor*, *Stellaria media* s. May S. 318 ff. *Pimpinella Saxifraga*, *Linum catharticum*, *Dianthus deltoides*, *Agrimonia Eupatorium*, *Trifolium procumbens*, *Coronilla varia*, *Barkhausia graveolens*, *Arnica montana*, *Eryngium campestre*, *Thrincia hirta*, *Hypochaeris radicata*, *Helianthemum vulgare* s. Jun. S. 511 ff. und alle im Jul. S. 670 f. aufgeführten Pflanzen.)

95) *An trocknen Orten.*

Syrenia angustifolia (s. auf sandigem Boden.)

An trocknen Orten.

(*Veronica latifolia*, *Verbascum floccosum* s. Jun. S. 514. *Medicago media*, *Carduus crispus* α . *pinnatifidus* s. Jul. S. 627.)

96) *In Tümpeln.*

Chara, I. (XXI.) Armleuchter.

Ch. *batrachosperma* Thuill.

Ch. *gracilis* Sm. schlanker A.

Ch. *vulgaris* L. gemeiner A.

In klaren Tümpeln.

Ch. *nidifica* Müll.

(*Chara flexilis* s. Jun. S. 514.)

97) *Ueberall.*

(*Alopecurus pratensis*, *Poa annua*, *Bromus sterilis*, *Agropyrum repens*, *Plantago major*, *P. media*, *P. lanceolata*, *Lycopsis arvensis*, *Viola tricolor*, *Aegopodium Podagraria*, *Polygonum aviculare*, *P. Persicaria*, *Stellaria media*, *Arenaria serpyllifolia*, *Cerastium triviale*, *C. vulgatum*, *Chelidonium majus*, *Capsella Bursa pastoris*, *Erodium cicutarium*, *Trifolium pratense*, *Tr. repens*, *Taraxacum officinale*, *Senecio vulgaris*, *Bellis perennis* s. May S. 322ff. *Setaria viridis*, *Lolium perenne*, *Hordeum murinum*, *Echium vulgare*, *Solanum nigrum*, *Pimpinella Saxifraga*, *Oenothera biennis*, *Spergula arvensis*, *Rubus caesius*, *Berteroa incana*, *Leontodon hispidus*, *Achillea Millefolium*, *Urtica dioica*, *U. urens* s. Jun. S. 515f. und die im Jul. S. 672. bemerkten Pflanzen.

98) *An überschwemmten Orten.*

Cyperus fuscus und C. virescens (s. an grasigen Plätzen.

(*Carex Oederi*; *Nasturtium anceps*, *N. palustre* s. May S. 325. *Callitriche stagnalis*, *Heleocharis ovata*, *Beckmannia erucaeformis*, *Glyceria fluitans*, *Juncus bufonius*, *Potentilla supina* s. Jun. S. 517. und alle im Jul. S. 673f. angegebenen Pflanzen.)

99) *An Ufern. (Vergl. an Flüssen.)*

Armeria, V. Graselke.

A. vulgaris W. (Statice *Armeria* L.) gemeine G.
(*Spergula arvensis*, *Cyperus patuus* (s. Jun. S. 518
so wie die im Jul. S. 674 f. angemerkten Pflanzen.)

100) *Auf Urgebirgen.*

Phaca XVII. Berglinse.

Ph. australis L. südliche B. (Auf den höchsten
Urgebirgsalpen.)

(*Primula glutinosa*, *Potentilla salisburgensis* s. May S.
326. *Lloydia serotina*, *Pulsatilla alba*, *Callianthemum cori-*
andrifolium, *Saxifraga biflora*, *S. oppositifolia*, *Dianthus*
glacialis, *Geranium silvaticum* s. Jun. S. 518 ff. und die im
Jul. S. 675 ff. angezeigten Pflanzen.)

101) *Verwildert. (Vergl. Angebaut.)*

Agave americana (s. am südlichen Litorale.)

Mentha crispa (s. auf bebautem Boden.)

Aster XIX. Sternblume.

A. Novi Belgii L.

(Ausser diesen noch alle im Jul. S. 677 f. aufgeführ-
ten Pflanzen.)

102) *Auf und in Voralpen.*

Myosotis V. Vergissmeinnicht.

M. silvatica Ehrh. α . *alpestris*. Voralpen-V.

Gentiana campestris (s. in Berggegenden.)

Oreoselinum legitimum (s. auf Anhöhen.)

a) *In Voralpen an Bächen.*

Aconitum XIII. Eisenhut.

A. variegatum L. bunter Eisenhut.

b) *Auf Voralpen an feuchten Stellen.*

Achillea, XIX. Garbe.

A. dentifera Dec. Sudeten-Schaaugarbe.

c) *In Voralpen an quelligen Orten und auf Triften.*

Gentiana asclepiadeca (s. in Gebirgsgegenden.)

G. pannonica (s. auf Alpen S. 702.)

d) *In Voralpen auf Wiesen.*

Geracium, XIX. Sperberkraut.

G. prenanthoides (*Hieracium prenanthoides Vill.*)
hasensalatartiges Sperberkraut.

e) *In waldigen Voralpen.*

Aconitum variegatum (s. oben unter a.)

(*Bunium Bulbocastanum*, *Valeriana montana*, *Lilium Martagon*, *Alyssum Wulffenianum*, *Achillea tomentosa*, *Bupthallum salicifolium*, *Arabis alpina*, *Scrofularia glandulosa*, *Corydalis capnoides*, *Valeriana tripteris* s. May S. 326 ff. *Veronica officinalis*, *Elymus europaeus*, *Sieversia montana*, *Pulsatilla alba*, *Alectorolophus major*, *Levisticum vulgare*, *Dianthus silvestris*, *Sabulina Gerardi*, *Moehringia muscosa*, *Sedum atratum*, *Chaerophyllum aureum*, *Ch. hirsutum*, *Ch. maculatum*, *Stachys alpina*, *Anemone narcissiflora*, *Saxifraga aizoon*, *Saxifraga caesia*, *Kernera saxatilis*, *Hieracium villosum*, *Saxifraga stellaris*, *Cardamine resedifolia*, *Silene inflata* Var. *A. glabra* & *chlorophylla*, *Arenaria ciliata*, *Linum viscosum*, *Rumex alpinus*, *Aster alpinus*, *Chaerophyllum nemorosum*, *Ajuga pyramidalis*, *Hieracium aurantiacum*, *Geracium aureum*, s. Jun. S. 520 ff. und vom Jul. S. 678. *Calamagrostis montana* bis *Scabiosa longifolia*, *Laserpitium Siler* bis *Allium Victoralis*, *Cerastium ciliatum*, *Aconitum neubergense* bis *Sabulina striata*, *Veratrum nigrum* bis *Homogyne alpina*, *Gypsophila repens*, *Aconitum multifidum*, *Linaria angustifolia* bis *Myosotis suaveolens*, *Sonchus alpinus* bis *Senecio Doronicum*.)

103) *In Vorhölzern.*

(*Elymus europaeus* s. Jun. S. 526. *Geranium bohemicum*, *Althaea cannabina* (s. Jul. S. 683.)

104) *An und in Wäldern und an waldigen Orten.*

A. *An Waldrändern.*

Evonymus europaeus zuweilen zum zweitenmal
(s. May S. 332.)

An Waldrändern.

Nepeta pannonica (s. am Fusse der Gebirge.)

Hieracium sabaudum (s. an bewachsenen Anhöhen.)

H. umbellatum (s. an Feldrainen.)

Senecio, XIX. Kreuzkraut.

S. erucaefolius *Huds.* raukenblättriges Kr.

B. In Wäldern.

Laserpitium, V. Laser.

L. marginatum *W. Kit.*

Hypericum elodes (s. in Gräben)

Solidago, XIX. Goldrute.

S. Virgaurea *L.* gemeine G.

In schattigen Wäldern.

Polygonum minus (s. auf Brüchen.)

C. An feuchten Waldplätzen.

Mentha, XIV. Minze, Münze.

M. dentata *Mnch.* zahnblättrige M.

(*Veronica serpyllifolia*, *Dianthus Armeria*, *Scabiosa arvensis*, *Chaerophyllum aromaticum*, *Hieracium murorum*, *Valeriana tripteris*, *Arenaria trinervia*, *Arabis nemorensis*, *Geranium pyrenaicum*, *Trifolium montanum*, *Lapsana* communis, *Leontodon hastilis* s. May S. 332 — 344. *Veronica latifolia*, *Bromus sterilis*, *Oenanthe Lachenalii*, *Dianthus prolifer*, *Agrostemma Coronaria*, *Lychnis dioica*, *Rubus caesius*, *Carduus nutans*, *Euphorbia amygdaloides*, *Veronica officinalis*, *Euphorbia pilosa*, *Delphinium fissum*, *Prunella vulgaris*, *Lactuca stricta*, *Geum urbanum*; *Geranium sanguineum*, *Hypericum hirsutum*, *Lysimachia Nummularia*, *Stachys alpina*, *Astragalus glycyphyllos*, *Veronica maritima*, *Cirsium serratuloides*, *Tragopogon porrifolius*, *Diplopappus annuus*, *Anthericum Liliago*, *A. ramosum*, *Poa nemoralis*, *Agropyrum caninum*, *Aethusa Cynapium*, *Senecio silvaticus*, *Spiraea salicifolia*, *Calamagrostis silvatica*, *Hypericum montanum*, *Elymus europaeus*, *Trifolium elegans* s. Jun. S. 527 ff. und vom Jul. S. 683. *Verbascum speciosum* bis *Siler aquilegifolium*, *Scorodonia heteromalla* bis *Polygonum laxiflorum*, *Clematis Flammula*

An feuchten Waldplätzen.

bis *Lactuca augustana*, *Picris hieracioides* bis *Trifolium hybridum*.)

105) *An Wällen.*

Melilotus, XVII. Melotte.

M. arguta *Rchb.*

(Ausserdem blühen noch die im Jul. S. 689. aufgezeichneten Pflanzen.)

106) *An und im Wasser.*

a) *An Wassergräben.*

Mentha XIV. Minze, Münze.

M. canescens *Rth.* greisgraue *M.*

M. odorata *Sole.*, kahle, wohlriechende *M.*

M. silvestris *L.*, Wald-*M.*

b) *In kleinen stehenden Wassern.*

Chara I. (XXI.) Armleuchter.

Ch. tenuissima *Deso.*

c) *In salzigem Wasser.*

Ch. aspera *Wild.*

(*Potamogeton acutifolius*, *P. obtusifolius* (nicht *altifolius*, was ein Druckfehler ist) *P. pusillus*, *P. spatulatus*, *P. lucens*, *Alisma natans*, *A. Plantago*, *Nymphaea alba* s. Jun. S. 539 f. und die im Jul. S. 689 f. bemerkten Pflanzen.)

107) *An Wegen.*

(*Veronica serpyllifolia*, *Alopecurus agrestis*, *Scabiosa arvensis*, *Myosotis versicolor*, *Campanula rotundifolia*, *Polygonum aviculare* α . *triviale*, *Cerastium triviale*, *Lamium album*, *Berteroa incana*, *Capsella Bursa pastoris*, *Sisymbrium officinale*, *Cytisus austriacus*, *Medicago lupulina*, *Taraxacum officinale* s. May S. 346 ff. *Salvia verticillata*, *Gastridium lendigerum*, *Eragrostis megastachya*, *Poa trivialis*, *Agropyrum repens*, *Plantago maritima*, *Pl. media*, *Echium italicum*, *E. vulgare*, *E. Wierzbickii*, *Verbascum*

An Wegen.

floccosum, Eryngium campestre, Tribulus terrestris, Silene inflata Var., Agrimonia Eupatorium, Reseda Luteola, Potentilla argentea, Prunella vulgaris, Rapistrum perenna, Diplotaxis tenuifolia, Abutilon Avicennae, Carduus nutans, C. polyanthemos, Achillea Millefolium, Centaurea Jacea, Urtica dioica s. Jun. S. 541 ff. und fast alle vom Jul. S. 690 ff. nämlich Salvia nemorosa bis Eryngium amethystinum, Linum austriacum bis Carduus crispus, Cirsium lanceolatum bis Xanthium spinosum.)

108) *Auf Weideplätzen.*

Colchicum, VI. Zeitlose.

C. autumnale L., Herbst-Zeitlose.

(Ranunculus Thora s. May S. 351)

109) *In Weidengebüsch.*

(Cuscuta monogyna, Euphorbia lucida s. Jul. S. 692.)

110) *An Weihern (s. an Teichen.)*111) *An und in Weinbergen.*

Cervaria Rivini (s. an sonnigen Anhöhen.)

Fumaria media (s. auf bebautem Boden.)

(Alopecurus agrestis, Trinia pumila, Dianthus Armeria, Geranium lucidum, Fumaria parviflora s. May S. 352 ff. Galium saccharatum, Physospermum aquilegifolium, Teucrium Botrys, Phlomis tuberosa, Abutilon Avicennae s. Jun. S. 545 f. und die im Jul. S. 693. angeführten Pflanzen.)

112) *Auf Wiesen.*

Primula elatior zuweilen zum zweitenmal s. May S. 356.

Colchicum autumnale (s. auf Weideplätzen.)

Polygonum, VIII. Knöterig.

P. laxum Rchb. schlaffer Knöterig.

Melilotus arguta (s. an Wällen.)

a) *Auf Wiesen in Berggegenden.*

Gentiana campestris. (s. in Berggegenden.)

b) *Auf Wiesen in Voralpen.*

Geracium prenanthoides (s. in Voralpen.)

c) *Auf feuchten Wiesen.*

Gentiana Amarella (s. auf Dünen.)

Iuncus VI. Simse.

I. pratensis Hoppe Wiesen-Simse.

d) *Auf moorigen Wiesen.*

Mentha XIV. Minze, Münze.

M. crenata Beck. gekerbte *M.*

e) *An Wiesenrändern.*

Hieracium umbellatum (s. an Feldrainen.)

Solidago Virgaurea (s. in Wäldern.)

(*Veronica serpyllifolia*, *Alopecurus nigricans*, *A. pratensis*, *Arrhenatherum avenaceum*, *Galium Mollugo*, *Alchimilla vulgaris*, *Pimpinella magna*, *Lathyrus sepium*, *Vicia sepium*, *Trifolium pratense*, *Leontodon hispidus*, *Chrysanthemum Leucanthemum*, *Carex Oederi*, *Viola rothomagensis*, *Carum Carvi*, *Nasturtium officinale* s. May S. 355ff. *Veronica latifolia*, *V. maritima*, *Poa trivialis*, *Asterocephalus columbarius*, *Plantago decumbens*, *Sanguisorba officinalis*, *Linum catharticum*, *Agrimonia Eupatorium*, *Erodium pimpinellifolium*, *Trifolium procumbens*, *Arnica montana*, *Achillea Millefolium*, *Poa sudetica*, *Astragalus Onobrychis*, *Ajuga pyramidalis*, *Vignea saxatilis*, *Beckmannia erucaeformis*, *Silene pratensis*, *Oenanthe Lachenalii*, *Veratrum album*, *V. Lobelianum*, *Phlomis tuberosa*, *Tragopogon porrifolius*, *Scorzonera parviflora*, *Cirsium oleraceum*, *Althaea officinalis*, *Trifolium spadiceum*. *Medicago prostrata*, *Orobis palustris*, *Galium verum*, *Taraxacum serotinum*, *Lysimachia Nummularia*, *Nasturtium microphyllum*, *Anthericum ramosum* s. Jun. S. 546ff. und die im Jul. S. 693. bis 696. angegebenen Pflanzen.)

113) *Auf wüsten Plätzen.*

Mentha sativa (s. an Bächen.)

Auf wüsten Plätzen.

Erigeron canadensis (s. auf Brachen.)

(Ausser diesen blühen noch die im Jul. S. 697. ange-
merkten Pflanzen.)

114) *An Zäunen.*

Evonymus europaeus (zuweilen zum zweitenmal
s. May S. 365.)

Althaea cannabina (s. in Gebüsch.)

(Arrhenatherum avenaceum, Chelidonium majus, Cle-
matis Viticella, Lepidium ruderales, Geranium pusillum, G.
pyrenaicum, Lathyrus sepium s. May S. 365 ff. Bromus
sterilis, Avena pubescens, Hordeum murinum, Agropyrum
repens, Galium Aparine, G. tricornis, Verbascum sinuatum,
Aethusa Cynapium, Aegopodium Podagraria, Anthriscus
vulgaris, Anthericum ramosum, Lychnis dioica, Agrimonia
Eupatorium, Bryonia alba, Br. dioica s. Jun. S. 556 ff. und
alle im Jul. S. 697 ff. angezeigten Pflanzen).

SEPTEMBER.

Manche Gewächse, welche schon im Frühlinge geblüht haben, blühen in diesem Monate zum zweitenmal. Diese werden hier mit Hinweisung auf den Monat, in welchem sie schon vorgekommen sind, angeführt; diejenigen aber, welche von den vorhergehenden Monaten an bis in den Herbst blühen, werden in Klammern gesetzt.

1) *An Abhängen.*

Asperugo procumbens (s. April.)

Gentiana ciliata (s. Jul.)

2) *An Ackerrändern.*

(*Reseda lutea*, *Sisymbrium officinale*, *Lotus corniculatus* s. May S. 157 f. *Agrostis stolonifera*, *Lolium perenne*, *Eryngium campestre*, *Lychnis dioica*, *Euphorbia nicaeensis* s. Jun. S. 368 ff. *Falcaria Rivini*, *Galeopsis bifida*, *Stachys germania*, *Malva moschata*, *Medicago media* s. Jul S. 560. *Kochia Scoparia* s. Aug. S. 699.

3) *Auf Aeckern.*

Veronica hederacfolia (s. März.)

Myosurus minimus (s. April.)

Oxalis stricta (s. April.)

Thlaspi arvense (s. April.)

(*Veronica opaca*, *Scabiosa arvensis*, *Sagina procumbens*, *Myosotis intermedia*, *Anagallis arvensis*, *Convol-*

Auf Aeckern.

vulus arvensis, Rumex Acetosella, Stellaria media, Erodium moschatum, Medicago Gerardi, Matricaria Chamomilla, Neslia paniculata, Nasturtium palustre, N. silvestre, Erodium cicutarium s. May S. 158 ff. Sherardia arvensis, Tribulus terrestris, Papaver Rhoeas, Delphinium Consolida, Antirrhinum Orontium, Malva rotundifolia, Pisum arvense, Ervum hirsutum, Crepis tectorum, Anthemis arvensis, Orbanche ramosa, Acinos thymoides. Echium vulgare s. Jun. S. 371 ff. Centaurea Cyanus s. Jun. S. 441. Digitalia ciliaris, D. filiformis, D. sanguinalis, Plantago Psyllium, Polygonum Convolvulus, Euphorbia exigua, Adonis autumnalis, Stachys annua, Mentha arvensis, Linaria simplex, Melampyrum arvense, Trifolium arvense, Cirsium arvense, Chrysanthemum segetum. Pyrethrum inodorum, Centaurea Scabiosa, Echinochloa Crus galli, Senecio erraticus, Hypericum humifusum s. Jul S. 560 ff. Linaria commutata, L. spuria, Bidens bipinnata, Odontites serotina, Gypsophila serotina s. Aug. S. 700.)

4) *Auf Alpen und in Alpengegenden. (Vergl. Kalkalpen, Urgebirge, Voralpen.)*

Alchimilla fissa (s. May.)

Leontodon XIX. Löwenzahn.

L. hastilis L. Var. β . nitidus.

Auf den höchsten Alpen an Gletschern.

Gentiana, V. Enzian.

G. prostrata Hänke niedergestreckter Enzian.

(Valeriana montana, Alchimilla alpina, Androsace Chamaejasme, Saxifraga rotundifolia, Pulsatilla alba, Arabis alpina, Ranunculus alpestris, Saxifraga stellaria, Veronica alpina, V. aphylla, Gentiana acaulis, Potentilla aurea, Rumex scutatus, Acinos alpinus, Geracium aureum, Carduus carlinaefolius, Noccaea alpina, Biscutella laevigata, Moehringia muscosa, Ranunculus aconitifolius, Silene acaulis, Lotus corniculatus, Homogyne alpina, Senecio alpinus s. May S. 165 ff. Juncus alpinus. Toffieldia calyculata, Silene inflata Var. Cucubalus viridis Lam., Saxifraga caesia, Ranunculus alpestris, Anemone narcissiflora, Lloydia serotina, Silene inflata Var. A. α und β . s. Jun. S. 377 ff. Avena al-

Auf und in Alpen.

pestris, Heracleum palmatum, Daphne striata, Aconitum Cammarum, A. formosum, A. Napellus, A. neubergense, Acinos alpinus, Crepis grandiflora, Carduus carlinaefolius, Homogyne alpina, H. discolor, Dianthus Scheuchzeri, Saxifraga aizoides, Trifolium badium, Euphrasia salisburgensis, Geranium aureum, Hypochaeris helvetica, Avena Scheuchzeri, Gnaphalium Leontopodium, Sedum repens, Silene acaulis Var. γ . und δ . Chrysanthemum alpinum, Chr. Halleri, Linaria alpina, Gentiana bavarica, Nigitrella angustifolia, Gentiana nivalis, Hieracium angustifolium, Viola cenisia, Erigeron alpinus, Heracleum flavescens, H. longifolium s. Jul. S. 565 ff. Galium trifidum, Aconitum variegatum, Hieracium furcatum, Leontodon caucasicus, Carlina longifolia, Aronicum Bauhini, Achillea impunctata, Trifolium cespitosum, Gentiana pannonica, Avena distichophylla, Lomatogonium carinthiacum, Aronicum glaciale, Achillea nana, Ranunculus acris α . R. Villarsii, Silene pudibunda s. August S. 701 ff.)

5) *Angebaut oder angepflanzt (und zum Theil verwildert.)*

Crocus, III. Safran.

Cr. sativus Lob., ächter S., Herbstsafran.

(Rosa damascena, Calendula officinalis, s. May S. 178. Asterocephalus atropurpureus, Lycium barbarum, L. europaeum, Allium fistulosum, A. Schoenoprasum, Silene inflata Var. γ ., Agrimonia repens, Prunus semperflorens, Geranium striatum, Althaea rosea, Phaseolus multiflorus, Ph. nanus, Ph. vulgaris, Cucurbita maxima, C. Melopepo, C. Pepo, Lagenaria vulgaris s. Jun S. 391 ff. Impatiens Balsamina, Asclepias syriaca, Beta Cicla, B. vulgaris, Amaranthus caudatus, Cucumis Cantalupo, C. Citrullus, C. Melo, C. sativus s. Jul S. 585 ff. Dipsacus fullonum, Artemisia Dracunculus s. Aug. S. 705.)

6) *Auf Anhöhen.*

Mandragora, V. Alraune.

M. vernalis Bertol., (Atropa Mandragora L.)

Alraun - Tollkraut. (Auf sonnigen Anhöhen in Hochgebirgsgegenden.)

*Auf Anhöhen.***Gentiana, V. Enzian.**

G. germanica *W.* deutscher E. (in Berggegenden.)

(*Leontodon hispidus*, *Myosotis intermedia*, *Armeria vulgaris*, *Hieracium Pilosella*, *Lepidium campestre* s. May S. 181 ff. *Asterocephalus columbarius*, *Geranium columbinum*, *Helianthemum vulgare* s. Jun. S. 396. *Asterocephalus suaveolens*, *Erythraea Centaurium*, *Stachys germanica* s. Jul S. 587. und vom August S. 706. *Oreoselinum legitimum* bis *Seseli bienne*, *Spiranthes autumnalis*, *Erigeron serotinus*.)

7) Auf aufgeschwemmtem Boden.

(*Reseda lutea*, *Nasturtium silvestre* s. May S. 185. *Erodium pimpinellifolium* s. Jun S. 398. *Reseda Luteola* s. Jul S. 589.)

8) An und in Bächen.**Ranunculus Flammula (s. May.)**

(*Veronica serpyllifolia*, *Myosotis palustris*, *Nasturtium officinale*, *N. silvestre* s. May S. 186. *Malachium aquaticum*, *Callitriche autumnalis* s. Jun. S. 399 f. *Apium graveolens*, *Aconitum Cammarum*, *Galeopsis Tetrahit*, *G. versicolor*, *Tanacetum vulgare*, *Senecio erraticus*, *Carduus Personata*, *C. crispus* β . *integrifolius* s. Jul S. 589. und die im August S. 707. angeführten Pflanzen.)

9) An Baumstämmen in Wäldern schmarotzend.**Hedera V. Epheu.**

H. Helix gemeiner Epheu.

10) Auf bebautem Boden.

Asperugo procumbens (s. April.)

Oxalis stricta (s. April.)

Glechoma hederaceum (s. April.)

Linaria minor (s. May.)

Sisymbrium Sophia (s. May.)

(*Blitum Bonus Henricus*, *Veronica serpyllifolia*, *Valerianella coronata*, *Convolvulus arvensis*, *Stellaria media*,

Auf bebaudem Boden.

Cerastium triviale, C. vulgatum, Oxalis corniculata, Euphorbia Lathyris, Lamium album, L. amplexicaule, Capsella Bursa pastoris, Lepidium campestre, Geranium molle, G. pusillum, G. pyrenaicum, Medicago lupulina, Lapsana communis, Sonchus asper, S. oleraceus, Senecio vulgaris s. May S. 188 ff. Poa annua, Solanum nigrum, Aethusa Cynapium, Lychnis dioica, Euphorbia Peplus, Erysimum cheiranthoides, Fumaria officinalis, Vicia sativa, Senecio squalidus, Urtica urens s. Jun S. 400 ff. Ferner vom Jul S. 591. Blitum capitatum, Bl. virgatum, Digitaria ciliaris, Borrago officinalis bis Atriplex patula, Polygonum amphibium bis Saponaria officinalis, Galeopsis Tetrahit, Satureja hortensis, Mentha rubra, Amaranthus retroflexus bis Mercurialis annua und die im August S. 708. angegebenen Pflanzen.)

11) *An und auf Bergen.*

Iris biflora (s. May.)

Asperugo procumbens (s. April.)

(Agropyrum cristatum, Trifolium montanum s. May S. 192. ff. Pimpinella Saxifraga, Potentilla micrantha s. Jun. S. 403 f. Silene Otites, Corydalis lutea s. Jul S. 594. Oreoselinum legitimum, Angelica pyrenaica, Artemisia austriaca, Cineraria crassifolia s. Aug. S. 708 f.)

12) *In Berggegenden.*

Auf Anhöhen und Wiesen.

Gentiana germanica (s. auf Anhöhen.)

(Neslia paniculata, Geranium pyrenaicum s. May S. 195. Impatiens Noli tangere, Circaea intermedia, Aconitum Cammarum s. 595 f. Gentiana campestris, Avena distichophylla s. Aug. S. 709.)

13) *In Bergthälern.*

Auf dem Gries der Bergströme.

Arabis arenosa (s. April S. 69.)

14) *In Bergwäldern.*

(Fragaria semperflorens s. May S. 199. Cornus sanguinea, Origanum vulgare, Hieracium silvaticum, Salvia glutinosa)

In Bergwäldern.

nosa s. Jun S. 409. Pteroselinum Chabraei, Mentha rubra s. Jul S. 596. Senecio tenuifolius s. August S. 709.)

15) Auf Bergwiesen.

(Leontodon hastilis s. May S. 202. Euphorbia nicaeensis s. Jun S. 412. Seseli bienne s. Aug. S. 710.)

16) Auf Bruchäckern.

Rumex Acetosella (s. May.)

(Myosotis arvensis, Lamium amplexicaule, L. purpureum s. May S. 204. Rubus caesius, Anthemis arvensis s. Jun S. 413. Galeopsis Ladanum, Trifolium arvense, Tr. campestre, Hypericum humifusum s. Jul S. 598. Erigeron canadensis s. Aug. S. 710.)

17) Auf Brüchen.

(Polygonum minus s. Aug. S. 710.)

18) In Buchenwäldern.

(Vignea guestphalica s. Jul S. 598.)

19) In Canälen.

(Chara opaca s. Aug. S. 710.)

20) An Dämmen.

(Ranunculus repens s. May S. 205.)

21) In Dörfern.

(Polygonum Hydropiper s. August S. 711.)

22) Auf Dünen.

(Senecio denticulatus s. Jul S. 599. Gentiana Amarella s. Aug. S. 711.)

23) Auf und um Dünger.

(Blitum rubrum bis Atriplex microsperma s. Jul S. 599 f.)

24) *Auf dörren Plätzen.*

Artemisia XIX. Beifuss.

A. rupestris L. niedriger B. (Auf dürrem salzhaltigen Boden.)

(*Pimpinella Saxifraga*, *Rubus caesius*, s. Jun S. 414. *Conyza squarrosa*, *Silene Otites* s. Jul S. 600, *Euphorbia serotina* s. Aug. S. 711.)

25) *Auf Feldern.*

(*Veronica agrestis*, *V. opaca*, *V. serpyllifolia* s. May S. 207.)

26) *An Feldrainen und Feldrändern.*

Cerastium arvense (s. April.)

Euphorbia Cyparissias (s. April.)

(*Armeria vulgaris*, *Polygonum aviculare* α . *triviale*, *Euphorbia Esula*, *Poterium Sanguisorba* s. May S. 208 ff. *Salvia verticillata*, *Asterocephalus columbarius*, *Galium verum*, *Verbascum nigrum*, *Linum catharticum*, *Achillea Millefolium*, *Centaurea Jacea*, *Agrimonia Eupatorium*, *Dianthus deltoides* s. Jun S. 415 ff. Vom Jul S. 601. *Andropogon Ischaemum*, *Asterocephalus ochroleucus* bis *Silene Otites*, *Linaria vulgaris* bis *Crepis virens*, *Lappa tomentosa* bis *Centaurea Scabiosa*, *Atriplex tatarica* und alle im August S. 712. angemerkten Pflanzen.)

27) *An Felsen.*

An schattigen Felsen besonders in Voralpen.

Peltaria alliacea (s. April.)

(*Campanula rotundifolia*, *Cynanchum Vincetoxicum*, *Linaria Cymbalaria*, *Biscutella laevigata*. *Corydalis lutea*, *Genista germanica*, *Hieracium murorum*, *Poterium glaucescens*, *Myosotis intermedia*, *Noccaea alpina*, s. May S. 211 ff. *Centranthus ruber*, *Potentilla argentea*, *Acinos thymoides*, *Geranium columbinum*, *Centaurea lacea*, *Arabis alpina*, *Moehringia muscosa*, *Sedum atratum*, s. Jun S. 418 ff. *Punica Granatum*, *Teucrium Chamaedrys*, *Micromeria pygmaea*, *Clinopodium vulgare*, *Linaria vulgaris*, *Hypericum perforatum*, *Chrysocoma Linosyris*, *Conyza squarrosa*,

An Felsen.

Aster Amellus, Erigeron alpinus, Sempervivum montanum, Sedum repens, Andropogon Ischaemum, Stachys germanica, St. recta, Solanum Dulcamara, Campanula pyramidalis, Galeopsis angustifolia, Anthemis tinctoria s. Jul S. 603 ff. und die im August S. 712. angezeigten Pflanzen.)

28) Auf fettem Boden.

(Blitum rubrum, Chenopodium rhombifolium, Erodium pimpinellifolium s. Jul S. 606.)

29) An feuchten Orten.

Ranunculus sceleratus (s. May.)

An feuchten hohen steinigen Orten.

Alchimilla fissa (s. May.)

(Sagina procumbens, Potentilla Anserina, Ranunculus repens, Poa annua s. May S. 217 ff. Rubus caesius, Scrofularia nodosa, Geranium palustre s. Jun S. 425. Lycopus europaeus. L. exaltatus, Fimbristylis Micheliana, Polygonum Hydropiper, P. lapathifolio-nodosum, P. laxiflorum, P. nodosum, P. Persicaria, Lotus uliginosus, Carpesium cernuum, Mentha rubra, Convolvulus sepium, Galeopsis versicolor, Atriplex microsperma, Polygonum minori-Persicaria, Chenopodium glaucum s. Jul S. 607 ff. und die im August S. 713. aufgeführten Pflanzen.)

30) Im Flugsand.

(Tribulus terrestris s. Jun S. 426.)

31) An und in Flüssen.

(Gratiola officinalis, Euphorbia Esula, Nasturtium silvestre, Chaerophyllum aromaticum s. May S. 221 ff. Allium Schoenoprasum, Malachium aquaticum, Callitriche autumnalis, Potamogeton gramineus s. Jun S. 427 f. Blitum virgatum, Apium graveolens, Polygonum nodosum, P. lapathifolio-nodosum, Lythrum Salicaria, Mentha rubra, Lindernia pyxidaria, Senecio sarracenicus, Zannichellia gibberosa, Carduus crispus, Potamogeton fluitans, P. pectinatus, Najas marina s. Jul S. 610 ff. und die im Aug. S. 714. aufgezeichneten Pflanzen.)

32) *In Gartenland.*

Oxalis stricta (s. April.)

(*Digitaria sanguinalis* s. Jul S. 612. *Mentha piperita* s. Aug. S. 715.)

33) *Auf und in Gebirgen.*

a) *An feuchten steinigen Orten.*

Alchimilla fissa (s. May.)

b) *Auf bewachsenen Hügeln.*

Erica carnea (s. April.)

c) *In niedrigen Gebirgen.*

Ranunculus acris L. β . *pratensis* (s. April.)

d) *In Hochgebirgsgegenden an sonnigen Anhöhen.*

Mandragora vernalis (s. Anhöhen.)

e) *An Gebirgsflüssen auf Gries.*

Arabis arenosa (s. April S. 69.)

(*Silene inflata* Var., *Alectorolophus major*, *Moehringia muscosa*, *Silene inflata* Var. A. α und β ., *Pulsatilla alba*, *Elymus europaeus*, *Cardamine resedifolia*, *Arnica montana* s. Jun S. 429 ff. *Heracleum sibiricum*, *Pleurospermum austriacum*, *Rumex arifolius*, *Dianthus neglectus*, *Cineraria rivularis*, *Sedum repens*, *Heracleum flavescens*, *H. longifolium*, *Potentilla aurea*, *Veronica spicata*, *Homogyne alpina*, *Achillea lanata*, *Aconitum laetum*, *Crepis grandiflora*, *Cynanchum medium*, *Aquilegia pyrenaica* s. Jul S. 613 ff. und vom August S. 715. *Aconitum autumnale* bis *Silene pudibunda*, *Sagina bryoides* bis *Colchicum autumnale*, *Allium sibiricum*.)

34) *In Gebüsch.*

Lychnis diurna (s. May.)

Aster XIX. Sternblume.

A. canus W.

(*Geranium robertianum*, *Vicia sepium* s. May S. 231 *Althaea officinalis*, *Malachium aquaticum*, *Geranium columbinum* s. Jun S. 437 ff. *Convolvulus sepium*, *Polygonum*

Im Gebüsch.

dumetorum, Clinopodium vulgare, Malva Alcea, Althaea cannabina, Medicago falcata, M. media, Lappa major, Mercurialis ambigua, Achillea lanata, Saponaria officinalis, Rubus Sprengelii s. Jul S. 618 ff. und die im August S. 717. bemerkten Pflanzen.)

35) In Gehauen der Laubwälder.

Lychnis diurna (s. May).

36) An und in Gräben.

Caltha palustris (s. April.)

Ranunculus sceleratus (s. May.)

(*Myosotis palustris*, *Ranunculus Flammula*, *Nasturtium palustre*, *N. silvestre*, *Cerastium triviale*, *Potentilla Anserina*, *Ranunculus repens* s. May S. 234 ff. *Agrostis stolonifera*, *Juncus conglomeratus*, *Malachium aquaticum*, *Geranium palustre*, *Callitriche autumnalis*, *Potamogeton gramineus*, *Scutellaria galericulata*, *Nasturtium amphibium* s. Jun S. 441 ff. Vom Jul S. 622. *Echinochloa Crus galli*, *Dipsacus ferox* bis *Lysimachia vulgaris*, *Lythrum Salicaria*, *Potentilla reptans* bis *Senecio erraticus*, *Centaurea Calci-trapa*, *Impatiens Noli tangere*, *Lycopus europaeus*, *Potamogeton pectinatus*, *Cicuta virosa*, *Rumex maritimus*, *Polygonum laxiflorum*, *Schelhammeria cyperoides*, *Mentha palustris*, *Verbena officinalis* und die im August S. 718. bezeichneten Pflanzen.

37) Auf Grasplätzen.

Iris biflora (s. May S. 239.)

(*Polygonum aviculare* β . *erectum*, *Veronica serpyllifolia*, *Plantago lanceolata*, *Alchimilla vulgaris*, *Polygonum aviculare* α . *triviale*, *Erodium cicutarium*, *Trifolium pratense*, *Taraxacum officinale*, *Poterium glaucescens*, *Pollinia distachys*, *Lotus corniculatus* s. May S. 238 bis 241. *Prunella vulgaris*, *Plantago major*, *Agrimonia Eupatorium*, *Achillea Millefolium*, *Trifolium incarnatum* s. Jun S. 444 bis 446. *Scilla autumnalis*, *Potentilla reptans*, *Medicago falcata*, *M. media*, *Erigeron alpinus*, s. Jul S. 625 f. *Pteroselinum alsaticum*, *Cyperus fuscus*, *C. virescens* s. Aug. S. 719.)

38) *Auf Gries.*

An Bergströmen.

Arabis arenosa (s. April.)

(*Acinos alpinus*, *Noccaea alpina*, *Arabis alpina* s. May S. 243 f. *Linaria alpina*, *Erigeron uniflorus* s. Jul S. 626 f. *Avena distichophylla* s. August S. 719.)

39) *An Häusern.*

(*Blitum Bonus Henricus*, *Chenopodium urbicum*, *Amaranthus adscendens* s. Jul S. 627.)

40) *An Hecken.*

Oxalis stricta (s. April)

(*Lycium barbarum*, *L. europaeum*, *Rubus caesius* s. Jun S. 447 f.)

41) *Auf Heiden.*

(*Leontodon hispidus* s. May S. 246. *Thymus Serpyllum*, *Arnica montana* s. Jun S. 448 f. *Asterocephalus suaveolens*, *Euphrasia officinalis* s. Jul S. 627. *Oreoselinum legitimum*, *Cervaria Rivini* s. Aug. S. 720.)

42) *Auf faulem Holze.*

(*Sagina bryoides* s. Aug. S. 720.)

43) *Auf Hügeln. (Vergl. Kalkhügel, Sandhügel.)*

Cerastium arvense (s. April.)

Euphorbia Cyparissias (s. April.)

An bewachsenen Hügeln in Waldungen und Gebirgen.

Erica carnea (s. April.)

An sandigen, sonnigen Hügeln.

Cytisus biflorus (s. May.)

An sonnigen Hügeln.

Alyssum calycinum (s. April.)

An sonnigen trocknen Hügeln.

Iris biflora (s. May.)

(*Veronica serpyllifolia*, *Plantago graminea*, *Cynanchum Vincetoxicum*, *Cerastium arvense*, *Erodium cicutarium*, *Lotus corniculatus*, *Trifolium montanum*, *Medicago lupulina*, *Poterium glaucescens*, *Berteroa incana*, *Gypsophila rigida*, *Bellis perennis*, *Dianthus diutinus*, *Cytisus biflorus*, *Alysum calycinum*, *Medicago Gerardi*, *Poterium Sanguisorba* s. May S. 248 ff. *Salvia verticillata*, *Lolium perenne*, *Plantago maritima*, *Galium verum*, *Verbascum nigrum*, *Eryngium campestre*, *Pimpinella Saxifraga*, *Agrimonia Eupatorium*, *Potentilla argentea*, *Acinos thymoides*, *Prunella vulgaris*, *Geranium columbinum*, *Achillea Millefolium*, *Centaurea lacea*, *Scleranthus perennis* s. Jun S. 450 ff. *Dipsacus fullonum*, *Asterocephalus ochroleucus*, *Dianthus Carthusianorum*, *Arenaria serpyllifolia*, *Malva Alcaea*, *Hypericum perforatum*, *Gnaphalium arvense*, *Centaurea Scabiosa*, *C. Stoebe*, *C. paniculata*, *Crepis virens*, *Andropogon Ischaemum*, *Chrysocoma Linosyris*, *Veronica squamosa*, *Gentiana cruciata*, *Malva moschata*, *Medicago procumbens* s. Jul S. 628 ff. und die im August S. 720 f. verzeichneten Pflanzen.)

44) *Auf Kalkalpen.*

(*Noccaea alpina* s. May S. 259. *Lloydia serotina* s. Jun S. 458. *Rhododendron ferrugineum*, *Rh. hirsutum*, *Aronicum scorpioides*, *Erigeron alpinus*, *Silene quadrifida*, s. Jul S. 632 f. und die im August S. 721. angegebenen Pflanzen.)

45) *An und auf Kalkbergen.*

(*Daphne Cneorum* s. May S. 261. *Origanum vulgare*, *Carduus defloratus*, s. Jun S. 459 f. *Cirsium eriophorum*, *Gentiana ciliata*, *Galeopsis angustifolia* s. Jul S. 634.)

46) *Auf Kalkboden.*

(*Reseda lutea*, *Neslia paniculata*, s. May S. 262. *Salvia verticillata*, *Scleranthus perennis*, *Geranium sanguineum* s. Jun S. 460 ff. *Asterocephalus suaveolens*, *Teucrium Chamaedrys*, *Carlina acaulis*, *Veronica orchidea* s. Jul S. 634 f.)

47) *An Kalkfelsen.*

Arabis Crantziana (s. April.)

An Kalkfelsen,

(*Teucrium montanum*, *Hieracium villosum* s. Jun S. 462 f. *Prunella grandiflora*, *Aquilegia pyrenaica*, s. Jul S. 635.)

48) *Auf Kalkgebirgen.*

Arabis alpina (s. May S. 266.)

49) *Auf Kalkhügeln.*

Biscutella laevigata (s. April.)

(*Artemisia camphorata*, *Pulsatilla vulgaris* s. August S. 722.)

50) *Auf Kalkvoralpen.*

(*Potentilla caulescens* s. May S. 268. *Dianthus alpinus* s. Jul S. 636. *Aconitum Anthora* β . *tenuifolium* Rchb. s. Aug. S. 722.)

51) *In Krautgärten.*

Fumaria media (s. Aug. S. 723.)

52) *In Laubwäldern.*

Lychnis diurna (s. May.)

Glechoma hederaceum (s. April.)

(*Potentilla alba* s. May S. 274. *Mycelis muralis*, *Urtica dioica* s. Jun S. 469. *Campanula Trachelium*, *Melampyrum cristatum*, *Myosotis repens* s. Jul. S. 637. *Hieracium silvestre* s. Aug. S. 723.)

53) *Auf Lehmboden.*

Myosurus minimus (s. April.)

(*Scirpus radicans*, *Trifolium fragiferum* s. Jul S. 638.)

54) *Am südlichen Litorale.*

(*Anchusa angustifolia*, *Linaria litoralis*, *Berteroa viridis* s. May S. 276 f. *Trifolium tomentosum* s. Jun S. 471. *Crypsis schoenoides*, *Pollinia distachys*, *Salsola Soda*, *S. Tragus*, *Punica Granatum*, *Corydalis ochroleuca*, *Echbium*

Am südlichen Litorale.

agreste, Mercurialis ambigua s. Jul S. 638 ff. und die im August S. 723. angeführten Pflanzen.)

55) *An und auf Mauern.*

Alyssum calycinum (s. April.)

Sisymbrium Loeselii und *S. Sophia* (s. May.)

(*Campanula rotundifolia*, *Gypsophila rigida*, *Chelidonium majus*, *Linaria Cymbalaria*, *Berteroa incana*, *Lepidium campestre*, *Sisymbrium officinale*, *Diplotaxis muralis*, *Geranium molle*, *G. pusillum*, *Corydalis lutea*, *Hieracium murorum* s. May S. 281 ff. *Centranthus ruber*, *Cerastium triviale*, *Lychnis dioica*, *Potentilla argentea*, *Diplotaxis tenuifolia*, *Mycelis muralis*, *Crepis tectorum*, *Senecio squallidus*, *S. viscosus*, *Diplopappus annuus*, *Urtica urens* s. Jun S. 472 ff. Vom Jul S. 641. *Digitaria sanguinalis*, *Echinospermum Lappula* bis *Atriplex tatarica*, *Gypsophila muralis*, *Arenaria serpyllifolia*, *Teucrium Chamaedrys*, *Leonurus Cardiaca*, *Ballota nigra* bis *Marrubium vulgare*, *Verbena officinalis*, *Linaria vulgaris*, *Lappa tomentosa* bis *Xanthium Strumarium* so wie die im August S. 724. angegeben Pflanzen.)

56) *Am und im Meere.**A. Am Meerstrande.*

Artemisia XIX. Beifuss.

A. maritima L. Meerstrands-Beifuss.

A. salina W. salziger Beifuss.

Am nördlichen Meerstrande.

Viola tricolor, δ . *syratica* (s. März.)

Am südlichen Meerstrande.

Statice V. *Statice*.

St. serotina Rchb. spätblühende Grasnelke.

B. Auf dem Meeresgrunde.

Zostera I. Wier, Wasserriemen.

Z. marina L. gemeiner Wasserriemen.

(*Sagina procumbens* γ . *littoralis*, *Polygonum aviculare* α . *triviale* s. May S. 284. *Plantago maritima* β . *squa-*

Auf dem Meeresgrunde.

mata γ . genuina s. Jun S. 476. Atriplex laciniata, A. littoralis, A. triangularis, Halimus portulacoides, Alsine marginata, Armeria maritima, Rumex maritimus, Cakile maritima, Aster Tripolium, Centaurea Calcitrapa, Atriplex marina, A. hastata, Polygonum amphibium β . maritimum, Senecio denticulatus, Zannichellia major, Z. polycarpa, Potamogeton marinus, Ruppia maritima, R. rostellata s. Jul S. 644 ff. und die im August S. 725. angemerkten Pflanzen.)

57) Auf Moorboden.

Auf Moorziesen.

Gentiana verna (s. April.)

Ranunculus Flammula (s. May.)

(Alectorolophus major, Arnica montana, Nasturtium microphyllum, s. Jun S. 478 f. Gentiana Pneumonanthe, Helosciadium repens, Teucrium Scordium, Swertia perennis, Parnassia palustris s. Jul S. 646 f. und die im Aug. S. 726. angezeigten Pflanzen.)

58) In Morast.

(Sparganium natans s. Jul S. 648. Chara gracilis, Aira uliginosa s. Aug. S. 726.)

59) Auf nassem Boden.

(Schelhammeria cyperoides und Saccharum Ravennae s. Jul S. 649.)

60) In Obstgärten.

(Serratula tinctoria δ . dissecta s. Jul S. 649.)

61) In Pfützen.

(Potamogeton gramineus δ . latifolius s. Jun S. 482. Pulicaria vulgaris s. Jul S. 649.)

62) An Planken.

(Chenopodium olidum und Amaranthus adscendens s. Jul S. 649.)

63) An Quellen.

(*Nasturtium officinale*, *Montia fontana* s. May S. 292 f. *Geranium palustre* s. Jun S. 482. *Aconitum Cammarum*, *Impatiens noli tangere*, *Pleurospermum austriacum* s. Jul S. 650. *Gentiana asclepiadea* s. Aug. S. 727.)

64) Auf Ruinen

(*Geranium Robertianum*, *Corydalis lutea* s. May S. 293. *Alyssum montanum* s. Aug. S. 727.)

65) Auf Saatäckern.

(*Scleranthus annuus* s. May S. 294. *Neslia paniculata* s. Jun S. 483. *Eragrostis pilosa* s. Jul S. 650.)

66) An Salinen und auf Salzboden.

Artemisia rupestris (s. auf dürrem, salzhaltigen Boden.)

(*Polygonum aviculare* δ . *polycnemum*, *Kochia scoparia*, *Erythraea linarifolia* s. May S. 294 f. *Plantago maritima* s. Jun S. 484. Vom Jul S. 650. *Ruppia maritima* bis *Alsine marginata*, *Centaurea Calcitrapa*, *Crypsis schoenoides* bis *Aster Tripolium*, *Althaea officinalis* bis *Trifolium fragiferum* und die im August S. 727. aufgeführten Pflanzen.)

67) Auf Sand, Sandplätzen u. dgl.**a) Auf Sandäckern.**

Viola tricolor (s. März.)

b) Auf Sandboden.

Rumex Acetosella (s. May.)

Alyssum calycinum (s. April.)

c) Auf Sandplätzen.

Aira caryophyllea (s. May.)

d) Auf Sandhügeln.

Bscutella laevigata (s. April.)

e) *An Sandsteinfelsen.*

Arabis arenosa (s. April.)

(Reseda lutea, Sagina apetala, Alsine rubra, Neslia paniculata, Trifolium repens, Kochia arenaria, Berteroa incana, Agropyrum cristatum, Armeria vulgaris s. May S. 295 ff. Plantago major, Scleranthus perennis, Papaver Rhoeas, Geranium sanguineum, Juncus alpinus, I. supinus, Silene inflata Var., Plantago maritima, Thymus Serpyllum, Potentilla norvegica, Taraxacum serotinum s. Jun S. 485 ff. Chenopodium acutifolium, Galeopsis Ladanum, Linaria arvensis, L. Elatine, Asterocephalus ochroleucus, A. suaveolens, Calluna vulgaris, Gnaphalium arvense, Helichrysum arenarium, Saponaria officinalis, Centaurea Calci-trapa, Radiola Millegrana, Illecebrum verticillatum, Lindernia pyxidaria, Plantago arenaria, Arenaria serpyllifolia, Camphorsma monspeliaca, Iasion montana, Scirpus radicans, Xanthium Strumarium s. Jul S. 652 ff. Myosotis arvensis, Kochia prostrata, Polycarpon tetraphyllum, Artemisia campestris, Syrenia angustifolia, Pulsatilla vulgaris, s. Aug. S. 728.)

68) *An schattigen Orten.*

Cyclamen europaeum (s. April.)

Oxalis stricta (s. May.)

(Geranium pyrenaicum, G. Robertianum s. May S. 302 f. Geum urbanum, Rubus caesius, Geranium palustre s. Jun S. 493. Polygonum Persicaria, Impatiens Noli tangere s. Jul S. 656.)

69) *Auf Schlammboden.*

(Myosotis repens, Allium suaveolens, Pulicaria vulgaris, Succisa australis s. Jul S. 656 f. Chara gracilis, s. August S. 729.)

70) *Schmarotzend.*

Hedera Helix s. an Baumstämmen.)

(Orobanche ramosa s. Jun S. 494.)

71) *Auf Schutt.**Veronica hederæfolia* (s. März.)*Asperugo procumbens* (s. April.)*Lamium amplexicaule* (s. April.)*Sisymbrium Loeselii.* und *S. Sophia* (s. May.)

(*Veronica polita*, *Polygonum aviculare* α . *triviale*, *Cerastium triviale*, *Reseda lutea*, *Chelidonium majus*, *Linaria minor*, *Capsella Bursa pastoris*, *Lepidium campestre*, *Sisymbrium officinale*, *Diplotaxis muralis*, *Erodium cicutarium*, *E. moschatum*, *Geranium dissectum*, *G. molle*, *G. Robertianum*, *Malva rotundifolia*, *Medicago lupulina*, *Lapsana communis*, *Senecio vulgaris* s. May S. 303 ff. *Echium vulgare*, *Solanum nigrum*, *Aethusa Cynapium*, *Anthriscus vulgaris*, *Tribulus terrestris*, *Silene inflata* Var. *A. γ* . *Reseda Luteola*, *Agrimonia Eupatorium*, *Erysimum cheiranthoides*, *Diplotaxis tenuifolia*, *Mycelis muralis*, *Crepis tectorum*, *Senecio squalidus*, *S. viscosus*, *Diplopappus annuus*, *Urtica dioica*, *U. urens* s. Jun S. 495 ff. Vom Jul S. 657. *Blitum virgatum*, *Digitaria sanguinalis*, *Echinospermum squarrosum* bis *Atriplex patula*, *Polygonum Persicaria*, *Euphorbia exigua*, *Teucrium Chamaedrys*, *Leonurus Cardiaca*, *Galeopsis bifida*, *G. Tetrahit*, *Ballota foetida* bis *Marrubium vulgare*, *Verbena officinalis*, *Malva Alcea*, *M. moschata*, *M. silvestris*, *M. vulgaris*, *Lappa tomentosa*, bis *Artemisia vulgaris*, *Centaurea paniculata* bis *Xanthium Strumarium*, und die im August S. 729. aufgezeichneten Pflanzen.)

72) *An und in Seen.**An salzigen Seen.**Artemisia salina* (s. am Meerstrande.)*In Seen.*

(*Chara flexilis*, *Potamogeton gramineus*, s. Jun S. 498. *Radiola Millegrana*, *Illecebrum verticillatum*, *Rumex maritimus*, *Potamogeton pectinatus*, *Ruppia maritima*, *Polygonum amphibium*, *Zannichellia repens* s. Jul S. 660 f. und die im August S. 730. bemerkten Pflanzen.)

Am Seestrande s. am Meere.

73) An sonnigen Orten.

(*Mariubium peregrinum* s. Jul S. 661 *Pteroselinum alsaticum* s. Aug. S. 731.)

74) An steinigen Plätzen.

Viburnum Tinus (s. März.)

An steinigen, felsigen Orten.

Peltaria alliacea (s. April.)

An hohen, feuchten, steinigen Orten.

Alchimilla fissa (s. May.)

An steinigen, trockenen Orten.

Arbutus X. Erdbeerbaum.

A. Unedo L. gemeiner E.

(*Agropyrum cristatum*, *Corydalis lutea*, *Cynanchum Vincetoxicum*, *Geranium Robertianum* s. May S. 308 ff. *Rubus caesius*, *Geranium columbinum*, *Silene inflata* Var. s. Jun S. 500 f. *Pollinia distachys*, *Malva silvestris*, *M. italica*, *Silene Otites* s. Jul S. 662 f.)

75) Auf Stoppeläckern.

(*Polygonum aviculare* γ . *neglectum* s. May S. 310.)

76) Auf Strandwiesen.

(*Leontodon pratensis* s. Aug. S. 731.)

77) An und in Strassen.

(*Polygonum aviculare* α . *triviale* s. May S. 310. *Tribulus terrestris* s. Jun S. 502.)

78) An und in Sümpfen und an sumpfigen Orten.

An Sümpfen.

Ranunculus sceleratus (s. May.)

Auf Sumpfwiesen.

Menyanthes trifoliata (s. May.)

*In Sümpfen.***Heleocharis palustris** (s. May.)**Caltha palustris** (s. April.)

(*Nasturtium officinale*, *N. palustre*, *N. silvestre*, *Myosotis palustris* s. May S. 311 f. *Cyperus glomeratus*, *Allium Schoenoprasum*, *Juncus conglomeratus*, *Malachium aquaticum*, *Geranium palustre*, *Althaea officinalis*, *Plantago major*, *Scutellaria galericulata*, *Nasturtium amphibium*, *Cirsium oleraceum*, *Callitriche autumnalis* s. Jun S. 502 ff. *Picreus flavescens*, *Radiola Millegrana*, *Lysimachia guestphalica*, *L. vulgaris*, *Solanum Dulcamara*, *Allium suaveolens*, *Rumex maritimus*, *Lythrum Salicaria*, *Teucrium Scordium*, *Senecio sarracenicus*, *Carduus crispus* β . *integrifolius*, *Crypsis alopecuroides*, *Cr. schoenoides*, *Succisa australis*, *Melilotus Kochiana*, *Stellaria longifolia*, *Lycopus europaeus*, *Dichostylis fluitans*, *Gentiana Pneumonanthe*, *Cicuta virosa*, *Mentha aquatica*, *M. arvensis*, *M. palustris*, *Clinopodium vulgare*, *Trifolium hybridum*, s. Jul S. 663 ff. und die in August S. 731 f. verzeichneten Pflanzen.)

79) An und in Teichen.*A. An Teichen.***Ranunculus Flammula**, *R. sceleratus* (s. May.)*B. In Teichen.***Heleocharis palustris** (s. May.)

(*Potentilla Anserina*, *P. snpina* s. May S. 314. *Myosotis caespitosa*, *Potentilla norvegica*, *Nasturtium siifolium*, *Chara flexilis*, *Callitriche autumnalis* s. Jun S. 507 f. *Coleanthus subtilis*, *Isolepis setacea*, *Echinochloa Crus galli*, *Radiola Millegrana*, *Illecebrum verticillatum*, *Cicuta virosa*, *Peplis Portula*, *Polygonum nodosum*, *P. lapathifolio* — *nodosum*, *Lythrum Salicaria*, *Potamogeton gramineus*, *P. pectinatus*, *Polygonum amphibium*, *Schelhammeria cyperoides*, *Najas marina* s. Jul S. 667 ff. *Blitum crassifolium*, *Cyperus fuscus*, *C. virescens*, *Bidens cernua*, *Potamogeton obtusifolius*, *Chara nidifica*, *Ch. opaca*, *Ch. translucens* s. Aug. S. 732 f.)

80) In Thälern.

(Galeopsis versicolor s. Jul S. 669.)

81) *Auf Thonboden.*

(*Taraxacum serotinum* s. Jun S. 510. *Galeopsis Tetrahit* Var. β . s. Jul S. 669.)

82) *Auf Torf.*

Heleocharis palustris (s. May.)

(*Callitriche autumnalis* s. Jun S. 511. *Succisa pratensis*, *Saxifraga Hirculus* s. Jul S. 670. *Galium trifidum* s. Aug. S. 734)

83) *Auf Triften.*

Aira caryophyllea (s. May.)

Ranunculus acris (s. April.)

Auf salzhaltigen Triften.

Artemisia XIX. Beifuss.

A. laciniata L. feintheiliger B.

Auf trocknen Triften.

Cerastium arvense (s. April.)

Euphorbia Cyparissias (s. April.)

(*Armeria vulgaris*, *Cerastium triviale*, *Trifolium repens*, *Leontodon hastilis*, *Leontodon hispidus*, *Bellis perennis*, *Cerastium vulgatum*, *Euphorbia Esula*, *Viola tricolor*, *Stellaria media* s. May S. 318 ff. *Pimpinella Saxifraga*, *Linum catharticum*, *Dianthus deltoides*, *Agrimonia Eupatorium*, *Potentilla Anserina*, *Arnica montana*, *Eryngium campestre*, *Helianthemum vulgare* s. Jun S. 511 ff. *Asterocephalus suaveolens*, *Erythraea Centaurium*, *Dianthus Carthusianorum*, *Spergella nodosa*, *Potentilla reptans*, *Thrinia Leysseri*, *Dipsacus laciniatus*, *D. silvestris*, *Euphrasia officinalis*, *Hypericum perforatum* s. Jul S. 670 f. und die im August S. 734. angeführten Pflanzen.)

84) *An trocknen Orten.*

Cyclamen europaeum (s. April.)

Arbutus Unedo (s. an steinigen Orten.)

Fragaria vesca (s. April.)

An trocknen Orten.

(*Medicago media*, *Carduus crispus* α . *pinnatifidus* s. Jul S. 672. *Syrenia angustifolia* s. Aug. S. 734.)

85) *In Tümpeln.*

(*Chara flexilis* s. Jun S. 514. *Chara batrachosperma*, *Ch. gracilis*, *Ch. nidifica* s. Aug. S. 735.)

86) *Ueberall.*

Veronica hederacfolia (s. May.)

Rumex Acetosella (s. May.)

Cerastium arvense (s. May.)

Fragaria vesca (s. May.)

(*Alopecurus pratensis*, *Plantago major*, *Viola tricolor*, *Polygonum aviculare*, *P. Persicaria*, *Stellaria media*, *Arenaria serpyllifolia*, *Cerastium triviale*, *Cerastium vulgatum*, *Chelidonium majus*, *Capsella Bursa pastoris*, *Erodium cicutarium*, *Trifolium pratense*, *Taraxacum officinale*, *Senecio vulgaris*, *Bellis perennis* s. May S. 322 ff. *Lolium perenne*, *Solanum nigrum*, *Pimpinella Saxifraga*, *Rubus caesius*, *Potentilla Anserina*, *Geum urbanum*, *Alyssum calycinum*, *Berteroa incana*, *Leontodon hispidus*, *Achillea Millefolium*, *Urtica dioica*, *U. urens* s. Jun S. 515 f. und die im Jul S. 672. angegebenen Pflanzen.)

87) *An übercshwemnten Orten.*

Ranunculus sceleratus (s. May.)

(*Nasturtium palustre* s. May S. 325. *Potentilla supina* s. Jun S. 517. *Picreus flavescens*, *Fimbristylis Micheliana*, *Isoplepis setacea*, *Rumex maritimus*, *Limosella aquatica*, *Pulicaria vulgaris*, *Cicuta virosa*, *Lindernia pyxidaria*, *Chenopodium polyspermum*, *Peplis Portula*, *Schelhammeria cyperoides* s. Jul S. 673 f. *Cyperus fuscus*, *C. virescens* s. Aug. S. 735.)

88) *An Ufern. (Vergl. an Flüssen.)*

An sandigen und thonhaltigen Ufern.

Salicornia II. Glasschmalz.

S. radicans, Gm., wurzelndes Glasschmalz.

An Ufern.

(*Solanum Dulcamara*, *Chenopodium album* s. Jul S. 674 ff. *Armeria vulgaris* s. Aug. S. 736.)

89) *Auf Urgebirgen.*

(*Lloydia serotina*, *Pulsatilla alba* s. Jun S. 518 f. *Rhododendron ferrugineum*, *Sempervivum montanum*, *Aconitum Cammarum* α . *gracile*, *Erigeron uniflorus*, *Potentilla nitida* s. Jul S. 675 ff.)

90) *Verwildert (Vergl. Angebaut.)*

(*Borrago officinalis*, *Nicandra physaloides*, *Antirrhinum Asarina*, *Malva mauritiana*, *Wiborgia parviflora* s. Jul S. 677 f. und die im Aug. S. 736. angemerkten Pflanzen.)

91) *Auf und in Voralpen.*

Alchimilla fissa (s. May.)

Ranunculus acris β . *pratensis* (s. April.)

An steinigen felsigen Orten.

Peltaria alliacea (s. April.)

(*Valeriana montana*, *Arabis alpina*, *Achillea tomentosa*, s. May S. 326 f. *Elymus europaeus*, *Pulsatilla alba*, *Alectorolophus major*, *Moehringia muscosa*, *Sedum atratum*, *Saxifraga aizoon*, *S. caesia*, *Hieracium villosum*, *Cardamine resedifolia*, *Silene inflata* Var. A. ϵ ., *Linum viscosum*, *Rumex alpinus*, *Aster alpinus*, *Hieracium aurantiacum*, *Geranium aureum* s. Jun S. 520 ff., *Aconitum Neubergense*, *Aquilegia pyrenaica*, *Galeopsis versicolor*, *Carduus Personata*, *Epilobium organifolium*, *Dianthus Scheuchzeri*, *Silene quadrifida*, *Epilobium alpestre*, *Saxifraga aizoides*, *Pleurospermum austriacum*, *Rumex arifolius*, *Homogyne alpina*, *Asterocephalus lucidus*, *Crepis grandiflora*, *Hippochaeris helvetica*, s. Jul S. 679 ff. und die im Aug. S. 736 f. angezeigten Pflanzen.)

92) *In Vorhölzern.*

(*Elymus europaeus* s. Jun S. 526. *Geranium bohemicum*, *Althaea cannabina* s. Jul S. 683.)

93) *An und in Wäldern und an waldigen Orten.*

Hedera Helix (s. an Baumstämmen schmarotzend.)

Arbutus Unedo (s. an steinigen, trockenen Orten.)

Fragaria vesca, (s. März.)

a) *An bewachsenen Waldhügeln.*

Erica carnea (s. April.)

Cytisus supinus (s. April.)

Auf Waldwiesen.

Primula veris (s. März.)

(Veronica serpyllifolia, Scabiosa arvensis, Chaerophyllum aromaticum, Hieracium murorum, Genista germanica, Geranium pyrenaicum, Trifolium montanum, Lapsana communis, Leontodon hastilis, s. May S. 332 bis 344. Lychnis dioica, Rubus caesius, Prunella vulgaris, Geum urbanum, Geranium sanguineum, Diplopappus annuus, Aethusa Cynapium, Senecio silvaticus, Elymus europaeus s. Jun S. 528 ff. Galeopsis versicolor, Lavatera thuringiaca, Medicago media, Serratula tinctoria δ . dissecta, Senecio Iacoea, Rubus Sprengelii, Polygonum laxiflorum, Euphrasia nemorosa, Melampyrum nemorosum, M. pratense, Jasione montana, Cynanchum Vincetoxicum, Polygonum Hydropiper, Lappa major, Impatiens Noli tangere, Clinopodium vulgare, Carduus crispus β . integrifolius, Aconitum Neubergense, Veronica orchidea, Dipsacus pilosus, Lotus uliginosus, Trifolium hybridum s. Jul S. 684 ff. und die im August S. 737. aufgeführten Pflanzen.)

94) *An Wällen.*

(Solanum miniatum, Marrubium creticum s. Jul S. 689. Melilotus arguta s. Aug. S. 739.)

95) *An und im Wasser.*

(Apium graveolens, Zannichellia pedunculata, Najas minor, Potamogeton natans, Zannichellia repens, Mentha aquatica s. Jul S. 689 ff. und die im August S. 739. aufgezeichneten Pflanzen.)

96) *An Wegen.*

Cerastium arvense (s. April.)

An Wegen.

Euphorbia *Cyparissias* (s. April.)

Alyssum *calycinum* (s. April.)

(*Veronica serpyllifolia*, *Agropyrum cristatum*, *Scabiosa arvensis*, *Campanula rotundifolia*, *Polygonum aviculare* α . *triviale*, *Cerastium triviale*, *Potentilla Anserina*, *Lamium album*, *Berteroa incana*, *Capsella Bursa pastoris*, *Sisymbrium officinale*, *Medicago lupulina*, *Taraxacum officinale* s. May 346 ff. *Salvia verticillata*, *Plantago maritima* α . *leptophylla*, *Echium vulgare*, *Eryngium campestre*, *Tribulus terrestris*, *Silene inflata* Var. A. γ . *Agrimonia Eupatorium*, *Reseda Luteola*, *Potentilla argentea*, *Prunella vulgaris*, *Diplo- taxis tenuifolia*, *Achillea Millefolium*, *Centaurea Iacea*, *Ur- tica dioica* s. Jun S. 541 ff. und vom Jul S. 690 ff. *An- dropogon Ischaemum*, *Lolium perenne* bis *Atriplex tatarica*, *Silene Otites*, *Potentilla reptans*, *Galeopsis bifida*, *G. Tetrahit* bis *Marrubium peregrinum*, *Lavatera thuringiaca*, *Malva Alcea*, *M. vulgaris*, *Crepis virens*, *Thrincia Leysseri*, *Cichorium Intybus*, *Lappa minor*, *Carduus acanthoides*, *C. crispus*, *Cirsium lanceolatum* bis *Cotula coronopifolia*, *Cen- taurea nigrescens*, *Xanthium spinosum*.)

97) Auf Weideplätzen.

(*Colchicum autumnale* (s. Aug. S. 740.)

An Weihern s. an Teichen.

98) An und in Weinbergen.

Crocus *sativus* (s. Angebaut.)

(*Digitaria sanguinalis*, *Succisa transilvanica*, *Scilla au- tumnalis*, *Lavatera thuringiaca*, *Malva Alcea*, *M. italica*, *Serratula tinctoria* δ . *dissecta*, *Centaurea Scabiosa* s. Jul S. 693. *Cervaria Rivini*, *Fumaria media* s. Aug. S. 740.)

99) Auf Wiesen.

Rumex *Acetosa* (s. May.)

Ranunculus *acris* (s. April.)

Lathyrus *pratensis* (s. May.)

Erythraea V. Tausendguldenkraut.

E. *emarginata*. W. K., ausgerandetes T.

*Auf Wiesen in Berggegenden.***Gentiana germanica** (s. auf Anhöhen.)

(*Veronica serpyllifolia*, *Alopecurus nigricans*, *A. pratensis*, *Alchimilla vulgaris*, *Pimpinella magna*, *Lathyrus sepium*, *Vicia sepium*, *Trifolium pratense*, *Leontodon hispidus*, *Chrysanthemum Leucanthemum*, *Lychnis Flos cuculi*, *Viola rothomagensis*, *Carum Carvi*, *Nasturtium officinale*, *Euphorbia Esula* s. May S. 355 ff. *Asterocephalus columbarius*, *Linum catharticum*, *Agrimonia Eupatorium*, *Erodium pimpinellifolium*, *Arnica montana*, *Achillea Millefolium*, *Cirsium oleraceum*, *Althaea officinalis*, *Medicago prostrata*, *Galium verum*, *Taraxacum serotinum*, *Nasturtium microphyllum* s. Jun. S. 547 ff. *Serratula tinctoria*, *Senecio Jacobea*, *Centaurea nigrescens*, *Chrysocoma Linosyris*, *Veronica spicata*, *Achillea lanata*, *Atriplex hastata*, *Aster Tripolium*, *Succisa pratensis*, *Erythraea pulchella*, *Gentiana Pneumonanthe*, *Achillea Ptarmica*, *Scirpus radicans*, *Pedicularis sudetica*, *Erigeron uniflorus*, *Isolepis setacea*, *Prunella gradiflora*, *Gentiana cruciata*, *Medicago procumbens*, *Crepis virens*, *Lappa tomentosa*, s. Jul S. 694 ff. *Primula elatior*, *Colchicum autumnale*, *Polygonum laxum*, *Melilotus arguta*, *Gentiana campestris*, *G. Amarella*, *Hieracium umbellatum*, *Solidago Virgaurea* s. Aug. S. 740 f.)

100) Auf wüsten Plätzen.

(*Atriplex angustifolia*, *Polygonum Convolvulus*, *Lappa minor*, *Carduus acanthoides*, *C. polyacanthos*, *Cirsium lanceolatum*, *Artemisia Absinthium*, *A. vulgaris* s. Jul S. 697. *Mentha sativa*, *Erigeron canadensis* s. Aug. S. 741.)

101) An Zäunen.**Lychnis diurna** (s. May.)

(*Chelidonium majus*, *Geranium pusillum*, *G. pyrenaicum*, *Lathyrus sepium* s. May S. 367. *Aethusa Cynapium*, *Anthriscus vulgaris*, *Lychnis dioica*, *Agrimonia Eupatorium*, *Bryonia alba*, *B. dioica* s. Jun S. 557 f. *Convolvulus sepium*, *Chenopodium urbicum*, *Atriplex alba*, *A. angustifolia*, *A. patula*, *Polygonum dumetorum*, *Saponaria officinalis*, *Rubus Sprengelii*, *Leonurus Cardiaca*, *Galeopsis bifida*, *Ballota nigra*, *Verbena officinalis*, *Malva Alcea*, *M. vulgaris*, *Lappa major* s. Jul S. 697. *Evonymus europaeus*, *Althaea cannabina* s. Aug. S. 742.)

OCTOBER.

Auch für diesen Monat gilt das bey dem vorhergehenden Gesagte.

1) *An Abhängen.*

Gentiana ciliata (s. Jul S. 559.)

2) *An Ackerrändern.*

(*Reseda lutea*, *Sisymbrium officinale* s. May S. 157.
Lychnis dioica s. Jun S. 369. *Stachys germanica* Jul 560.)

3) *Auf Aeckern.*

Veronica polita (s. April.)

Geranium dissectum (s. May S. 163.)

(*Veronica opaca*, *Scabiosa arvensis*, *Sagina procumbens*, *Anagallis arvensis*, *Convolvulus arvensis*, *Rumex Acetosella*, *Stellaria media*, *Erodium moschatum*, *Medicago Gerardi*, *Neslia paniculata*, *Nasturtium palustre*, *N. silvestre*, *Erodium cicutarium* s. May S. 158 ff. *Sherardia arvensis*, *Tribulus terrestris*, *Papaver Rhoeas*, *Delphinium Consolida*, *Ervum hirsutum*, *Crepis tectorum*, *Anthemis arvensis*, *Acinos thymoides*, *Echium vulgare* s. Jun S. 371 ff. *Centaurea Cyanus* Jun S. 441. *Polygonum Convolvulus*, *Stachys annua*, *Cirsium arvense*, *Centaurea Scabiosa*, *Senecio erraticus* s. Jul S. 561 ff. *Odontites serotina*, *Gypsophila serotina* s. Aug. S. 700. *Veronica hederæfolia*, *Myosurus minimus*, *Oxalis stricta*, *Thlaspi arvense*, s. Sept. S. 743.)

4) *Auf Alpen und in Alpengegenden.*

Am Fusse der Alpen.

Cerinthæ glabra (s. May S. 168.)

Auf Alpen.

(*Moehringia muscosa* s. May S. 172. *Aconitum variegatum* s. Aug. S. 701. *Gentiana prostrata* s. Sept. S. 744.)

5) *Angebaut oder angepflanzt (und zum Theil verwildert).*

(*Rosa damascena* s. May S. 178. *Asterocephalus atropurpureus*, *Agrimonia repens*, *Prunus semperflorens*, *Geranium striatum* s. Jun S. 391 ff. *Crocus sativus* s. Sept. S. 745.)

6) *Auf Anhöhen.*

(*Leontodon hispidus*, *Armeria vulgaris*, *Lepidium campestre* s. May S. 181. *Asterocephalus columbarius*, *Geranium columbinum*, *Helianthemum vulgare* s. Jun S. 396. *Asterocephalus suaveolens*, *Stachys germanica* s. Jul S. 587 ff. *Erigeron serotinus* s. Aug. S. 707. *Mandragora vernalis*, *Gentiana germanica* s. Sept. S. 745 f.)

7) *Auf aufgeschwemmtem Boden.*

(*Reseda lutea*, *Nasturtium silvestre* s. May S. 185. *Erodium pimpinellifolium* s. Jun S. 398. *Reseda Luteola* s. Jul. S. 589.)

8) *An und in Bächen.*

(*Veronica serpyllifolia*, *Nasturtium officinale*, *N. silvestre* s. May S. 186. *Callitriche autumnalis* s. Jun S. 400. *Tanacetum vulgare*, *Senecio erraticus* s. Jul S. 590. *Aconitum variegatum* s. Aug. S. 707. *Ranunculus Flammula* s. Sept. S. 746.)

9) *An Baumstämmen in Wäldern schmarotzend.*

(*Hedera Helix* s. Sept. S. 746.)

10) *Auf bebautem Boden.*

(*Veronica serpyllifolia*, *Convolvulus arvensis*, *Stellaria media*, *Cerastium triviale*, *C. vulgatum*, *Oxalis stricta*, *Euphorbia Lathyris*, *Lamium album*, *L. amplexicaule*, *Capsella Bursa pastoris*, *Lepidium campestre*, *Geranium molle*, *G. pusillum*, *G. pyrenaicum*, *Medicago lupulina*, *Sonchus asper*, *S. oleracens*, *Senecio vulgaris*, *Poa annua* s. May S. 188 ff. *Solanum nigrum*, *Lychnis dioica*, *Euphorbia Peplus*, *Erysimum*

Auf bebaudem Boden.

cheiranthoides, *Vicia sativa*, *Urtica urens* s. Jun S. 401 f. *Chenopodium viride*, *Atriplex patula*, *Polygonum amphibium*, *P. lapathifolium-nodosum*, *P. lapathifolium*, *Euphorbia helioscopia*, *Mercurialis annua* s. Jul S. 591 ff. *Oxalis stricta*, *Glechoma hederaceum*, *Linaria minor*, *Sisymbrium Sophia* s. Sept. S. 746.)

11) *An und auf Bergen.*

(*Trifolium montanum* s. May S. 193. *Potentilla micrantha* s. Jun S. 404. *Iris biflora* s. Sept. S. 747.)

12) *In Berggegenden.*

(*Neslia paniculata*, *Geranium pyrenaicum* s. May S. 195. *Gentiana campestris* s. Aug. S. 709. *Gentiana germanica* s. Sept. S. 747.)

13) *In Bergwäldern.*

(*Fragaria semperflorens* s. May S. 199. *Hieracium silvaticum*, *Salvia glutinosa* s. Jun S. 410.)

14) *Auf Brachäckern.*

(*Echium vulgare*, *Anthemis arvensis* s. Jun S. 412 f. *Trifolium campestre* s. Jul 598. *Myosotis arvensis*, *Erigeron canadensis* s. Aug. S. 710. *Rumex Acetosella* s. Septemb. S. 748.)

15) *An Dämmen.*

(*Ranunculus repens* s. May S. 205.)

16) *Auf Feldern.*

(*Veronica agrestis*, *V. opaca*, *V. serpyllifolia* s. May S. 207.)

17) *An Feldrainen.*

(*Armeria vulgaris*, *Polygonum aviculare* α . *triviale*, *Euphorbia Esula*, *Poterium Sanguisorba* s. May S. 208 ff. *Salvia verticillata*, *Asterocephalus columbarius*, *Galium verum*, *Verbascum nigrum*, *Achillea Millefolium*, *Centaurea Iacea*, *Agrimonia Eupatorium* s. Jun S. 415 ff. *Dianthus*

An Feldrainen

Carthusianorum, Linaria vulgaris, Tanacetum vulgare, Centaurea Scabiosa s. Jul S. 601 f. Hieracium umbellatum, Leontodon autumnale, Artemisia campestris, Erigeron serotinus s. Aug. S. 712. Cerastium arvense, Euphorbia Cyparissias s. Sept. S. 749.)

18) *An Felsen.*

(Campanula rotundifolia, Linaria Cymbalaria, Genista germanica, Hieracium murorum, Poterium glaucescens, s. May S. 211 ff. Potentilla argentea, Acinos thymoides, Geranium columbinum, Centaurea Jacea, Moehringia muscosa s. Jun S. 419 ff. Linaria vulgaris, Stachys germanica, Solanum Dulcamara, Campanula pyramidalis, Anthemis tinctoria s. Jul S. 604 ff. Hieracium umbellatum s. Aug. S. 712. Peltaria alliacea s. Sept. S. 749.)

19) *An feuchten Orten.***Ranunculus hirsutus** (s. May.)

(Sagina procumbens, Potentilla Anserina, Ranunculus repens, Poa annua s. May S. 217 ff. Polygonum lapathifolio-nodosum, P. nodosum, P. Persicaria s. Jul S. 607. Chlora serotina s. Aug. S. 714. Ranunculus sceleratus s. Sept. S. 750.)

20) *In Flugsand.*

(Tribulus terrestris s. Jun S. 426.)

21) *An und in Flüssen (Vergl. Bergströme, Gebirgsflüsse, Gries.)*A. *An Flüssen.*

(Euphorbia Esula, Nasturtium silvestre s. May S. 221. Polygonum lapathifolio-nodosum, P. nodosum, Zannichellia gibberosa s. Jul S. 610 f.)

B. *In Flüssen.*

(Callitriche autumnalis s. Jun S. 427. Potamogeton pectinatus s. Jul S. 612.)

22) *In Gartenland.*

(Oxalis strieta s. Sept. S. 751.)

23) In Gebirgsgegenden.a) *An bewachsenen Hügeln.***Erica carnea** (s. April.)b) *In Gebirgsgegenden in Waldungen.***Cyclamen V. Saubrod.****C. autumnale Hoppe** herbstliches S.

(*Moehringia muscosa* s. Jun S. 430. *Veronica spicata* s. Jul S. 615. *Solidago Virgaurea*. *Aconitum variegatum* s. Aug. S. 715 f. *Ranunculus acris*, *Mandragora verna*, *Arabis arenosa* s. Sept. S. 751.)

24) In Gebüsch.

(*Geranium robertianum*, *Vicia sepium* s. May S. 231. *Geranium columbinum* s. Jun S. 439. *Polygonum dumetorum*, *Mercurialis ambigua* s. Jul S. 619. *Lychnis diurna* s. Sept. S. 751.)

25) In Gehauen.

(Lychnis diurna s. Sept. S. 752.)

26) Unter Gesträuch.**Vinca minor** (s. April.)**27) An und in Gräben.**

(*Ranunculus Flammula*, *Nasturtium palustre*, *N. silvestre*, *Cerastium triviale*, *Potentilla Anserina*, *Ranunculus repens* s. May S. 235 ff. *Callitriche autumnalis*, *Nasturtium amphibium* s. Jun S. 443. *Senecio erraticus* s. Jul S. 623. *Tanacetum vulgare*, *Zannichellia pedunculata*, *Z. repens* s. Aug. S. 718. *Caltha palustris*, *Ranunculus sceleratus*, s. September S. 752.)

28) In Grasgärten.**Viola odorata** (s. Merz.)**29) An grasigen Plätzen.**

(*Polygonum aviculare* β . *erectum*, *Veronica serpyllifolia*, *Plantago lanceolata*, *Polygonum aviculare* α . *triviale*, *Erodium cicutarium*, *Trifolium pratense*, *Taraxacum officinale*,

An grasigen Plätzen.

Poterium glaucescens s. May S. 238 – 241. *Plantago major*, *Agrimonia Eupatorium*, *Achillea Millefolium*, *Trifolium incarnatum*, s. Jun S. 445 f. *Cyperus fuscus*, *C. virescens* s. Aug. S. 719. *Iris biflora* s. Sept. S. 752.)

30) *Auf Gries.*

(*Arabis arenosa* s. Sept. S. 753.)

31) *An Hecken.*

(*Oxalis stricta* s. Sept. S. 753.)

32) *Auf Heiden.*

(*Leontodon hispidus* s. May S. 246. *Thymus Serpyllum* s. Jun S. 448. *Euphrasia officinalis* s. Jul S. 627.)

33) *Auf Hügeln.*

a) *An grasigen Hügeln in Laubwäldern.*

Campanula persicifolia s. May S. 255.

b) *An sonnigen Kalk- und Sandhügeln.*

Pulsatilla vulgaris (s. März S. 34.)

(*Veronica serpyllifolia*, *Erodium cicutarium*, *Trifolium montanum*, *Medicago lupulina*, *Poterium glaucescens*, *Berteroa incana*, *Gypsophila rigida*, *Bellis perennis*, *Dianthus diutinus*, *Medicago Gerardi*, *Poterium Sanguisorba* s. May S. 248 ff. *Salvia verticillata*, *Galium verum*, *Verbascum nigrum*, *Agrimonia Eupatorium*, *Potentilla argentea*, *Acinos thymoides*, *Geranium columbinum*, *Achillea Millefolium*, *Centaurea Iacea* s. Jun S. 450 ff. *Dianthus Carthusianorum*, *Arenaria serpyllifolia*, *Gnaphalium arvense*, *Centaurea Scabiosa* s. Jul S. 628 f. *Leontodon autumnalis*, *Artemisia campestris*, *A. camphorata* s. Aug. S. 720. *Cerastium arvense*, *Euphorbia Cyparissias*, *Erica carnea*, *Cytisus biflorus*, *Alyssum calycinum*, *Iris biflora* s. Sept. S. 753 f.)

34) *Auf Kalkbergen.*

(*Gentiana ciliata* s. Jul S. 634.)

35) *Auf Kalkboden.*

(Reseda lutea, Neslia paniculata s. May S. 262. Salvia verticillata s. Jun S. 460.)

36) *An Kalkfelsen.*

(Hieracium villosum s. Jun S. 463. Prunella grandiflora s. Jul S. 635. Arabis Crantziana s. Sept. S. 754.)

37) *In Kalkgegenden.*

(Artemisia camphorata Pulsatilla vulgaris s. Aug. S. 722. Biscutella laevigata, s. Sept. S. 755.)

38) *In Laubwäldern.*

An grasigen Hügeln.

Campanula persicifolia s. May S. 271.

(Mycelis muralis, Urtica dioica s. Jun S. 469. Campanula Trachelium s. Jul S. 637. Lychnis diurna, Glechoma hederaceum s. Sept. S. 755.)

39) *Auf Lehmboden.*

(Trifolium fragiferum s. Jul S. 638. Myosurus minimus s. Sept. S. 755.)

40) *Am südlichen Litorale.*

(Mercurialis ambigua s. Jul S. 641. Agave americana s. Aug. S. 724.)

41) *An und auf Mauern.*

(Campanula rotundifolia, Gypsophila rigida, Linaria Cymbalaria, Berteroa incana, Lepidium campestre, Sisymbrium officinale, Diplotaxis muralis, Geranium molle, G. pusillum, Hieracium murorum s. May S. 281 ff. Cerastium triviale, Lychnis dioica, Potentilla argentea, Diplotaxis tenuifolia, Mycelis muralis, Crepis tectorum, Senecio viscosus, Urtica urens s. Jun S. 474 f. Campanula pyramidalis, Arenaria serpyllifolia, Ballota nigra, B. urticifolia s. Jul S. 641 f. Artemisia campestris, Erigeron canadensis, E. serotinus s. Aug. S. 724. Alyssum calycinum, Sisymbrium Loeselii, S. Sophia s. Sept. S. 756.)

42) *Am und im Meere.*

(Sagina procumbens, Polygonum aviculare α . s. May S.

Am und im Meere.

284. *Polygonum amphibium*, *Zannichellia major*, *Z. polycarpa*, *Ruppia maritima*, *R. rostellata* s. Jul S. 645 f. *Salicornia herbacea* s. Aug. S. 725. *Viola tricolor* δ . *syrtica*, *Statice serotina*, *Zostera marina* s. Sept. S. 756.)

43) *Auf Moorboden.*

(*Nasturtium microphyllum* s. Jun S. 479. *Gentiana Pneumonanthe* s. Jul S. 646. *Gentiana verna*, *Ranunculus Flammula* s. Sept. S. 757.)

44) *An Planken.*

(*Geranium molle*, *G. pusillum* s. May S. 292.)

45) *An Quellen.*

(*Nasturtium officinale*, *Montia fontana* s. May S. 292 f.)

46) *Auf Ruinen.*

(*Geranium robertianum* s. May S. 293. *Alyssum montanum* s. Aug. S. 727.)

47) *Auf Saatäckern.*

(*Scleranthus annuus* s. May S. 294. *Neslia paniculata* s. Jun S. 483.)

48) *An Salinen und auf Salzboden.*

(*Polygonum aviculare* δ . *polycnemum* s. May S. 295. *Ruppia maritima* s. Jul S. 650. *Salicornia herbacea* s. Aug. S. 727.)

49) *Im Sand, auf Sandplätzen u. dgl.*

(*Reseda lutea*, *Sagina apetala*, *Viola tricolor*, *Neslia paniculata*, *Trifolium repens*, *Berteroa incana* s. May S. 295 ff. *Plantago major*, *Papaver Rhoeas*, *Silene inflata*, *Thymus Serpyllum*, *Taraxacum serotinum* s. Jun S. 485 ff. *Gnaphalium arvense*, *Helichrysum arenarium*, *Arenaria serpyllifolia*, *Jasione montana* s. Jul S. 653 ff. *Myosotis arvensis* *Polycarpon tetraphyllum*, *Artemisia campestris*, *Pulsatilla vulgaris* s. Aug. S. 728. *Rumex Acetosella*, *Alyssum calycinum*, *Arabis arenosa* s. Sept. S. 758 f.)

50) *An schattigen Orten.*

(*Geranium pyrenaicum*, *G. robertianum* s. May S. 302 ff. *Geum urbanum* s. Jun S. 493. *Polygonum Persicaria* s. Jul S. 656. *Cyclamen europaeum*, *Oxalis stricta* s. Sept. S. 759.)

51) *Schmarotzend an Baumstämmen in Wäldern.*

(*Hedera Helix* s. Sept. S. 759.)

52) *Auf Schutt.*

Geranium dissectum (s. May.)

(*Veronica polita*, *Polygonum aviculare* α . *triviale*, *Cerastium triviale*, *Reseda lutea*, *Linaria minor*, *Capsella Bursa pastoris*, *Lepidium campestre*, *Sisymbrium officinale*, *Diplotaxis muralis*. *Erodium cicutarium*, *E. moschatum*, *Geranium molle*, *Geranium robertianum*, *Medicago lupulina*, *Lapsana communis*, *Senecio vulgaris* s. May S. 303 ff. *Echium vulgare*, *Solanum nigrum*, *Tribulus terrestris*, *Agrimonia Eupatorium*, *Erysimum cheiranthoides*, *Diplotaxis tenuifolia*, *Mycelis muralis*, *Crepis tectorum*, *Senecio viscosus*, *Urtica dioica*, *U. urens* s. Jun S. 495 ff. *Solanum Dulcamara*, *S. flavum*, *S. humile*, *S. miniatum*, *S. nigrum*, *S. nodiflorum*, *S. oleraceum*, *S. pterocaulon*, *S. rubrum*, *S. villosum*, *Chenopodium viride*, *Atriplex patula*, *Polygonum Persicaria*, *Cirsium lanceolatum* s. Jul S. 657 ff. *Erigeron canadensis*, *E. serotinus* s. Aug. S. 729. *Veronica hederaefolia*, *Lamium amplexicaule*, *Sisymbrium Loeselii*, *S. Sophia* s. Sept. S. 760.)

53) *In Seen.*

(*Potamogeton gramineus* s. Jun S. 498. *Potamogeton pectinatus*, *Ruppia maritima*, *Polygonum amphibium*, *Zannichellia repens* s. Jul S. 661.)

54) *An steinigen Plätzen.*

(*Geranium robertianum* s. May S. 310. *Geranium columbinum*, *Silene inflata* s. Jun S. 501. *Peltaria alliacea*, *Arbutus Unedo* s. Sept. S. 761.)

55) *Auf Stoppeläckern.*

(*Polygonum aviculare* γ . *neglectum* s. May S. 310.)

56) *In Strassen.*

(*Polygonum aviculare* α . *triviale* s. May S. 310. *Tribulus terrestris* s. Jun S. 502)

57) *An und in Sümpfen und an sumpfigen Orten.*

Ranunculus hirsutus (s. May S. 311.)

(*Nasturtium officinale*, *N. palustre*, *N. silvestre* s. May S. 311. *Plantago major*, *Nasturtium amphibium*, *Callitriche autumnalis* s. Jun S. 504 ff. *Solanum Dulcamara*, *Gentiana Pneumonanthe* s. Jul S. 664 ff. *Odontites serotina* s. Aug. S. 732. *Ranunculus sceleratus*, *Menyanthes trifoliata*, *Caltha palustris* s. Sept. S. 761 f.)

58) *An und in Teichen.*

(*Potentilla Anserina* s. May S. 314. *Nasturtium siifolium*, *Callitriche autumnalis* s. Jun S. 508. *Polygonum lapathifolium-nodosum*, *P. nodosum*, *Potamogeton gramineus*, *P. pectinatus*, *Polygonum amphibium* s. Jul S. 668 f. *Cyperus fuscus*, *C. virescens* s. Aug. S. 733. *Ranunculus Flammula*, *R. sceleratus*, *Caltha palustris* s. Sept. S. 762.)

59) *Auf Thonboden.*

(*Taraxacum serotinum* s. Jun S. 510.)

60) *In Torflachen.*

(*Callitriche autumnalis* s. Jun S. 511.)

61) *Auf Triften.*

Sagina procumbens s. May S. 159.

(*Armeria vulgaris*, *Cerastium triviale*, *Trifolium repens*, *Leontodon hispidus*, *Bellis perennis*, *Cerastium vulgatum*, *Euphorbia Esula*, *Viola tricolor*, *Stellaria media* s. May S. 318 ff. *Agrimonia Eupatorium*, *Potentilla Anserina*, *Helianthemum vulgare* s. Jun S. 512 ff. *Dianthus Carthusia-*

Auf Triften.

norum, Euphrasia officinalis s. Jul S. 671. Leontodon autumnalis, Erigeron serotinus s. Aug. S. 734. Ranunculus acris, Cerastium arvense, Euphorbia Cyparissias s. Sept. S. 763.)

62) An trocknen Orten.

(Cyclamen europaeum, Arbutus Unedo, Fragaria vesca s. Sept. S. 763.)

63) Ueberall.

(Plantago major, Viola tricolor, Polygonum aviculare, P. Persicaria, Stellaria media, Cerastium triviale, Capsella Bursa pastoris, Erodium cicutarium, Taraxacum officinale, Senecio vulgaris, Bellis perennis s. May S. 322 ff. Solanum nigrum, Potentilla Anserina, Geum urbanum, Alyssum calycinum, Berteroa incana, Urtica dioica, U. urens s. Jun S. 515 f. Sagina procumbens, Sonchus oleraceus s. Jul S. 672. Veronica hederaefolia, Rumex Acetosella, Cerastium arvense, Fragaria vesca s. Sept. S. 764.)

64) An überschwemmten Orten.

Ranunculus hirsutus (s. May.)

(Nasturtium palustre s. May S. 325. Cyperus fuscus, C. virescens s. Aug. S. 735. Ranunculus sceleratus s. Sept. S. 764.)

65) An Ufern. (Vergl. an Flüssen.)

(Solanum Dulcamara s. Jul S. 674. Armeria vulgaris s. Aug. S. 736. Salicornia radicans s. Sept. S. 764.)

66) Verwildert.

(Agave americana s. Aug. S. 736.)

67) Auf und in Voralpen.

(Moehringia muscosa s. Jun S. 523. Gentiana campestris, Aconitum variegatum s. Aug. S. 736. Ranunculus acris β . pratensis, Peltaria alliacea s. Sept. S. 765.)

68) *An und in Wäldern und an waldigen Orten.*a) *In Waldungen in Gebirgsgegenden.**Cyclamen autumnale* (s. in Gebirgsgegenden.)b) *An Waldhügeln.**Vinca minor* (s. April.)c) *Auf Waldtriften.**Viola odorata* (s. März.)

(*Veronica serpyllifolia*, *Scabiosa arvensis*, *Hieracium murorum*, *Genista germanica*, *Geranium pyrenaicum*, *Trifolium montanum*, *Lapsana communis* s. May S. 332 ff. *Lychnis dioica*, *Geum urbanum*, *Senecio silvaticus* s. Jun S. 528 ff. *lasione montana* s. Jul S. 685. *Hieracium umbellatum*, *Solidago Virgaurea* s. Aug. S. 738. *Hedera Helix*, *Arbutus Unedo*, *Fragaria vesca*, *Erica carnea*, *Cytisus supinus*, *Primula veris* s. Sept. S. 766.)

69) *An Wällen.*

(Solanum miniatum s. Jul S. 689.)

70) *In Wasser.*

(Zannichellia pedunculata, Z. repens s. Jul S. 689 f.)

71) *An Wegen.*

(*Veronica serpyllifolia*, *Scabiosa arvensis*, *Campanula rotundifolia*, *Polygonum aviculare* α . *triviale*, *Potentilla Anserina*, *Lamium album*, *Berteroa incana*, *Capsella Bursa pastoris*, *Sisymbrium officinale*, *Medicago lupulina*, *Taraxacum officinale* s. May S. 346 ff. *Salvia verticillata*, *Echium vulgare*, *Tribulus terrestris*, *Agrimonia Eupatorium*, *Potentilla argentea*, *Diploaxis tenuifolia*, *Achillea Millefolium*, *Centaurea Iacea*, *Urtica dioica* s. Jun S. 541 ff. *Carduus acanthoides*, *Cirsium lanceolatum* s. Jul S. 692. *Cerastium arvense*, *Euphorbia Cyparissias*, *Alyssum calycinum* s. Sept. S. 766 f.)

72) *Auf Weideplätzen.*

(Colchicum autumnale s. Aug. S. 740.)

73) *An Weihern s. an Teichen.*74) *An und in Weinbergen.*

(Centaurea Scabiosa s. Jul S. 693. Crocus sativus s. Sept. S. 767.)

75) *Auf Wiesen.***Tragopogon pratensis** (s. May.)

(Veronica serpyllifolia, Lathyrus sepium, Vicia sepium, Trifolium pratense, Leontodon hispidus, Chrysanthemum Leucanthemum, Lychnis Flos Cuculi, Viola rothomagensis, Nasturtium officinale, Euphorbia Esula s. May S. 355 ff. Asterocephalus columbarius, Agrimonia Eupatorium, Erodium pimpinellifolium, Achillea Millefolium, Galium verum, Taraxacum serotinum, Nasturtium microphyllum s. Jun S. 547 ff. Veronica spicata, Gentiana Pneumonanthe, Achillea Ptarmica, Prunella grandiflora s. Jul S. 694 ff. Primula elatior, Colchicum autumnale, Gentiana campestris, Hieracium umbellatum, Solidago Virgaurea s. Aug. S. 740 f. Rumex Acetosa, Ranunculus acris, Lathyrus pratensis, Gentiana germanica s. Sept. S. 767 f.)

76) *Auf wüsten Plätzen.*

(Polygonum Convolvulus, Carduus acanthoides, Cirsium lanceolatum s. Jul S. 697. Erigeron canadensis s. Aug. S. 742)

77) *An Zäunen.*

(Geranium pusillum, G. pyrenaicum, Lathyrus sepium s. May S. 367. Lychnis dioica, Agrimonia Eupatorium, Bryonia alba, Br. dioica s. Jun S. 557. Polygonum dumetorum s. Jul S. 698. Lychnis diurna s. Sept. S. 768.)

NOVEMBER.

Ihres Schmuckes beraubt, neigt sich die Natur zur Ruhe. Oede und Stille herrscht schon im Hochgebirge: in niedern Gegenden jedoch bietet Flora noch manches holde Geschenk.

1) *An Abhängen.*

(*Gentiana ciliata* s. Jul S. 559.)

2) *An Ackerrändern.*

(*Lychnis dioica* s. Jun S. 369.)

3) *Auf Aeckern.*

Ranunculus bulbosus (s. April.)

(*Scabiosa arvensis*, *Sagina procumbens*, *Anagallis arvensis*, *Stellaria media*, *Neslia paniculata*, *Erodium cicutarium* s. May S. 159—164 ff. *Polygonum aviculare* γ. *neglectum* s. May S. 310. *Sherardia arvensis*, *Papaver Rhoeas*, *Delphinium Consolida*, *Crepis tectorum*, *Anthemis arvensis*, *Acinos thymoides*, *Echium vulgare* s. Jun S. 371 ff. *Centaurea Cyanus* s. Jun S. 441. *Centaurea Scabiosa* s. Jul S. 563. *Veronica hederæfolia*, *Thlaspi arvense* s. Sept. S. 743. *Veronica polita*, s. Oct. S. 769.)

4) *Angepflanzt (und zum Theil verwildert).*

Lonicera Periclymenum (s. May.)

(*Asterocephalus atropurpureus* s. Jun S. 391.)

5) *Auf Anhöhen.*

(*Leontodon hispidus*, *Armeria vulgaris* s. May S. 181 ff.

Auf Anhöhen.

Asterocephalus columbarius, *Helianthemum vulgare* s. Jun S. 396 ff. *Gentiana germanica* s. Sept. S. 746.)

6) *Auf bebaudem Boden.*

(*Veronica serpyllifolia*, *Cerastium vulgatum*, *Lamium album*, *L. amplexicaule*, *Capsella Bursa pastoris*, *Geranium molle*, *Medicago lupulina*, *Sonchus asper*, *S. oleraceus*, *Senecio vulgaris*, *Poa annua* s. May S. 188 ff. *Lychnis dioica*, *Euphorbia Peplus*, *Urtica urens* s. Jun S. 401 f. *Chenopodium viride*, *Atriplex patula*, *Euphorbia helioscopia*, *Mercurialis annua* s. Jul. S. 591 ff.)

7) *An und auf Bergen.*

Salvia pratensis (s. April.)

8) *In Berggegenden.*

(*Neslia paniculata* s. May S. 195.)

9) *In Bergwäldern.*

Daphne Mezereum (s. Febr.)

10) *Auf Brachen.*

(*Myosotis arvensis* s. May S. 204. *Echium vulgare*, *Anthemis arvensis* s. Jun S. 412 f. *Trifolium campestre* s. Jul S. 598. *Erigeron canadensis* s. Aug. S. 710.)

11) *An Dämmen.*

(*Ranunculus repens* s. May S. 205.)

12) *An Feldrainen.*

Campanula patula (s. Jun.)

(*Armeria vulgaris*, *Polygonum aviculare* α . *triviale* s. May S. 208. *Salvia verticillata*, *Asterocephalus columbarius*, *Galium verum*, *Verbascum nigrum*, *Achillea Millefolium*, *Centaurea Jacea* s. Jun S. 415 ff. *Dianthus Carthusianorum*, *Linaria vulgaris*, *Centaurea Scabiosa* s. Jul S. 601 f. *Leontodon autumnalis*, *Artemisia campestris* s. Aug. S. 712.)

13) *An Felsen.**In Bergwäldern.***Daphne Mezereum** (s. Febr.)

(Campanula rotundifolia, Linaria Cymbalaria, Hieracium murorum s. May S. 211 ff. Potentilla argentea, Acinos thy-moides, Centaurea Jacea s. Jun S. 419. Linaria vulgaris, Anthemis tinctoria s. Jul S. 604 ff.)

14) *An feuchten Orten.*

(Ranunculus repens, Poa annua s. May S. 218 f. Polygonum Persicaria s. Jul S. 607. Ranunculus sceleratus s. Sept. S. 750.)

15) *In Gebirgsgegenden.*

(Veronica spicata s. Jul S. 615.)

16) *In Gebüsch.***Daphne Mezereum** (s. Febr.)

(Geranium robertianum s. May S. 231. Mercurialis am-bigua s. Jul S. 619.)

17) *Unter Gesträuch.*

(Vinca minor s. October S. 773.)

18) *In Gräben.*

(Ranunculus repens s. May S. 237. Caltha palustris, Ranunculus sceleratus s. Sept. S. 752.)

19) *An grasigen Orten.*

(Polygonum aviculare β . erectum, Veronica serpyllifolia, Plantago lanceolata, Polygonum aviculare α . triviale, Taraxacum officinale s. May S. 238 bis 241. Achillea Mille-folium s. Jun S. 445.)

20) *Auf Heiden.***Vaccinium Vitis idaea** (s. May.)

(Leontodon hispidus s. May S. 246. Thymus Serpyllum s. Jun S. 448. Euphrasia officinalis s. Jul S. 627.)

21) *Auf Hügeln.*

Salvia pratensis (s. April.)

Ranunculus bulbosus (s. April.)

(*Veronica serpyllifolia*, *Erodium cicutarium*, *Medicago lupulina*, *Berteroa incana*, *Bellis perennis* s. May S. 248 ff. *Salvia verticillata*, *Galium verum*, *Verbascum nigrum*, *Potentilla argentea*, *Acinos thymoides*, *Achillea Millefolium*, *Centaurea Jacea* s. Jun S. 450 ff. *Dianthus Carthusianorum*, *Arenaria serpyllifolia*, *Gnaphalium arvense*, *Centaurea Scabiosa* s. Jul S. 628 f. *Leontodon autumnalis*, *Artemisia campestris*, *A. camphorata* s. Aug. S. 720. *Pulsatilla vulgaris* s. Oct. S. 774.)

22) *An Kalkbergen.*

(*Gentiana ciliata* s. Jul S. 634.)

23) *Auf Kalkboden.*

(*Neslia paniculata* s. May S. 262. *Salvia verticillata* s. Jun S. 460)

24) *An Kalkfelsen.*

(*Prunella grandiflora* s. Jul S. 635.)

25) *An sonnigen Kalkhügeln.*

(*Pulsatilla vulgaris* s. Aug. S. 722.)

26) *In Laubwäldern.*

(*Mycelis muralis* s. Jun S. 469. *Campanula Trachelium* s. Jul S. 637.)

27) *Am südlichen Litorale.*

(*Mercurialis ambigua* s. Jul. S. 641.)

28) *An und auf Mauern.*

Campanula rotundifolia, *Linaria Cymbalaria*, *Berteroa incana*, *Geranium molle*, *Hieracium murorum* s. May S. 281 ff. *Lychnis dioica*, *Potentilla argentea*, *Mycelis muralis*, *Crepis tectorum*, *Senecio viscosus*, *Urtica urens* s. Jun S. 474 f. *Arenaria serpyllifolia*, *Ballota nigra*, *B. urticifolia*

An und auf Mauern.

s. Jul S. 642. *Artemisia campestris*, *Erigeron canadensis*
s. Aug. S. 724.)

29) Am Meerstrande.

(*Polygonum aviculare* α . *triviale* s. May S. 284.)

30) Auf Moorboden.

(*Gentiana Pneumonanthe* s. Jul S. 646.)

Auf Moorwiesen.

(*Gentiana verna* s. Aug. S. 726.)

31) An Planken.

(*Geranium molle* s. May S. 292.)

32) Auf Ruinen.

(*Geranium robertianum* s. May S. 293.)

33) An Salinen und auf Salzboden.

(*Polygonum aviculare* δ . *polycnemum* s. May S. 294.)

34) Auf Sand und in Sandgegenden.

Vaccinium Vitis Idaea (s. May.)

(*Viola tricolor*, *Neslia paniculata*, *Trifolium repens*, *Berteroa incana* s. May S. 295 ff. *Papaver Rhoeas* s. Jun S. 486. *Gnaphalium arvense*, *Helichrysum arenarium*, *Arenaria serpyllifolia*, *Jasione montana* s. Jul S. 653 ff. *Myosotis arvensis*, *Artemisia campestris*, *Pulsatilla vulgaris* s. Aug. S. 728.)

35) An schattigen Orten.

(*Geranium robertianum* s. May S. 303. *Polygonum Persicaria* s. Jul. S. 656.)

36) Auf Schutt.

(*Veronica polita*, *Polygonum aviculare* α . *triviale*, *Capsella Bursa pastoris*, *Erodium cicutarium*, *Geranium molle*,

Auf Schutt.

G. robertianum, *Medicago lupulina*, *Senecio vulgaris* s. May S. 303 ff. *Echium vulgare*, *Mycelis muralis*, *Crepis tectorum*, *Senecio viscosus*, *Urtica urens* s. Jun S. 495 ff. *Chenopodium viride*, *Polygonum Persicaria*, *Cirsium lanceolatum* s. Jul S. 658 f. *Erigeron canadensis* s. Aug. S. 729. *Lamium amplexicaule* s. Sept. S. 760.)

37) *An steinigen Plätzen.*

(*Geranium robertianum* s. May S. 310. *Silene inflata* Var. s. Jun S. 501.)

38) *An Strassen.*

(*Polygonum aviculare* α. *triviale* s. May S. 310.)

39) *An und in Sümpfen und an sumpfigen Orten.*

(*Gentiana Pneumonanthe* s. Jul S. 666. *Caltha palustris*, *Ranunculus sceleratus* s. Sept. S. 761.)

40) *An Teichen.*

(*Caltha palustris*, *Ranunculus sceleratus* s. Sept. S. 762.)

41) *Auf Thonboden.*

(*Taraxacum serotinum* s. Jun S. 510.)

42) *Auf Triften.*

***Ranunculus bulbosus* (s. April.)**

(*Armeria vulgaris*, *Trifolium repens*, *Leontodon hispidus*, *Bellis perennis*, *Cerastium vulgatum*, *Viola tricolor*, *Stellaria media* s. May S. 318 ff. *Helianthemum vulgare* s. Jun S. 513. *Dianthus Carthusianorum*, *Euphrasia officinalis* s. Jul S. 671. *Leontodon autumnalis* s. Aug. S. 734. *Ranunculus acris* s. Sept. S. 763.)

43) *An trocknen Orten.*

(*Fragaria vesca* s. Sept. S. 763.)

44) *Ueberall.*

(*Polygonum aviculare*, *P. Persicaria*, *Stellaria media*, *Capsella Bursa pastoris*, *Taraxacum officinale*, *Senecio vulgaris*, *Bellis perennis* s. May S. 323 ff. *Urtica dioica* s. Jun S. 516. *Sonchus oleracens* s. Jul S. 672. *Fragaria vesca* s. Sept. S. 764.)

45) *An überschwemmten Orten.*

(*Ranunculus sceleratus* s. Sept. S. 764.)

46) *An Ufern.*

(*Armeria vulgaris* s. Aug. S. 736.)

47) *An und in Wäldern und an waldigen Orten.*

An Waldbergen zwischen dünnem Grase.

Polygala Chamaebuxus (s. April.)

(*Veronica serpyllifolia*, *Scabiosa arvensis*, *Hieracium murorum* s. May S. 332 ff. *Lychnis dioica* s. Jun S. 528. *Solidago Virgaurea* s. Aug. S. 738. *Fragaria vesca* s. Sept. S. 766. *Vinca minor* s. Oct. S. 780.)

48) *An Wegen.*

Salvia pratensis (s. April.)

Ranunculus bulbosus (s. April.)

(*Veronica serpyllifolia*, *Scabiosa arvensis*, *Campanula rotundifolia*, *Polygonum aviculare* α. *triviale*. *Lamium album*, *Berteroa incana*, *Capsella Bursa pastoris*, *Medicago lupulina*, *Taraxacum officinale* s. May S. 347 ff. *Salvia verticillata*, *Echium vulgare*, *Potentilla argentea*, *Achillea Millefolium*, *Centaurea Jacea* s. Jun S. 541 ff. *Carduus acanthoides*, *Cirsium lanceolatum* s. Jul S. 692.)

49) *Auf Weideplätzen.*

(*Colchicum autumnale* s. Aug. S. 740.)

50) *An Weihern s. an Teichen.*

51) *An Weinbergen.*

(*Centaurea Scabiosa* s. Jul S. 693.)

52) *Auf Wiesen.*

Salvia pratensis (s. April.)

Campanula patula (s. May.)

Crepis biennis (s. Jun.)

(*Veronica serpyllifolia*, *Leontodon hispidus*, *Chrysanthemum Leucanthemum* s. May S. 355 ff. *Asterocephalus columbarius*, *Achillea Millefolium*, *Galium verum*, *Taraxacum serotinum* s. Jun S. 547 ff. *Veronica spicata*, *Gentiana Pneumonanthe*, *Prunella grandiflora* s. Jul. S. 694 ff. *Primula elatior*, *Colchicum autumnale*, *Solidago Virgaurea* s. Aug. S. 740 f. *Ranunculus acris*, *Gentiana germanica* s. Sept. S. 767 f.)

53) *Auf wüsten Plätzen.*

(*Carduus acanthoides*, *Cirsium lanceolatum* s. Jul S. 697. *Erigeron canadensis* s. Aug. S. 742.)

54) *An Zäunen.*

(*Lychnis dioica*, *Bryonia alba* s. Jun S. 557.)

DECEMBER.

In winterlicher Hülle ruht nun die Natur. Doch auch da spendet sie des Christmonds Blumen, und während sie, vom Hauche milder Lüfte geweckt, an des vergangenen Herbstes Schönheit erinnert, mahnet sie an die Anmuth des kommenden Lenzes. —

Neben manchen Herbstpflanzen zeigen sich bey gelinder Witterung zuweilen schon Blumen des Frühlings.

1) *An Ackerrändern.*

(*Lychnis dioica* s. Jun S. 369.)

2) *Auf Aeckern.*

Veronica agrestis (s. April.)

Draba verna (s. März.)

(*Scabiosa arvensis*, *Sagina procumbens*, *Anagallis arvensis*, *Stellaria media*, *Neslia paniculata*, *Erodium cicutarium* s. May S. 159 ff. *Sherardia arvensis*, *Delphinium Consolida*, *Crepis tectorum*, *Anthemis arvensis*, *Acinos thymoides*, *Echium vulgare* s. Jun S. 371 ff. *Centaurea Cyanus* s. Jun S. 441. *Thlaspi arvense* s. Sept. S. 743.)

3) *Angepflanzt.*

Amygdalus communis (s. April.)

Corylus tubulosa (s. April S. 135.)

4) *Auf Anhöhen.*

(*Leontodon hispidus*, *Armeria vulgaris* s. May S. 181 f. *Asterocephalus columbarius* s. Jun S. 396.)

5) *Auf bebaudem Boden.*

Campanula rapunculoides (s. Jun.)

Lamium purpureum (s. März.)

Draba verna (s. März.)

(*Veronica serpyllifolia*, *Stellaria media*, *Cerastium vulgatum*, *Lamium album*, *Capsella Bursa pastoris*, *Geranium molle*, *Medicago lupulina*, *Sonchus oleraceus*, *Senecio vulgaris*, *Poa annua* s. May S. 188 ff. *Lychnis dioica*, *Euphorbia Peplus*, *Urtica urens* s. Jun S. 401 f. *Chenopodium viride*, *Atriplex patula*, *Mercurialis annua* s. Jul S. 581 ff.)

6) *An schattigen Bergen, so wie auch in Berg-
gegenden in Grasgärten verwildert.*

Eranthis XIII. Winterling.

E. hiemalis *Salisb.* (*Helleborus hiemalis* *L.* Winter-Nieswurz, Winter-Christwurz.)

7) *In Berggegenden.*

(*Neslia paniculata* s. May S. 195.)

8) *Auf Brachäckern.*

(*Echium vulgare*, *Anthemis arvensis* s. Jun S. 412 f. *Trifolium campestre* s. Jul S. 598. *Myosotis arvensis* s. Aug. S. 710.)

9) *An Dämmen.*

(*Ranunculus repens* s. May S. 205.)

10) *An Feldrainen.*

Potentilla verna (s. März.)

(*Armeria vulgaris* s. May S. 208. *Asterocephalus columbarius*, *Achillea Millefolium*, *Centaurea Jacea* s. Jun S.

An Feldrainen.

416 f. *Dianthus Carthusianorum* s. Jul S. 601. *Leontodon autumnalis*, *Artemisia campestris* s. Aug. S. 712.

11) *An Felsen.*

Potentilla verna (s. März.)

Linaria Cymbalaria s. May S. 212. *Potentilla argentea*, *Acinos thymoides*, *Centaurea Jacea* s. Jun S. 419. *Anthemis tinctoria* s. Jul S. 606. *Daphne Mezereum* s. Nov. S. 784.)

12) *An feuchten Orten.*

Poa trivialis (s. Jun.)

(*Ranunculus repens*, *Poa annua* s. May S. 218 f. *Ranunculus sceleratus* s. Sept. S. 750.)

13) *In Gebirgswäldern.*

Petasites albus (s. April.)

14) *In Gräben.*

(*Ranunculus repens* s. May S. 237. *Ranunculus sceleratus* s. Sept. S. 752.)

15) *In Grasgärten verwildert.*

Helleborus XIII. Nieswurz.

H. altifolius *Rchb.* (*Helleborus niger* β . Hayne) hochblättrige schwarze N. oder Christwurz, Weihnachtsrose, Winterrose.

H. niger *L.* schwarze N. oder Christwurz, Weihnachtsrose, Winterrose.

Eranthis hiemalis (s. oben unter Nr. 6.)

16) *Auf Grasplätzen.*

Plantago media (s. Jun.)

(*Veronica serpyllifolia*, *Plantago lanceolata*, *Taraxacum officinale* s. May S. 238 ff. *Achillea Millefolium* s. Jun S. 445.)

17) *Auf Heiden.*

(*Leontodon hispidus* s. May S. 246. *Thymus Serpyllum* s. Jun S. 446.)

18) *An Hügeln.***Potentilla verna** (s. März.)

(*Veronica serpyllifolia*, *Erodium cicutarium*, *Medicago lupulina*, *Berteroa incana*, *Bellis perennis* s. May S. 248 ff. *Potentilla argentea*, *Acinos thymoides*, *Achillea Millefolium*, *Centaurea Jacea* s. Jun S. 451 f. *Dianthus Carthusianorum*, *Arenaria serpyllifolia*, *Gnaphalium arvense* s. Jul S. 628 f. *Leontodon autumnalis*, *Artemisia campestris* s. Aug. S. 720.)

19) *In Kalkalpenhöhlen.***Helleborus niger** (s. oben unter Nr. 15.)20) *Auf Kalkboden.*

(*Neslia paniculata* s. May S. 262.)

21) *In Laubwäldern.***Corylus Avellana** (s. Februar.)22) *An Mauern.***Potentilla verna** (s. März.)

(*Linaria Cymbalaria*, *Berteroa incana*, *Geranium molle* s. May S. 282 f. *Lychnis dioica*, *Potentilla argentea*, *Crepis tectorum*, *Senecio viscosus* *Urtica urens* s. Jun S. 474 f. *Arenaria serpyllifolia*, *Ballota nigra*, *B. urticifolia* s. Jul S. 642. *Artemisia campestris* s. Aug. S. 724.)

23) *An Planken.*

(*Geranium molle* s. May S. 292.)

24) *Auf Sand, sandigen Plätzen u. dgl.**Auf Sandhügeln.***Draba verna** (s. März.)

(*Viola tricolor*, *Neslia paniculata*, *Berteroa incana* s. May S. 295 ff. *Silene inflata* Var., *Thymus Serpyllum* s. Jun S. 488 ff. *Gnaphalium arvense*, *Helichrysum arenarium*, *Arenaria serpyllifolia*, *Jasione montana* s. Jul S. 653 ff. *Myosotis arvensis*, *Artemisia campestris* s. Aug. S. 728.)

25) *Auf Schutt.***Veronica agrestis** (s. April.)

(*Capsella Bursa pastoris*, *Erodium cicutarium*, *Geranium molle*, *Medicago lupulina*, *Senecio vulgaris* s. May S. 305 ff. *Echium vulgare*, *Crepis tectorum*, *Senecio viscosus*, *Urtica urens* s. Jun S. 495 ff. *Chenopodium viride*, *Cirsium lanceolatum* s. Jul S. 658 f.)

26) *An steinigen Plätzen.*

(Silene inflata Var. s. Jun S. 501.)

27) *An Sümpfen.*

(Ranunculus sceleratus s. Sept. S. 761.)

28) *Auf Triften.***Potentilla verna** (s. April.)

(*Armeria vulgaris*, *Leontodon hispidus*, *Bellis perennis*, *Cerastium vulgatum*, *Stellaria media* s. May S. 318 ff. *Dianthus Carthusianorum* s. Jul S. 671. *Leontodon autumnalis* s. Aug. S. 733. *Ranunculus acris* s. Sept. S. 763. *Sagina procumbens* s. Oct. S. 778.)

29) *An trocknen Orten.*

(Fragaria vesca s. Sept. S. 763.)

30) *Ueberall.*

(*Stellaria media*, *Capsella Bursa pastoris*, *Senecio vulgaris*, *Bellis perennis* s. May S. 323 ff. *Fragaria vesca* s. Sept. S. 764.)

31) *An überschwemmten Orten.*

(*Ranunculus sceleratus* s. Sept. S. 764.)

32) *An Ufern.*

(*Armeria vulgaris* s. Aug. S. 736.)

33) *In Voralpengegenden.*

Petasites albus (s. April.)

Helleborus niger (s. oben unter Nr. 15.)

34) *An und in Wäldern und an waldigen Orten.*

An Waldrändern.

Campanula rapunculoides (s. Jun.)

(*Veronica serpyllifolia*, *Scabiosa arvensis* s. May S. 332 ff. *Lychnis dioica* s. Jun S. 528. *Solidago Virgaurea* s. Aug. S. 738. *Fragaria vesca* s. Sept. S. 766.)

35) *An Wegen.*

Plantago media (s. Jun.)

Potentilla verna (s. März.)

(*Veronica serpyllifolia*, *Scabiosa arvensis*, *Lamium album*, *Berteroa incana*, *Capsella Bursa pastoris*, *Medicago lupulina*, *Taraxacum officinale* s. May S. 346 ff. *Echium vulgare*, *Potentilla argentea*, *Achillea Millefolium*, *Centaurea Jacea* s. Jun S. 541 ff. *Carduus acanthoides*, *Cirsium lanceolatum* s. Jul S. 692.)

36) *Auf Weideplätzen.*

(*Colchicum autumnale* s. Aug. S. 740.)

37) *Auf Wiesen.*

Poa trivialis (s. Jun.)

Auf Wiesen.

(*Leontodon hispidus* s. May S. 358. *Asterocephalus columbarius*, *Achillea Millefolium* s. Jun S. 547 ff. *Primula elatior*, *Colchicum autumnale*, *Solidago Virgaurea* s. Aug. S. 740 f. *Ranunculus acris* s. Sept. S. 767.)

38) *Auf wüsten Plätzen.*

(*Carduus acanthoides*, *Cirsium lanceolatum* s. Jul S. 697.)

39) *An Zäunen.*

(*Lychnis dioica*, *Bryonia alba* s. Jun S. 557 f.

REGISTER.

- Abies pectinata* 224.
A. picea 224.
Achillea ochroleuca 594. 626.
Abutilon Avicennae 443. 496. 543. 546.
Acacia Farnesiana 395.
Acanthus mollis 423.
Acer campestre 270.
A. monspessulanum 66. 70. 100.
A. platanoides 144. 342.
A. Pseudo-Platanus 223. 331. 336.
Aceras anthropophora 345.
Achillea Ageratum 640.
A. atrata 701.
A. Clavennae 721.
A. Clusiana 721.
A. dentifera 736.
A. impunctata 701.
A. lanata 616. 620. 694.
A. magna 616.
A. Millefolium 417. 445. 452. 543. 549. 576.
A. moschata 677. 703.
A. nana 703.
A. nobilis 706. 712. 724.
A. odorata 256.
A. pectinata 426.
A. Ptarmica 695.
A. Seidlil 686.
A. tanacetifolia 617.
A. tomentosa 327.
Acinos alpinus 56. 94. 169. 243. 568.
A. thymoides 375. 419. 451.
A. villosus 588.
Aconitum acutum 567. 582.
A. angustifolium 567.
A. Anthora 721.
A. Anthora β . *tenuifolium* 722. 723.
A. autumnale 715.
A. Bernhardianum 613. 679.
A. callibotryon 614.
A. Cammarum 589. 596. 650.
A. Cammarum Var. α . *gracile* 675.
A. Cammarum β . γ . 567.
A. cernuum 567. 582. 590.
Aconitum eminens 613.
A. exaltatum 614.
A. formosum 567.
A. Funkianum 567.
A. hians 613.
A. Hoppeanum 567.
A. Judenbergense 567.
A. Koelleianum 570. 572. 573.
A. laetum 617.
A. laxum 567.
A. macranthum 567.
A. multifidum 617. 681.
A. multifidum β . 614.
A. Myoctonum 429. 465. 493.
A. Napellus 567.
A. Neubergense 567. 679. 687.
A. palmatifidum 615.
A. pyramidale 226.
A. pyrenaicum 613.
A. Stoerkianum 409.
A. strictum 567. 614.
A. tauricum 578.
A. Thelyphonum 520.
A. variegatum 701. 707. 716. 736. 737.
A. Vulparia 464.
Acorus Calamus 504.
Actaea spicata 63. 71. 81. 199. 200. 220.
Adenophora suaveolens 594. 682.
Adenostyles albifrons 677.
Adenostyles alpina 467.
Adonis aestivalis 163. 234.
A. autumnalis 562.
A. flammea 372.
A. vernalis 76. 98. 104. 253. 266.
Adoxa Moschatellina 43. 50. 154. 331. 366.
Aegilops incurvata 284.
A. ovata 157. 206. 208. 308. 352.
A. triaristata 275.
A. triuncialis 275.
Aegopodium Podagraria 323. 400. 401. 557. 708.
Aesculus Hippocastanum 58. 176.
Aethionema gracile 56. 171.
Aethionema saxatile 56. 78. 126. 171. 213. 308.
Aethusa Cynapium 401. 495. 536. 557.
Agave americana 724. 736.
Agraphis campanulata 58. 176.
A. cernua 58. 176.
A. nutans 44. 46. 138. 144. 334.
A. agrimonioides 66. 142. 192. 337. 342.
A. Eupatorium 417. 445. 451. 496. 512. 542. 548. 558.
A. repens 392.
Agropyrum acutum 476.
A. acutum β . *affine* 607.
A. caninum 407. 536.
A. cristatum 192. 300. 308. 347.
A. glaucum 426. 455. 476. 490. 500. 541.
A. intermedium 254. 300. 309. 310. 321. 489.
A. junceum 643.
A. littorale 639.
A. pungens 476.
A. repens 322. 401. 415. 428. 541. 557.
A. rigidum 450. 473. 503. 514.
A. strictum 490.
Agrostemma Coronaria 409. 422. 454. 455. 528.
A. Flos Jovis 387.
A. Githago 621.
Agrostis alpina 582.
A. arundinacea 477. 536.
A. Calamagrostis 421. 522.
A. canina 403. 450. 507. 535. 550.
A. capillaris 192.
A. interrupta 370.
A. littoralis 645.
A. maritima 638.
A. minima 37. 119. 296.
A. rupestris 565.
A. serotina 588.
A. Spica venti 370.
A. stolonifera 208. 239. 355. 368. 441.

- Agrostis vulgaris* 192. 248. 346. 364.
Aira aquatica 589. 650.
A. caespitosa 478. 550.
A. caespitosa c. alpina 704.
A. canescens 486.
A. capillaris 275.
A. caryophyllea 211. 300. 317. 758. 763.
A. cristata 180. 301. 318.
A. flexuosa 206. 245. 290. 565.
A. flexuosa Var. b. 565.
A. hirsuta 578.
A. montana 565.
A. praecox 122. 300.
A. subspicata 325.
A. uliginosa 726.
A. valesiaca 51. 281.
Ajuga Chamaepitys 355.
A. montana 255. 302.
A. pyramidalis 198. 246. 526. 550.
A. reptans 93. 240.
Albucea nutans 239. 353. 364.
Alcea rosea 394.
Alchimilla alpina 165. 382.
A. arvensis 371. 412.
A. fissa 165. 220. 326. 744. 750. 751. 761. 765.
A. pentaphyllea 579.
A. pubescens 165.
A. vulgaris 92. 150. 240.
Alectorolophus hirsutus 634. 653.
A. major 429. 478.
A. major β . *alpestris* 429. 521.
A. minor 246. 318. 357.
Alisma natans 540.
A. parnassifolium 498.
A. Plantago 540. 689.
A. ranunculoides 504.
Alliaria officinalis 112. 122. 138. 155. 302. 324. 335. 367.
Allium acutangulum 605.
A. Ampeloprasum 561.
A. arenarium 489. 588.
A. ascalonicum 392.
A. carinatum 588. 560.
A. Cepa 585.
A. crinitum 397.
A. danubiale 551.
A. flavum 630.
A. fistulosum 392.
A. foliosum 570.
A. ochroleucum 678.
A. oleraceum 560. 620.
Allium Ophioscorodon 585.
A. paniculatum 630.
A. roseum 353.
A. rotundum 561. 588.
A. Schoenoprasum 392. 427. 503.
A. Scorodoprasum 397.
A. senescens 706. 722.
A. sibiricum 716.
A. sphaerocephalon 545. 588.
A. strictum 603.
A. suaveolens 656. 664.
A. ursinum 106. 270.
A. Victoralis 613. 678.
Alnus glutinosa 9. 13. 26. 37. 82. 115.
A. incana 27. 87.
A. viridis 167. 288. 327.
Alopecurus agrestis 52. 147. 149. 159. 346. 352.
A. creticus 159. 346. 352.
A. fulvus 598.
A. geniculatus 598.
A. monspeliensis 470.
A. nigricans 355.
A. pratensis 322. 355.
A. utriculatus 275.
Alsine marginata 644. 651.
A. marina 651.
A. media 1. 2. 7. 8. 17. 20. 42. 53. 65. 133. 160. 189. 321. 323.
Alsine rubra 296.
A. segetalis 441.
A. viscosa 298.
Althaea cannabina 619. 623. 683. 742.
A. hirsuta 402. 496.
A. officinalis 437. 503. 552. 623. 652.
A. pallida 369. 452. 546.
A. rosea 394.
Alyssum alpestre 377.
A. calycinum 100. 113. 120. 147. 257. 297. 349. 516. 753. 756. 758. 767.
A. edentulum 263.
A. incanum 254. 282. 300. 516.
A. minimum 122. 147. 301. 349.
A. montanum 25. 31. 78. 98. 104. 212. 253. 265. 421. 712. 720. 727.
A. saxatile 103. 113. 263. 282.
A. sinuatum 190. 305.
A. utriculatum 263.
A. Wulfenianum 327.
Amaranthus adscendens 627. 649.
A. Blitum 593.
A. caudatus 587.
A. prostratus 593.
A. retroflexus 593. 660.
A. spicatus 593. 660.
A. silvestris 593.
Amaryllis lutea 111. 207. 240. 277. 282.
Ammi majus 592. 658. 663.
Ammophila arenaria 643.
A. baltica 645.
Ampelopsis quinquefolia 585.
Amygdalus amara 58. 176.
A. campestris 58. 17.
A. communis 58. 176. 790.
A. fragilis 58. 176.
A. nana 71. 98. 200. 253.
A. Nucipersica 58. 176.
A. Persica 58. 176.
A. Persico amygdala 353.
Anacamptis pyramidalis 203.
Anacyclus Pyrethrum 586.
Anagallis arvensis 159.
A. Monelli 561.
A. tenella 669.
Anarrhinum bellidifolium 419.
Anastatica syriaca 157. 349.
Anchusa angustifolia 276.
A. arvalis 157. 208.
A. azurea 159. 347. 352.
A. leptophylla 491.
A. officinalis 157. 208. 322.
A. paniculata 470.
A. undulata 276.
A. verrucosa 371. 502.
Andrachne telephioides 472. 475. 478. 500.
Andromeda calyculata 115. 288.
A. coernlea 656.
A. polifolia 116. 135. 289. 329.
Andropogon contortum 602.
A. distachyos 241. 638. 662.
A. Gryllus 210. 248. 351. 352. 355. 362.
A. hirtus 638.
A. Ischaemum 601. 604. 630. 690.
A. Ravennae 649.
Androsace carnea 566.
A. Chamaejasme 165.

- Androsace elongata* 73.
A. lactea 381.
A. maxima 73. 147. 204. 348.
A. obtusifolia 675.
A. septentrionalis 204.
A. villosa 385.
A. Vitaliana 575.
Androsaemum officinale 368. 613.
Anemone alpina 166. 431. 519. 521.
A. baldensis 580.
A. Burseriana 457.
A. Hepatica 4. 9. 10. 11. 23. 28. 32. 71. 87. 99.
A. hortensis 12. 28. 33. 89. 101.
A. montana 100. 257.
A. narcissiflora 380. 524. 681.
A. nemorosa 10. 13. 19. 28. 34. 60. 89. 94. 107. 109. 181. 234. 244. 270.
A. patens 95. 99. 117. 246. 254. 290.
A. pratensis 97. 131. 251. 320.
A. Pulsatilla 12. 13. 34. 38. 61. 105. 121.
A. ranunculoides 22. 28. 31. 34. 35. 68. 88. 98. 107. 108. 195. 254. 271.
A. silvestris 68. 88. 102. 146. 196. 203. 261. 345.
A. trifolia 57. 94. 173. 244. 273.
A. vernalis 60. 97. 116. 166. 181. 251. 290. 385. 431.
Anethum Foeniculum 391. 401. 495.
A. graveolens 391.
Angelica Archangelica 613.
A. montana 566.
A. pyrenaica 708.
A. silvestris 687. 694.
A. verticillaris 582.
Anthemis agrestis 413.
A. alpina 569.
A. arvensis 2. 7. 373. 413.
A. austriaca 456.
A. Cotula 598. 623. 649. 660. 674. 692.
A. mucronulata 378.
A. nobilis 395.
A. Pyrethrum 586.
A. tinctoria 606.
Anthericum calyculatum 377. 478.
Anthericum calyculatum b. 704.
A. Liliago 418. 455. 456. 535.
A. Liliastrum 578.
A. ossifragum 647.
A. ramosum 535. 555. 557.
A. serotinum 380. 385. 458. 518.
Anthoxanthum aculeatum 665.
A. odoratum 21. 44. 48. 55. 66. 137. 150. 169. 191. 322. 334. 355.
A. odoratum b. paniculatum 55.
Anthriscus Cerefolium 65. 154. 189. 366.
A. nodosa 304. 353.
A. trichosperma 74. 95. 125. 205. 245. 304.
A. vulgaris 495. 557.
Anthyllis alpestris 385. 456.
A. maritima 477.
A. montana 412. 466.
A. Vulneraria 5. 14. 41. 131.
Antirrhinum alpinum 170. 577. 626.
A. angustissimum 681.
A. arvense 652.
A. Asarina 678.
A. bellidifolium 419.
A. chalepense 157.
A. Cymbalaria 78. 113. 212. 282.
A. Elatine 652.
A. genistaefolium 635.
A. junceum 645.
A. Linaria 601.
A. majus 474. 483.
A. minus 190. 305.
A. monspessulanum 653.
A. Orontium 372.
A. pelisserianum 161.
A. repens 653.
A. simplex 562.
A. spurium 700.
A. triphyllum 193.
Apera interrupta 370.
A. Spica venti 370.
Apium graveolens 589. 610. 651. 689.
A. Petroselinum 391.
Aquilegia nigricans 522. 526.
A. platysepala 339.
A. pyrenaica 618. 635. 679.
A. Sternbergii 432. 435.
Aquilegia vulgaris 266. 465.
Arabis alpina 168. 172. 213. 266. 327. 328. 421. 465. 755.
A. arenosa 69. 94. 122. 197. 244. 299. 747. 751. 753. 759.
A. auriculata 62. 102. 184. 260.
A. bellidifolia 171. 571. 617. 626.
A. brassicaeformis 439. 463.
A. ciliata 378. 386. 457.
A. coerulea 581.
A. Crantziana 33. 103. 754.
A. crispata 167.
A. Halleri 618.
A. hirsuta 51. 62. 85. 132. 135. 153. 185. 224. 321. 328. 363.
A. nemorensis 338.
A. ovirensis 167.
A. procurrens 79. 215.
A. sagittata 183. 209. 242. 319.
A. scabra 459.
A. stricta 168.
A. Thaliana 17. 23. 47. 54. 74. 148. 162. 204. 205. 349.
A. Turrita 200.
A. verna 21. 65.
A. vochinensis 101. 259.
Arbutus alpina 380.
A. Unedo 761. 763. 766.
A. Uva ursi 217. 224. 290. 328.
Archangelica officinalis 613. 616.
Arctium Lappa α . 692.
A. majus 619.
A. Personata 590.
A. tomentosum 602.
Arctostaphylos alpina 380.
A. Uva ursi 217. 224. 290. 328.
Aremonia agrimonioides 66. 142. 192. 337. 342.
Arenaria austriaca 571.
A. bavarica 56. 171.
A. biflora 677.
A. cespitosa 286.
A. ciliata 500. 525.
A. fastigiata 588.
A. Gerardi 379. 421. 523.
A. grandiflora 263.
A. lanceolata 379.
A. laricifolia 632.
A. macrocarpa 679.
A. media 644. 651.

- Arenaria multicaulis* 676.
A. peploides 285.
A. polygonoides 676.
A. recurva 580.
A. rubra α . *campestris* 296.
A. rubra β . *marina* 651.
A. serpyllifolia 323. 628. 642. 655.
A. setacea 265.
A. sphagnoides 567.
A. striata 571.
A. tenuifolia 375.
A. thesiifolia 567.
A. trinervia 248. 269. 280. 338. 720.
A. verna 257. 299. 463.
A. Villarsii 583.
A. villosa 377.
Aretia glacialis 385.
A. helvetica 385.
Aristolochia Clematitis 354. 472.
A. longa 139. 149. 335. 354.
A. pallida 232.
A. rotunda 335. 354.
Armeria alpina 574.
A. maritima 644.
. plantaginea 652. 684.
. vulgaris 182. 208. 301. 318. 736.
Arnica Doronicum 578.
A. glacialis 703.
A. montana 433. 449. 478. 512. 549.
A. scorpioides 632.
Arnoseris pusilla 163.
Aronia Amelanchier 83. 97. 105. 223. 250. 268.
A. Chamaemespilus 458.
A. cretica 166.
Aronicum Bauhini 701.
A. Doronicum 578.
A. glaciale 703.
A. latifolium 569.
A. scorpioides 632.
Arrhenatherum avenaceum 150. 155. 356. 365.
A. avenaceum *b. nodosum* 486.
Artemisia Absinthium 643. 660. 697.
A. austriaca 708.
A. caerulescens 724.
A. campestris 712. 720. 724. 728.
A. camphorata 720. 722.
A. Dracunculus 705.
A. glacialis 580.
A. helvetica 576.
. laciniata 763.
Artemisia lanata 569.
A. maritima 756.
A. Mutellina 677.
A. pontica 712.
A. rupestris 749. 758.
A. salina 756. 760.
A. scoparia 712. 721. 724.
A. spicata 580.
A. valesiaca 378.
A. vulgaris 643. 660. 697.
Arthrolobium scorpioides 54. 117. 149. 163. 292. 354.
Arum Dracunculus 36. 112. 279.
A. italicum 87. 233.
Arum maculatum 34. 107. 270.
Arundo acutiflora 428.
A. arenaria 643.
A. Calamagrostis 399. 442. 554.
A. Epigeios 610.
A. festucacea 625.
A. glauca 610.
A. montana 593. 678.
A. Pseudo-Phragmites 426. 440. 489. 666.
A. stricta 539. 553.
A. tenella 565.
Asarum europaeum 30. 35. 94. 109. 244. 273.
Asclepias syriaca 585.
A. Vincetoxicum 211. 249. 309. 685.
Asparagus acutifolius 619. 720.
A. aphyllus 724.
A. marinus 277.
A. officinalis *b.* 233. 401. 436. 447. 653.
A. tenuifolius 233.
Asperugo procumbens 51. 64. 67. 125. 156. 188. 194. 304. 743. 746. 747. 760.
Asperula arvensis 204.
A. cynanchica 462. 488.
A. galioides 211.
A. longiflora 678.
A. montana 406. 456.
A. odorata 86. 123. 302.
A. rivalis 610. 620.
A. taurina 72. 201.
A. tinctoria 421. 439.
Asphodeline lutea 217.
Asphodelus albus 470.
A. fistulosus 545.
A. ramosus 111. 277.
Aster alpinus 525.
A. amelloides 717.
Aster Amellus 604. 620.
A. annuus 475. 497. 535.
A. canus 751.
A. Novi Belgii 736.
A. salignus 715.
A. pannonicus 732.
A. Tripolium 644. 651. 694.
Asterocephalus agrestis 601. 696.
A. atropurpureus 391.
A. columbarius 396. 416. 547.
A. graminifolius 520.
A. gramuntius 589. 603.
A. lucidus 682.
A. ochroleucus 601. 628. 653.
A. Scopolii 639.
A. suaveolens 587. 601. 627. 634. 653. 670.
A. ucranicus 276.
Asterolinum stellatum 456. 545.
Astragalus alpinus 676. 704.
A. arenarius 490. 548.
A. asper 369. 404. 452. 492. 543.
A. austriacus 267. 300. 359.
A. baeticus 395.
A. campestris 381. 382. 386.
A. Cicer 209. 252. 297. 354.
A. exscapus 181. 320. 354.
A. incanus 309.
A. glycyphyllus 533.
A. hamosus 111. 278.
A. hypoglottis 453. 460. 512.
A. incurvus 112. 279.
A. leontinus 568.
A. microphyllus 465.
A. monspessulanus 19. 24. 49. 62. 77. 154. 184. 210. 279. 364.
A. montanus 411. 459. 548. 629.
A. Onobrychis 460. 550.
A. pilosus 431. 490. 500.
A. rotundifolius 410.
A. sordidus 701.
A. uralensis 576. 676.
A. valesiacus 580.
A. vesicarius 446. 460.
Astrantia Epipactis 27. 85. 136. 140. 229. 331. 337.
A. intermedia 596.
A. major 582. 597.
A. minor 519.
Athamanta Cervaria 706.
A. cretensis 632. 679.

- Athamantha daucifolia* 566.
A. Golaka 701.
A. Libanotis 635.
A. Matthioli 376. 418.
A. Meum 614.
A. Oreoselinum 706.
A. rupestris 603.
Atragene alpina 172. 379. 381.
Atriplex alba 642. 651. 658. 697.
A. angustifolia 592. 642. 697.
A. hastata 645. 694.
A. hortensis 592.
A. laciniata 644. 651.
A. littoralis 644.
A. marina 645.
A. microsperma 600. 609. 658.
A. nitens 559. 611. 697.
A. patula 592. 658. 697.
A. pedunculata 725.
A. portulacoides 644.
A. tatarica 602. 642. 690.
A. triangularis 644. 651.
Atropa Belladonna 618.
A. Mandragora 745.
A. physaloides 678.
Avena alpestris 565.
A. argentea 565. 678.
A. aurata 579.
A. brevis 621.
A. bulbosa 486.
A. calycina 182. 308.
A. distichophylla 703. 709. 719.
A. elatior 150. 155. 356. 365.
A. fatua 370.
A. flavescens 376. 554.
A. flavescens b. lutescens 554.
A. flavesc. c. variegata 376.
A. fragilis 206.
A. hirsuta 244. 347.
A. nuda 621.
A. orientalis 584.
A. planiculmis 411.
A. praeusta 565.
A. pratensis 587. 597.
A. pubescens 396. 436. 547. 557.
A. pubescens b. alpina 704.
A. sativa 584.
A. Scheuchzeri 575.
A. sempervirens 605.
A. strigosa 440.
A. sterilis 188.
A. tenuis 370. 587.
A. trisperma 584.
Azalea procumbens 165. 384.
Baldingera arundinacea 441. 503. 507.
Ballota foetida 659.
B. nigra 642. 698.
B. urticifolia 642. 659.
Barbarea arcuata 80. 218.
B. stricta 220. 222. 501.
B. vulgaris 54. 61. 82. 160. 181. 222. 324.
Barkhausia alpina 404.
B. bursifolia 158. 358.
B. cernua 279.
B. foetida 419. 457. 461. 479.
B. graveolens 452. 497. 502. 512.
C. hispida 358.
B. pinguis 266.
B. praecox 162.
B. rhoeadifolia 259. 203. 417.
B. stricta 640.
B. taraxacifolia 358.
Bartsia alpina 383. 389. 429.
Beckmannia erucaeformis 517. 550.
Bellidiastrum Michellii 106. 135. 151. 268. 269. 328. 359. 467.
Bellis perennis 4. 5. 12. 14. 32. 41. 42. 100. 130. 133. 256. 319. 325.
B. silvestris 471.
Berberis vulgaris 86. 230.
Berteroa incaua 254. 282. 300. 349. 490. 516.
B. viridis 277.
Beta Cicla 585.
B. maritima 723.
B. vulgaris 585.
Betonica Alopecurus 459.
B. hirsuta 513.
B. hirta 597. 688.
B. officinalis 405. 555.
B. stricta 631.
Betula alba 121. 139. 299. 336.
B. Alnus 9. 13. 26. 37. 82. 115.
B. carpathica 224.
B. fruticosa 116.
B. incana 27. 87.
B. nana 480.
B. pubescens 317.
B. viridis 167. 288. 327.
Bidens bipinnata 700.
B. cernua 718. 732. 733.
B. tripartita 718.
Bifora radians 160. 316.
B. testiculata 294.
Biscutella ciliata 251.
B. laevigata 78. 104. 121. 171. 267. 300. 755. 758.
B. saxatilis 263.
Blitum Bonus Henricus 64. 124. 188. 303. 627.
Bl. capitatum 591.
Bl. chenopodioides 657.
Bl. crassifolium 714. 730. 732.
Bl. rubrum 598. 606. 672. 713.
Bl. virgatum 591. 610.
Bl. virgatum β . 657.
Blysmus compressus 477.
Bl. rufus 476. 489.
Bonaveria Securidaca 279.
Bonjeanea hirsuta 232. 319.
Borrago officinalis 591. 677.
Brachypodium cespitosum 206. 261.
Br. gracile 468. 527. 607.
Br. Hostii 470.
Br. pinnatum 423. 499. 536.
Br. tenellum 414. 429.
Brassica alpina 439. 463.
Br. austriaca 294.
Br. campestris 162. 178.
Br. cheiranthiflora 207. 283. 355.
Br. Cheiranthus 222.
Br. Napus 59. 178.
Br. oleracea 179.
Br. orientalis 572.
Br. praecox 562. 586.
Br. Rapa 59. 179.
Braya alpina 575.
Briza Eragrostis 370. 491. 541.
Br. maxima 211. 346. 352.
Br. media 416.
Br. media β . repens 645.
Br. minor 159.
Bromus arvensis 370.
Br. asper 637.
Br. cespitosus 206. 261.
Br. commutatus 293.
Br. confertus 275.
Br. distachyos 206.
Br. cristatus 192. 300. 308. 347.
Br. divaricatus 370.
Br. erectus 625. 628. 693.
Br. giganteus 468.
Br. gracilis 468. 527. 607.

- Bromus inermis* 416.
 515. 556.
Br. madritensis 281. 347.
 352.
Br. mollis 281. 318. 347.
 356. 515.
Br. multiflorus 621.
Br. patulus 293.
Br. pinnatus 423. 499. 536.
Br. racemosus 188. 240.
Br. ramosus 470.
Br. secalinus 621.
Br. secalinus b. divergens
 563.
Br. squarrosus 554.
Br. sterilis 322. 368. 473.
 482. 527. 556.
Br. tectorum 181. 205. 281.
 304. 322. 347.
Bryonia alba 558.
Br. dioica 558.
Bulliarda aquatica 714.
B. Vaillantii 223. 345.
Bunium Bulbocastanum
 164. 225. 250. 327. 515.
Bunias Erucago 205. 226.
 294. 354.
B. macroptera 349.
B. orientalis 157. 305. 367.
Buphthalmum salicifo-
lium 224. 268. 327.
B. speciosissimum 569. 595.
B. spinosum 640.
Bupleurum aristatum 600.
B. falcatum 595. 634.
B. Gerardi 693. 698.
B. graminifolium 570.
B. longifolium 635.
B. protractum 234. 353.
B. ranunculoides 603.
B. rotundifolium 369. 441.
B. semicompositum 639.
B. stellatum 570.
B. tenuissimum 651.
Burgesdorfia montana
 268. 300.
B. romana 277.
Butomus umbellatus 505.
Buxus sempervirens 67.
 193.
B. sempervirens β . *suffru-*
tica 67. 193.
B. suffruticosa 67. 193.
Cacalia albitrons 677.
C. alpina 467.
C. sarracenica 717.
Cakile maritima 644.
Calamagrostis acutiflora
 428.
C. Epigeios 610. 631.
Calamagrostis glauca 610.
C. Hübneriana 610.
C. lanceolata 399. 442. 554.
C. laxa 426. 489.
C. montana 593. 678.
C. nutans 612.
C. Pseudophragmites
 440.
C. pulchella 686.
C. pyramidalis 406.
C. silvatica 471. 536.
C. stricta 539.
C. tenella 565.
Calamintha grandiflora
 582.
C. Nepeta β . *praealta*
 639.
C. officinalis 688.
C. thymifolia 422.
Calendula arvensis 373.
C. officinalis 59. 179.
Calla palustris 505.
Callianthemum coriandri-
folium 519.
C. rutaefolium 55. 166.
Callitriche autumnalis
 400. 427. 443. 506.
 508. 511.
C. platycarpa 400. 443.
 511.
C. platycarpa Var. *B.*
stagnatilis 508.
C. stagnalis 443. 481.
 517.
C. verna 29. 34. 37. 90.
 106. 117. 237. 269.
 292. 325. 481.
Calluna vulgaris 653.
Caltha palustris 29. 40.
 41. 91. 128. 129. 237.
 312. 314. 478. 752. 762.
Camelina austriaca 518.
C. dentata 469.
C. microcarpa 210. 216.
 282.
C. sativa 161. 178.
Campanula alpina 457.
C. Alpini 383.
C. barbata 169. 384. 520.
C. Baumgartenii 693.
C. bononiensis 409.
C. carnica 566.
C. Cervicaria 270.
C. cespitosa 379. 418.
C. crenata 462.
C. elatinoides 211. 281.
C. elliptica 594.
C. Erinus 189. 281.
C. glomerata 396. 530.
Campanula hederacea
 511.
C. Hostii 593. 683.
C. hybrida 621.
C. lanceolata 688.
C. latifolia 618.
C. lingulata 228.
C. linifolia 573. 612.
C. lunariaefolia 461. 545.
C. Morettiana 712.
C. patula 293. 356. 416.
 515. 739. 783.
C. persicifolia 255. 271.
 774. 775.
C. petraea 593.
C. pubescens 376.
C. pulla 376. 520.
C. pusilla 420. 433. 473.
C. pyramidalis 605. 641.
C. rapunculoides 401.
 527. 791. 795.
C. Rapunculus 76. 93. 96.
 208. 240. 249. 416. 515.
C. rhomboidalis 383.
C. rotundifolia 211. 281.
 348. 515.
C. sibirica 261. 295. 302.
C. simplex 391. 461. 545.
C. Speculum 483.
C. spicata 387.
C. suaveolens 594. 682.
C. thyrsoidea 566. 615.
C. trachelioides 371. 407.
C. Trachelium 637.
C. Zoysii 570. 632.
Camphorosma monspelia-
ca 655.
Cannabis sativ
Capsella Bursa pastoris
 21. 39. 42. 47. 65. 125.
 133. 147. 324. 349.
Capparis spinosa 212. 282.
Caragana arborescens
 59. 179.
Cardamine alpina 581.
C. amara 63. 84. 90. 118.
 145. 226. 298. 343.
C. amara b. 84.
C. asarifolia 409. 433.
C. Hayneana 548.
C. hirsuta 135. 328. 389.
C. impatiens 61. 63. 90.
 108. 110. 181. 186. 274.
C. maritima 278.
C. Opizii 84.
C. parviflora 508. 538.
C. petraea 33. 103. 263.
C. pratensis 151. 358.
C. prat. β . 548.
C. resedifolia 433. 525.

- Cardamine silvatica* 200. 201. 303. 341.
C. trifolia 80. 136. 219. 330. 523. 533. 617.
Cardaria Draba 496. 502. 539.
Carduus acanthoides 672. 692. 697.
C. arctioides 521.
C. canus 695.
C. carlinaefolius 170. 568.
C. carniolicus 568.
C. crispus 692.
C. crispus α . *pinnatifidus* 672.
C. crispus β . *integrifolius* 590. 611. 665. 686.
C. cyanoides 653.
C. defloratus 460. 721.
C. eriophorus 634.
C. Erysithales 682.
C. heterophyllus 597.
C. involucratus 417. 528.
C. lanceolatus 659.
C. marianus 678.
C. mollis 635. 653.
C. nutans 413. 417. 543.
C. nutans Var. β . 528.
C. palustris 647.
C. Personata 590. 679.
C. platylepis 600. 616.
C. polyacanthos 659. 697.
C. polyanthemus 543.
C. vivularis 409. 482. 522.
C. semipectinatus 521.
C. tataricus 552.
C. tenuiflorus 414. 692.
Carex acuminata 114. 286.
C. acuta 222. 236. 287. 290. 311. 315. 481.
C. Agastachys 196. 220. 336. 344. 359.
C. alba 72.
C. alpestris 57. 62. 134. 173. 184. 327.
C. ampullacea 90. 129. 236. 291. 315.
C. arenaria 82. 221.
C. argyroglochin 343.
C. aterrima 703.
C. atrata 173.
C. axillaris 507.
C. baldensis 170.
C. Bellardi 570.
C. bicolor 115. 287.
C. binervis 247.
C. Boenninghauseniana 552.
Carex brachystachys 378.
C. brevifolia 378.
C. brizoides 270.
C. Buxbaumii 291. 481. 505.
C. caespitosa 351. 361.
C. canescens 236. 315. 359.
C. capillaris 386. 390.
C. capitata 167. 312. 330.
C. chordorrhiza 317. 363.
C. clavaeformis 704.
C. contigua 361.
C. cyperoides 624. 649.
C. Davalliana 49. 152.
C. digitata 85. 140. 337.
C. dioica 287.
C. distans 116. 130. 288. 317.
C. divisa 218. 243. 255. 279. 285. 297. 361.
C. divulsa 270. 367.
C. Drymeja 72. 80. 107. 201. 219. 271.
C. elongata 236. 313. 315.
C. ericetorum 92. 95. 99. 116. 121.
C. extensa 476. 478. 484.
C. ferruginea 167. 310.
C. filiformis 116. 128. 289. 312.
C. firma 173. 378. 389.
C. flava 236. 315. 361.
C. foetida 569.
C. frigida 386. 704.
C. fuliginosa 704.
C. fulva 361.
C. Gebhardi 569.
C. geniculata 380. 388.
C. glauca 143. 382.
C. Grypos 378. 332. 390.
C. Heleonastes 317.
C. hirta 205. 219. 298. 315. 325. 334. 350. 359. 552. 553.
C. Hornschuchiana 362.
C. Hosteana 362.
C. humilis 19. 61. 68.
C. hybrida 701.
C. incurva 569.
C. intermedia 222. 236. 315. 361.
C. irrigua 581. 582.
C. Kochiana 218. 363.
C. lagopina 577.
C. leporina 90. 129. 236. 315.
C. leptostachys 82. 123. 128. 220. 303. 313. 505.
Carex leucoglochin 224. 289. 317.
C. limosa 289.
C. Linkii 279. 350.
C. membranacea 576. 580.
C. Michellii 69. 73. 105. 197. 203. 267.
C. microglochin 288. 327.
C. microstachya 507.
C. Mieliichhoferi 380. 466.
C. mollis 21. 67. 193.
C. Mönchiana 238.
C. montana 33. 72. 101. 172.
C. mucronata 168.
C. muricata 140. 338.
C. nemorosa 218.
C. nigra 705.
C. nitida 61.
C. nutans 123. 128. 312.
C. Oederi 298. 315. 325. 361.
C. ornithopoda 220. 289. 298. 336. 361.
C. pallescens 236. 335. 361.
C. paludosa 316.
C. panicea 148. 152. 351. 361.
C. paniculata 236. 311.
C. paradoxa 90. 115. 236. 287.
C. pilosa 70. 144. 199.
C. pilulifera 117.
C. praecox 91. 121. 133. 152. 325.
C. Pseudo-Cyperus 90. 128. 129. 236. 291. 311. 315. 362. 481.
C. pulicaris 314.
C. punctata 222. 255.
C. reflexa 553.
C. remota 218.
C. repens 346.
C. riparia 82. 128. 129. 222. 311. 315.
C. rupestris 386.
C. salina 285.
C. saxatilis 431. 550.
C. Schraderi 312.
C. Schreberi 19. 24. 32. 62. 76. 99. 133. 210. 255. 325.
C. secalina 81. 120. 219. 298.
C. spicata 363. 510.
C. stellulata 220. 236. 315.
C. stenophylla 121. 122. 139. 300. 301. 337.

- Carex stricta* 90. 129.
C. supina 287. 258.
C. teretiuscula 236. 317.
C. tetanica 225. 429.
C. thuringiaca 34. 107. 270.
C. tomentosa 122. 152.
 301. 361.
C. tripartita 569.
C. tuberosa 695.
C. uliginosa 477.
C. umbrosa 108. 123. 146.
C. ustulata 701.
C. vesicaria 90. 116. 129.
 236. 289. 315.
C. vesicaria b. 72. 201.
C. virens 218. 236.
C. vulpina 236. 312. 315.
 345.
Carlina acaulis 560. 604.
 334.
C. corymbosa 662.
C. lanata 640.
C. longifolia 701.
C. racemosa 675.
C. vulgaris 560. 734.
Carpesium abrotanoides
 729.
C. cernuum 607. 692.
Carpinus Betulus 139. 336.
C. duinensis 36. 112.
C. Ostrya 280.
Carthamus lanatus 600.
C. tinctorius 586.
Carum Bunias 630.
C. Carvi 153. 363.
Castanea vesca 60. 83.
 139. 180. 224.
Catapodium Halleri 548.
C. loliaceum 206. 241. 347.
Caucalis daucoides 163.
 234.
C. grandiflora 371.
C. helvetica 561.
C. latifolia 621.
C. leptophylla 160. 353.
Celtis australis 111. 138.
 143. 335.
Cenchrus capitatus 275.
C. racemosus 486.
Centaurea adonidifolia
 696.
C. amara 721.
C. austriaca 617. 688.
C. badensis 629.
C. Calcitrapa 623. 645.
 651. 654.
C. cristata 711.
C. Crupina 373. 452.
C. Cyanus 441.
C. decipiens 694.
C. Fischeri 378.
Centaurea Jacea 417. 419.
 452. 543. 672.
C. karschtiana 640.
C. montana 636.
C. muricata 629.
C. nigra 688.
C. nigrescens 692. 694.
C. paniculata 602. 629.
 643. 660.
C. phrygia 574.
C. pratensis 694.
C. Rhapontica 594.
C. rupestris 472.
C. Scabiosa 563. 602.
 629. 693.
C. solstitialis 441.
C. sordida 404. 472. 549.
C. Stoebe 629. 721.
C. stricta 460. 485.
C. variegata 378. 463.
C. variegata Var. 378.
Centranthus ruber 418.
 472.
Centrophylum lanatum
 600. 692. 693.
Centunculus minimus 375.
Cephalanthera ensifolia
 184. 214.
C. pallens 184. 214.
C. rubra 588. 596.
Cerastium alpinum 567.
C. aquaticum 399. 427.
 438. 442. 503.
C. arvense 97. 118. 132.
 133. 147. 250. 321. 323.
 348. 749. 753. 763. 764.
 766.
C. brachypetalum 69. 79.
 87. 197. 216.
C. ciliatum 567. 679.
C. grandiflorum 567.
C. lanatum 570.
C. latifolium 581.
C. manticum 164. 360.
C. pumilum 7. 8. 13. 14.
 18. 19. 37. 41. 54. 60.
 118. 130.
C. semidecandrum 18. 19.
 37. 41. 54. 60. 118. 130.
 133. 164. 194. 323.
C. silvaticum 536.
C. triviale 65. 91. 113. 125.
 130. 147. 189. 237. 304.
 318. 323. 348. 474.
C. viscosum 65. 91. 113.
 125. 130. 147. 189. 237.
 304. 318. 348. 474.
C. vulgatum 2. 5. 14. 131.
 133. 189. 320. 323.
Ceratocephalus falcatus
 38. 39. 47. 119. 125. 146.
Ceratophyllum apicula-
 tum 444. 498. 509.
C. demersum 444. 498.
 509.
C. platyacanthum 444.
 498. 500.
C. submersum 498. 509.
Cercis Siliquastrum 127.
Cerinthe aspera 414.
C. glabra 168. 170. 388.
C. maculata 526. 550.
C. major 470.
C. minor 371.
C. strigosa 600.
Cervaria Rivini 706. 720.
 740.
Chaerophyllum aromati-
 cum 223. 334. 339. 345.
Ch. aureum 424. 435. 523.
Ch. bulbosum 230. 332. 366.
Ch. Cicutaria 386. 408. 482.
Ch. hirsutum 407. 523.
Ch. maculatum 523.
Ch. nemorosum 526.
Ch. silvestre 76. 86. 90.
 143. 150. 208. 230. 235.
 323. 332. 356.
Ch. temulum 230. 302.
 304. 366.
Chaetospora ferruginea
 286.
Chaiturus Marrubiastrum
 658. 691.
Chamaerepes alpina 574.
Chara aculeolata 733.
Ch. aspera 730. 733. 739.
Ch. baltica 646.
Ch. barbata 730. 734.
Ch. batrachosperma 735.
Chara Braunii 733.
Ch. canescens 645. 661.
Ch. flexilis 498. 508. 514.
Ch. fragilis 668. 689.
Ch. gracilis 726. 729. 735.
Ch. hispida 668.
Ch. longibracteata 707.
 718.
Ch. nidifica 725. 733. 735.
Ch. opaca 710. 733.
Ch. syncarpa 668.
Ch. tenuissima 739.
Ch. tomentosa 661.
Ch. translucens 730. 733.
Ch. vulgaris 730. 733.
Cheiranthus annuus 393.
 640.
Ch. Cheiri 179. 283.
Ch. cuspidatus 126. 154.
 308. 364.
Ch. erysimoides 222. 264.
Ch. fenestralis 393.

- Cheiranthus incanus* 278.
Ch. varius 227. 278. 301. 501.
Ch. viridis 394.
Chelidonium corniculatum 372. 462. 486. 496.
Ch. Glaucium 428. 476.
Ch. majus 113. 125. 133. 282. 305. 324. 367.
Chenopodium acutifolium 591. 652.
Ch. album 591.
Ch. album Var. β . *riparium* 675.
Ch. Bonus Henricus 64. 124. 188. 303.
Ch. Botrys 375. 490.
Ch. crassifolium 714.
Ch. ficifolium 561. 663.
Ch. glaucum 600. 609.
Ch. glomerulosum 591.
Ch. hybridum 591.
Ch. maritimum 725.
Ch. murale 600. 641. 658. 672.
Ch. olidum 600. 641. 649. 658.
Ch. opulifolium 591.
Ch. paganum 591.
Ch. polyspermum 591. 658. 674.
Ch. rhombifolium 600. 606. 713.
Ch. rubrum 598.
Ch. Scoparia 294. 699.
Ch. urbicum 627. 641. 658. 697.
Ch. viride 591. 658.
Ch. Vulvaria 600.
Cherleria octandra 575.
Ch. sedoides 577.
Chilochloa aspera 156.
Ch. Boehmeri 255. 365.
Ch. cuspidata 275.
Chimophila umbellata 411. 449.
Chlora acuminata 609.
Ch. perfoliata 368.
Ch. serotina 714.
Chondrilla acanthophylla 485.
Ch. juncea 474. 562. 653. 691.
Ch. prenanthoides 447.
Ch. rigens 491.
Chrysanthemum alpinum 577.
Chr. corymbosum 440. 531.
Chr. Halleri 577.
Chr. inodorum 563.
Chrysanthemum Leucanthemum 358. 702.
Chr. montanum 554.
Chr. segetum 563.
Chrysocoma Linosyris 604. 630. 694.
Chrysosplenium alternifolium 25. 45. 50. 75. 80. 81. 143. 154. 205. 220. 333.
Chr. oppositifolium 20. 22. 25. 37. 63. 69. 80. 117. 186. 197. 292.
Chrysurus aureus 308.
Cicendia filiformis 647.
Cicer arietinum 395.
C. physodes 586.
C. sativum 586.
Cichorium Endivia 586.
C. Intybus 672. 691.
Cicuta virosa 624. 666. 668. 674.
Cimicifuga foetida 682.
Cineraria alpestris 569.
C. alpina α . 683.
C. alpina β . 680. 713.
C. alpina γ . *integrifolia* 227. 344.
C. arachnoides 358.
C. aurantiaca 569. 616. 696.
C. campestris 227. 344.
C. cordifolia 683.
C. crassifolia 709.
C. crispa 716.
C. crocea 716.
C. longifolia 574.
C. palustris 503.
C. papposa 569.
C. pratensis 384.
C. rivularis 613.
C. Schkuhrii 709.
C. sibirica 614. 667.
C. spathulaefolia 397. 435. 550.
C. sudetica 716.
Circaea alpina 595.
C. intermedia 595.
C. lutetiana 637.
Cirsium acaule 444. 543. 544. 555. 629.
C. ambiguum 680.
C. anglicum 412.
C. arvense 363.
C. canum 695.
C. carniolicum 568.
C. eriophorum 634.
C. Erisithales 682.
C. heterophyllum 597. 679. 694.
Cirsium hybridum 695.
C. inerme 695.
C. lanceolatum 659. 692. 697.
C. montanum 595.
C. nemorale 685.
C. oleraceum 505. 551.
C. palustre 647. 667.
C. Pumilio 568.
C. rigens 695.
C. rivulare 409. 482. 522. 525.
C. semidecurrens 670. 686.
C. semipectinatum 521.
C. serratuloides 412. 534.
C. spinosissimum 568.
C. tataricum 552.
C. tuberosum 695.
Cistus alpestris 171. 458.
C. canus 244. 263.
C. creticus 309.
C. Fumana 465.
C. grandiflorus 184. 320.
C. guttatus 454.
C. Helianthemum 397. 513.
C. incanus 277.
C. Ledon 277.
C. monspeliensis 309.
C. salvifolius 193. 309.
C. villosus 277.
Citrus Aurantium 179.
C. media 179.
Cladium Mariscus 666. 668.
Clematis angustifolia 646.
Cl. erecta 596. 620.
Cl. Flammula 662. 684.
Cl. integrifolia 506.
Cl. recta 596.
Cl. Vitalba 619. 634. 698.
Cl. Viticella 231. 367.
Clinopodium vulgare 588. 604. 619. 623. 667. 686.
Clypeola maritima 471.
Cnicus acaulis 444. 543. 544. 555. 629.
Cn. anglicus 412.
Cn. montanus 595.
Cn. oleraceus 505. 551.
Cn. pygmaeus 576.
Cn. serratuloides 412. 534.
Cn. apioides 662.
Cn. Monnieri 625. 694.
Cn. palustris 618. 688.
Cochlearia anglica 36. 114. 285.
C. Armoracia 178. 190. 221. 235. 311.
C. Coronopus 592.

- Cochlearia danica* 114.
C. Draba 496. 502. 539.
C. glastifolia 278.
C. groenlandica 576.
C. officinalis 178. 285.
 295. 311.
Codonoprasum carinatum 560. 588. 693.
C. flavum 630. 635. 655.
C. oleraceum 560. 620.
 684.
C. paniculatum 630.
Colchicum autumnale 16.
 716. 740.
C. vernale 16. 150. 351.
 357.
Coleanthus subtilis 667.
Colutea arborescens 179.
 340.
Comarum palustre 287.
 312.
Conium maculatum 401.
 495.
Conringia austriaca 294.
C. orientalis 372.
C. Thaliana 17. 23. 47.
 54. 74. 148. 162. 204.
 205. 349.
Convallaria bifolia 96.
 109. 247. 272.
C. latifolia 72. 201.
C. majalis 109. 272.
C. multiflora 230. 235.
 287. 360.
C. Polygonatum 194. 230.
 254. 344.
C. verticillata 223. 332.
Convolvulus arvensis 159.
 189.
C. Cantabrica 257.
C. sepium 608. 618. 697.
C. siculus 470.
C. Soldanella 644.
Conyza squarrosa 600. 604.
Corallorrhiza innata 595.
 648.
Coriandrum sativum 371.
 585.
C. testiculatum 294.
Corispermum interme-
dium 714. 725.
C. nitidum 728.
Cornus mascula 12. 25.
 32. 79. 100.
C. sanguinea 409. 500.
C. suecica 478.
Coronilla cretica 252.
C. Emerus 142. 340.
C. montana 460. 620.
C. securidaca 279.
C. vaginalis 466.
Coronilla varia 370. 419.
 452. 461. 478. 512.
Corrigiola littoralis 596.
 674.
Cortusa Matthioli 172. 174.
 376. 383.
Corydalis bulbosa 21. 39.
 45. 67. 123. 141.
C. claviculata 440. 537.
C. digitata 22. 39. 45. 67.
 123. 141.
C. fabacea 19. 22. 39. 45.
 61. 67. 123. 141. 181.
C. lutea 213. 233. 293.
 309. 594.
C. ochroleuca 501. 640.
C. pumila 23. 70.
Corylus Avellana 3. 5. 6.
 11. 12. 15. 16. 30. 34.
 46. 50. 107. 155. 793.
C. Columna 139. 335.
C. tubulosa 112. 135. 279.
 327. 790.
Corynephorus canescens 486.
Cotoneaster tomentosa 212. 224.
C. vulgaris 79. 87. 100.
 104. 134. 215. 231. 257.
 265. 326.
Cotula coronopifolia 623.
 692.
Crambe aspera 307.
Cr. maritima 178. 285.
Crassula Magnolii 111.
Cr. rubens 52. 120. 160.
 296.
Crataegus Aria 71. 104.
 199. 201. 267.
Cr. Aria β . 225.
Cr. Azarolus 232. 253.
Cr. creticus 166.
Cr. monogyna 201.
Cr. Oxyacantha 324. 333.
 366.
Cr. Pyracantha 177.
Cr. torminalis 201. 250.
Crepis agrestis 209.
Cr. alpestris 436. 459. 533.
Cr. alpina 404.
Cr. apargioides 383. 506.
Cr. biennis 549. 789.
Cr. blattarioides 633.
Cr. bursifolia 158. 358.
Cr. cernua 279.
Cr. chondrilloides 419.
Cr. foetida 419. 457. 462.
 477.
Cr. glandulosa 266.
Crepis grandiflora 568.
 617. 682.
Cr. hispida 358.
Cr. hyoseridifolia 580.
Cr. lacera 463.
Cr. lodomeriensis 549.
Cr. montana 582. 669.
Cr. praecox 163.
Cr. pulchra 659. 691.
Cr. rhoeadifolia 259. 293.
 417.
Cr. stricta 640.
Cr. taraxacifolia 358.
Cr. tectorum 373. 474.
 497.
Cr. virens 601. 630. 691.
 696.
Crithmum maritimum 606. 642. 644.
Crocus biflorus 57. 175.
Cr. luteus 57.
Cr. reticulatus 23. 73.
Cr. sativus 745. 767.
Cr. susianus 26. 57.
Cr. vernus 18. 43. 49. 55.
 134. 151. 165. 169. 326.
 359.
Cr. vernus Var. b. 43.
Crucianella angustifolia 401. 518.
Crypsis aculeata 665.
Cr. alopecuroides 665.
Cr. schoenoides 638. 651.
 665.
Cucubalus baccifer 608.
 611. 620. 623. 664. 685.
C. Behen Var. 476.
C. catholicus β . 630. 714.
C. Otites 594.
C. tataricus 611.
C. viridis 377.
Cucumis Cantalupo 587.
C. Citrullus 587.
C. Melo 587.
C. sativus 587.
Cucurbita Lagenaria 395.
C. maxima 395.
C. Melopepo 395.
C. Pepo 395.
Cupressus horizontalis 8.
 18.
C. sempervirens 13. 36.
C. thujooides 60. 180.
Cuscuta alba 657.
C. Epilinum 638. 657.
C. Epithymum 657. 696.
C. europaea 657.
C. monogyna 657. 692.
 697.

- Cyclamen autumnale* 773. 780.
C. europaeum 124. 303. 759. 763.
C. repandum 145.
Cydonia vulgaris 177. 231. 366.
Cynanchum medium 617.
C. Vincetoxicum 211. 249. 309. 685.
Cynodon Dactylon 652. 674.
Cynoglossum montanum 533.
C. officinale 5. 14. 281. 304.
C. Omphalodes 44. 138. 334.
C. pictum 249. 347.
C. scorpioides 78. 86. 215. 230.
Cynosurus aureus 308.
C. caeruleus 33. 36. 43. 103. 115. 134.
C. cristatus 400. 424. 511. 514. 547.
C. distichus 518.
C. durus 296. 314.
C. echinatus 165. 347. 352. 356. 370.
C. ovatus 579.
C. spaerocephalus 579.
Cyperus esculentus 645.
C. flavescens 663. 673.
C. fuscus 719. 733. 735.
C. glomeratus 502.
C. longus 559. 622. 666.
C. Monti 673.
C. pannonicus 651.
C. patulus 518.
C. virescens 719. 733. 735.
Cypripedium Calceolus 229.
Cytisus alpinus 521.
C. angustifolius 521.
C. argenteus 78. 213. 263.
C. austriacus 267. 350. 685.
C. biflorus 213. 256. 753.
C. capitatus 139. 457.
C. falcatus 213. 267. 336.
C. hirsutus 69. 197. 253. 331. 453.
C. Laburnum 59. 179.
C. leucanthus 350. 354.
C. nigricans 406. 449. 452. 604.
C. purpureus 252.
C. sessilifolius 252.
C. supinus 142. 341. 578.
Czackia Liliastrum 766.
- Dactylis glomerata* 322. 416. 450. 467. 547.
D. hispanica 470.
D. maritima 470.
D. stricta 477. 494. 504.
Danthonia calycina 182. 308.
Daphne alpina 55. 77. 166. 211.
D. Cneorum 261. 290. 300.
D. Laureola 27. 50. 86. 154.
D. Mezereum 3. 9. 10. 23. 27. 71. 87. 783. 784.
D. striata 567.
Datura Stramonium 591. 657.
Daucus Carota 511. 547.
Delphinium Ajacis 372.
D. Consolida 372.
D. fissum 530.
D. intermedium 377. 431. 521.
D. Staphysagria 471.
Dentaria bulbifera 72. 201.
D. enneaphyllos 78. 86. 136. 215. 328.
D. glandulosa 70. 199.
D. heptaphyllos 111. 278.
D. pentaphyllos 136. 330.
Dianthus alpinus 636.
D. arenarius 492.
D. Armeria 257. 262. 296. 316. 333. 353. 416.
D. atrorubens 183. 333.
D. barbatus 383.
D. caesius 194. 198. 211. 427. 675.
D. Carthusianorum 601. 628. 671.
D. caryophylloides 506. 636.
D. Caryophyllus 293.
D. Caryophyllus inodorus 636.
D. deltoides 417. 511.
D. diminutus 531.
D. diutinus 256.
D. glacialis 520.
D. glaucus 628.
D. monspessulanus 632.
D. neglectus 613.
D. plumarius 415. 463. 534.
D. prolifer 418. 455. 528.
D. Scheuchzeri 570. 582. 679.
D. Seguieri 411.
D. serotinus 655.
D. silvestris 377. 523. 526.
D. superbus 619. 688.
- Dianthus vaginatus* 605. 630. 635.
D. velutinus 470.
D. virgineus 277.
D. virgineus Var. Jacquini 277.
D. virgineus β . elatior 277.
D. virgineus β . elongatus 63.
D. Waldsteinii 639.
Dichostylis fluitans 666.
Dictamnus albus 264.
D. Fraxinella 264. 265. 464.
Digitalis ferruginea 231. 258.
D. fulva 404.
D. grandiflora 421. 464. 519.
D. lutea 430.
D. ochroleuca 421.
D. purpurascens 594.
D. purpurea 421. 464.
Digitaria ciliaris 560. 591.
D. filiformis 560. 591.
D. sanguinalis 560. 591. 611. 641. 657. 693.
Diplachne serotina 588. 690.
Diplopappus annuus 475. 497. 535.
Diplotaxis Barrelieri 111. 278.
D. muralis 283. 306.
D. tenuifolia 474. 496. 543.
D. viminea 21. 40. 65. 126. 190. 306.
Dipsacus ferox 622. 690.
D. fullonum 628. 705.
D. fullonum α . 622.
D. fullonum β . 628. 705.
D. laciniatus 622. 671.
D. pilosus 622. 687.
D. silvestris 622. 671.
Doronicum austriacum 679.
D. Bauhini 701.
D. Bellidiastrum 106. 135. 151. 268. 328. 359.
D. latifolium 569.
D. longifolium 569.
D. Matthioli 229.
D. orientale 569.
D. Pardalianches 229.
D. Pardalianches α . 679.
D. scorpioides 522.
Dorycnium pentaphyllum 465.

- Draba aizoides* 33. 84. 103. 167. 226.
Dr. carinthiaca 576.
Dr. ciliata 377.
Dr. confusa 167.
Dr. contorta 167.
Dr. elongata 259.
Dr. fladnitzensis 568. 571. 580.
Dr. frigida 580.
Dr. laevigata 580.
Dr. lapponica 568.
Dr. muralis 24. 31. 36. 78. 92. 97. 113. 212. 241. 251. 282.
Dr. muricella 377.
Dr. nivalis 588.
Dr. praecox 23. 32. 74. 100. 205. 257.
Dr. pyrenaica 386.
Dr. rupestris 568.
Dr. Sauteri 385. 636.
Dr. stellata 568. 632.
Dr. tomentosa 576.
Dr. verna 7. 9. 13. 17. 21. 32. 38. 53. 65. 74. 99. 121. 161. 190. 204. 255. 300. 790. 791. 793. 794.
Dracocephalum austriacum 216. 267.
Dr. Moldavica 586.
Dr. Ruyschiana 530.
Drosera intermedia 646. 664.
Dr. longifolia 598. 710.
Dr. obovata 566.
Dr. rotundifolia 646. 664.
Dryas octopala 56. 94. 166. 243. 458.
Drypis spinosa 485.
Ecbalium agreste 640.
Echinaria capitata 275.
Echinochloa Crus galli 563. 598. 600. 622. 668.
Echinops Ritro 629.
E. sphaerocephalus 678.
Echinospermum deflexum 424. 439. 464.
E. Lappula 641. 657.
E. squarrosum 641. 657.
Echium italicum 375. 541.
E. rubrum 537.
E. vulgare 375. 412. 495. 515. 541.
E. Wierzbickii 375. 412. 495. 541.
Elaeagnus angustifolia 175.
Elatine Alsinastrum 661. 667. 669.
Elatine hexandra 610. 689.
E. Hydropiper 611. 668.
E. Schkuhriana 673.
E. triandra 673.
Elsholzia cristata 678.
Elymus arenarius 414. 426. 475. 488. 526.
Elymus europaeus 431. 520. 537.
Elyna spicata 570. 572.
Empetrum nigrum 170. 378. 436.
Ephedra distachya 420.
Ephemerum nemorum 186. 218. 228. 292. 399.
Epilobium alpestre 680.
E. alpinum 572.
E. angustifolium 610. 622. 686.
E. angustissimum 577.
E. collinum 595. 603. 628. 642.
E. hirsutum 666.
E. hypericifolium 404.
E. intermedium 624. 667.
E. montanum 196. 438. 608. 620. 685. 709.
E. nutans 615.
E. obscurum 589. 622. 650.
E. organifol 679. 681.
E. palustre 624. 667. 695.
E. parviflorum 628. 667.
E. persicinum 622. 664.
E. rivulare 624. 667.
E. roseum 589. 622. 664. 668.
E. rosmarinifolium 583. 616. 675.
E. tetragonum 664. 668.
Epimedium alpinum 56. 86. 172. 232.
Epipactis atrorubens 464. 522.
E. latifolia 618. 637.
E. microphylla 596.
E. palustris 670.
E. viridiflora 637.
Epipogium aphyllum 598. 710.
Eragrostis megastachya 370. 491. 541.
E. pilosa 650.
Eragrostis poaeformis 487.
E. verticillata 639.
Eranthis hiemalis 9. 11. 21. 22. 29. 67. 68. 92. 194. 196. 239. 791. 792.
Erica arborea 44. 138.
E. carnea 4. 11. 15. 32. 84. 99. 144. 225. 254. 342. 751. 753. 766. 773.
E. cinerea 432. 448.
E. herbacea 4. 11. 15.
E. Tetralix 646.
E. vulgaris 653.
Erigeron acris 185. 210. 284. 307.
E. alpinus 626. 633.
E. alpinus β . 604.
E. alpinus γ . 583.
E. canadensis 710. 724. 729. 742.
E. glabratus 583.
E. grandiflorus 604.
E. serotinus 707. 712. 724. 729. 734.
E. uniflorus 627. 676. 695.
E. viscosum 640.
Erinus alpinus 169. 384.
Eriophorum alpinum 477.
Eriophorum angustifolium 310. 317.
E. capitatum 382. 390. 507.
E. latifolium 128. 313.
E. polystachyon α . 310. 317.
E. polystachyon β . 128. 313.
E. Scheuchzeri 507.
E. triquetrum 286. 289.
E. vaginatum 115. 116. 286. 289.
Eritrichium nanum 677.
Erodium ciconium 92. 240.
E. cicutarium 18. 30. 31. 40. 42. 54. 92. 98. 126. 133. 164. 240. 306. 324.
E. malacoides 114. 126. 148. 283. 306. 350.
E. moschatum 162. 306.
E. pimpinellifolium 398. 548.
Erucastrum obtusangulum 121.
Ervum dispernum 373. 395.
E. Ervilia 562.
E. gracile 454.
E. hirsutum 373.
E. Lens 373. 395.
E. Lenticula 373. 1
E. monanthos 369.
E. tetraspermum 417. 446.
E. uniflorum 163.

- Eryngium alpinum* 566.
E. amethystinum 600. 691.
E. campestre 369. 451. 513. 542.
E. maritimum 644.
E. planum 416. 518. 556.
Erysimum Alliaria 112. 122. 138. 155. 280. 302. 324. 335. 367.
Erysimum angustifolium 728.
E. Barbarea 54. 61. 181. 222.
E. Barbarea α . 324.
Erysimum Barbarea β . 220. 222. 501.
E. carniolicum 263.
E. cheiranthoides 402. 496.
E. Cheiranthus 222. 264.
E. crepidifolium 103. 263.
E. diffusum 252. 283. 345.
E. hieracifolium 75. 82. 114. 125. 127. 207. 222. 283. 305. 309.
E. officinale 51. 114. 126. 147. 157. 278. 283. 306. 349.
E. repandum 162. 283. 305.
E. virgatum 460. 474. 496.
Erythraea Centaurium 588. 601. 670.
E. emarginata 767.
E. linarifolia 295. 725. 730.
E. lutea 470.
E. pulchella 651. 695.
E. spicata 609. 657.
Erythronium Dens Canis 25. 43. 45. 47. 81. 137. 143. 146. 331.
Euclidium syriacum 157. 349.
Eupatorium cannabinum 590. 623. 665. 687.
Euphorbia amygdaloides 529. 615.
E. angulata 254.
E. canescens 401. 496.
E. carniolica 70. 199.
E. coralloides 200. 217. 313. 424.
E. Cyparissias 24. 31. 42. 47. 76. 97. 132. 147. 209. 250. 321. 348. 749. 753. 763. 767.
E. dulcis 209. 223. 345. 398.
E. epithymoides 127. 308.
E. Esula 209. 221. 320. 364.
Euphorbia exigua 561. 658.
E. falcata 561. 693.
E. fragifera 66. 192.
E. Gerardiana 209. 221. 250. 262. 297. 345.
E. helioscopia S. 20. 592.
E. hiberna 258.
E. Lathyris 189.
E. lucida 665. 671. 692.
E. micrantha 592.
E. myrsinites 777.
E. nicaeensis 369. 412.
E. palustris 235. 313.
E. Paralias 477.
E. Peplis 471.
E. Peplus 401.
E. peploides 401. 496.
E. pilosa 404. 442. 498. 504. 529.
E. platyphyllos 592. 611. 658. 691.
E. retusa 53. 125. 160. 305.
E. salicifolia 333. 348.
E. saxatilis 265.
E. segetalis 234. 372.
E. serotina 711.
E. solissequa 109. 273.
E. stricta 189. 221. 348.
E. virgata 157. 235. 348. 357.
Euphrasia latifolia 91. 131. 238. 319.
E. lutea 630.
E. micrantha 627.
E. nemorosa 684.
E. Odontites 161.
E. Odontites β . 700.
E. officinalis 627. 671.
E. pratensis 694.
E. salisburgensis 574.
E. tricuspidata 568.
Evonymus europaeus 249. 332. 365. 720. 737. 742.
E. latifolius 223. 332. 520.
E. verrucosus 197. 245. 536.
Fagus Castanea 60. 83. 139. 180. 224.
F. silvatica 139. 336.
Falcaria Rivini 560.
Ferula Ferulago 603. 696.
Ferula rablensis 613.
F. sulcata 603. 696.
Festuca alpestris 376. 520.
F. alpina 575.
F. amethystina 397. 492. 514.
F. arundinacea 426. 425. 493.
F. bromoides 208. 350.
F. cristata 188. 346.
F. decumbens 597.
Festuca duriuscula 118. 318. 334. 356. 365. 368.
F. elatior 92. 150. 239. 356.
F. eskia 565.
F. ferruginea 565.
F. flavescens 565.
F. fluitans 443. 504. 508. 517.
F. glauca 215. 223. 284. 293. 299.
F. guestfalica 263.
F. Halleri 579.
F. inermis 416. 442. 515. 556.
F. latifolia 432. 537.
F. laxa 426.
F. montana 411.
F. Myuros 275.
F. nemorum 332.
F. nigrescens 381.
F. ovina 195. 211. 248. 290. 318. 326. 363.
F. ovina c. 195.
F. pannonica 248. 363.
F. poaeformis 565.
F. pratensis 92. 150. 239. 356.
F. pseudomyuros 281. 301.
F. pumila 606.
F. rubra 565. 587. 641. 670. 678. 684. 693.
F. rubra γ . 668.
F. rubra Var. f. 598.
F. Scheuchzeri 579.
F. sciuroides 281. 301.
F. silvatica 435.
F. spadicea 565.
F. trichophylla 598.
F. uniglumis 275.
F. vaginata 403. 553.
F. valesiaca 248. 301.
F. varia 573.
F. violacea 582.
F. vivipara 195.
Ficaria ranunculoides 26. 28. 39. 44. 83. 89. 123. 139.
Ficus Carica 604. 643.
Filago arvensis 629. 653.
F. germanica 653.
F. montana 629. 653.
F. pyramidata 652.
Fimbristylis annua 713.
F. dichotoma 713.
F. Micheliana 607. 673.
Foeniculum dulce 423.
F. officinale 391. 401. 495.
Fragaria chiloensis 178.
Fr. collina 274. 340.
Fr. eflagellis 178.
Fr. elatior 59. 137. 178. 527.

- Fragaria grandiflora* 178.
Fr. semperflorens 70. 199.
Fr. sterilis 76. 77. 97. 102. 209. 212. 251. 262.
Fr. vesca 42. 43. 44. 132. 133. 137. 140. 321. 324. 334. 338. 763. 764. 766.
Fr. vesca β . *pratensis* 137. 527.
Fr. vesca var. γ . 70. 199.
Fr. virginiana 178. 354. 428.
Frangula vulgaris 235. 313. 343. 365.
Frangula Wulfenii 217.
Fraxinus excelsior 81. 144.
Fr. Ornus 110. 275.
Fritillaria tenella 73.
Fumaria bulbosa 39. 45. 67. 123. 141.
F. bulbosa β . 19. 21. 22. 39. 45. 61. 67. 123. 141. 181.
F. bulbosa γ . 22. 39. 45. 67. 123. 141.
F. capreolata 65. 95. 190. 245.
F. claviculata 537.
F. lutea 213. 283. 293. 309. 594.
F. media 708. 723. 740. 755.
F. officinalis 402.
F. parviflora 162. 354. 402. 558.
F. pumila 23. 70.
F. Vaillantii 190.
Gagea arvensis 74. 204.
G. bohémica 40.
G. fistulosa 383.
G. lutea 28. 35. 52. 74. 89. 160. 204. 234. 271.
G. minima 28. 31. 47. 89. 99. 146.
G. pratensis 150.
G. pusilla 97. 150. 250. 357.
G. Schreberi 118.
G. spathacea 107.
G. stenopetala 118.
Galanthus nivalis 2. 3. 8. 10. 20. 23. 26. 27. 64. 72. 82.
Galega officinalis 369. 404. 438. 551. 558.
Galeobdolon luteum 72. 109. 201. 273.
Galeobdolon montanum 67. 195.
Galeopsis acuminata 560. 658. 691.
G. angustifolia 606. 634.
G. bifida 560. 658. 691. 698.
G. Galeobdolon 72. 109. 201. 273.
G. intermedia 662.
G. Ladanum 598. 622. 652.
G. ochroleuca 562.
G. pubescens 562. 642. 658. 691.
G. Tetrahit 562. 590. 592. 658. 691.
G. Tetrahit Var. β . *teucrioides* 669.
G. versicolor 562. 590. 608. 622. 623. 669. 679. 684. 685.
Galium anglicum 563.
G. Aparine 370. 436. 557.
G. aristatum 604. 620.
G. Bauhini 45. 141. 339.
G. boreale 478. 551.
G. Cruciata 80. 88. 217.
G. helveticum 566. 662.
G. lucidum 249. 356.
G. ochroleucum 308.
G. palustre 424. 504.
G. pedemontanum 296.
G. purpureum 456.
G. rotundifolium 245. 290.
G. rubrum 412.
G. saccharatum 371. 545.
G. saxatile 435.
G. silvaticum 467.
G. silvestre 145. 165. 246. 338. 343. 388.
G. spurium 371. 483. 541.
G. tricornis 371. 557.
G. trifidum 701. 734.
G. uliginosum 726.
G. verum 45. 110. 141.
G. verum 416. 450. 554.
Gastridium lendigerum 400. 518. 541.
Gaudinia fragilis 206.
Genista anglica 247. 238.
G. dalmatica 422.
G. decumbens 184. 320.
G. germanica 213. 252. 338.
G. nervata 548.
G. ovata 452.
G. pilosa 247. 257.
G. procumbens 466.
G. radiata 421.
G. sagittalis 254. 290.
Genista scariosa 455.
G. sericea 158. 362.
G. sibirica 471. 548. 660.
G. silvestris 264.
G. tinctoria 419. 452. 532.
G. tridentata 278.
Gentiana acaulis 168. 174. 318. 331. 356.
G. alpina 169. 384.
G. Amarella 711. 741.
G. angulosa 169.
G. angustifolia 169. 331.
G. asclepiadea 716. 727. 737.
G. bavarica 578.
G. campestris 709. 736. 741.
G. Centaurium 588. 601.
G. Centaurium β . 651.
G. chloraefolia 699.
G. ciliata 559. 634. 769.
G. cruciata 631. 696.
G. discolor 169.
G. filiformis 647.
G. frigida 579.
G. Froehlichii 566.
G. germanica 746. 747. 768.
G. glacialis 581.
G. imbricata 576.
G. linarifolia 295.
G. lutea 681.
G. nana 581.
G. nivalis 579.
G. obtusifolia 379. 431.
G. pannonica 702. 737.
G. Pneumonanthe 646. 666. 695.
G. prostrata 744.
G. pumila 384. 470.
G. punctata 573. 682.
G. purpurea 573.
G. spicata 609.
G. utriculosa 431. 526. 551.
G. verna 4. 13. 16. 37. 116. 289. 376. 726. 757.
Geracium aureum 170. 526. 574.
G. chondrilloides 574. 633.
G. cydoniaefolium 702.
G. incarnatum 383.
G. parviflorum 386.
G. paludosum 478. 506.
G. praemorsum 198. 253.
G. prenanthoides 737. 741.
G. succisaefolium 616. 679. 694.
Geranium argenteum 378. 582.
G. bohemicum 683.

- Geranium ciconium* 92. 240.
G. cicutarium 18. 30. 31. 40. 42. 54. 92. 93. 126. 133. 164. 240. 252. 306. 324.
G. columbinum 397. 398. 419. 439. 451. 501.
G. dissectum 163. 234. 306. 769. 777.
G. incisum 213. 283. 302. 354.
G. divaricatum 224.
G. macrorrhizon 57. 69. 88. 118. 127. 197. 233. 293. 309.
G. malacoides 114. 126. 148. 283. 306. 350.
G. molle 190. 283. 292. 306.
G. moschatum 162. 306.
G. nodosum 228. 309.
G. palustre 425. 442. 482. 493. 503.
G. phaenum 227. 228. 232. 264. 359.
G. pimpinellifolium 398. 548.
G. pratense 408. 548.
G. pusillum 190. 238. 283. 292. 367.
G. pyrenaicum 190. 195. 302. 367.
G. robertianum 87. 118. 124. 126. 127. 231. 293. 302. 306. 310.
G. rotundifolium 162. 209.
G. sanguineum 462. 487. 531.
G. silvaticum 378. 400. 520. 582. 583.
G. striatum 394.
Genm inclinatum 431.
G. intermedium 218. 235. 287. 340. 479.
G. montanum 169. 174. 429. 521.
G. reptans 580.
G. rivale 90. 115. 218. 235. 287. 340. 479.
G. rivali-urbanum 492.
G. urbanum 401. 493. 516. 531.
Gladiolus Bouchéanus 355.
Gl. communis 175. 239. 344. 352.
Gl. imbricatus 275. 554.
Glaucium corniculatum 372. 461. 496.
Gl. fulvum 496.
Glaucium luteum 428. 476.
Gl. rubrum 462. 542.
Glaux maritima 234. 294.
Glechoma hederaceum 20. 35. 68. 107. 109. 190. 273. 746. 755.
Gl. heterophyllum 270.
Gl. hirsutum 108. 272.
Globularia cordifolia 104. 267.
Gl. nudicaulis 420.
Gl. vulgaris 182. 184. 215.
Glyceria airoides 589. 650. 664.
Gl. aquatica 666. 668.
Gl. distans 234. 294. 310.
Gl. festucaeformis 484. 506.
Gl. fluitans 443. 504. 508. 517.
Gl. maritima 643.
Glycyrrhiza glabra 179.
Gl. spinescens 278.
Gnaphalium arenarium 653.
Gn. arvense 629. 653.
Gn. carpathicum 580.
Gn. dioicum 117. 120. 291. 297.
Gn. fuscum 683.
Gn. fuscum Var. 580.
Gn. germanicum 653. 669.
Gn. Leontopodium 576.
Gn. luteo-album 624. 654.
Gn. margaritaceum 716.
Gn. montanum 629. 653.
Gn. nudum 674.
Gn. pyramidatum 652.
Gn. silvaticum 687.
Gn. Stoechas 454.
Gn. supinum 580.
Gn. uliginosum 608. 673.
Goodyera repens 648.
Gratiola officinalis 221. 313.
Gymnadenia conopsea 361.
G. conopsea 538.
G. odoratissima 361.
G. ornithis 569.
G. suaveolens 384. 457.
Gypsophila acutifolia 601.
G. effusa 628. 630. 631.
G. fastigiata 628. 634. 652.
G. muralis 564. 642.
G. repens 170. 614. 626. 633. 679. 681.
G. rigida 255. 256. 258. 282.
G. serotina 700.
Habenaria albida 225. 242. 243. 328.
Hacquetia Epipactis 27. 85. 136. 140. 229. 331. 337.
Halimus pedunculatus 725. 727.
H. portulacoides 644.
Hedera Helix 746. 759. 766.
H. quinquefolia 585.
Hedypnois tubaeformis 279.
Hedysarum Caputgalli 402.
H. confertum 382.
H. coronarium 395.
H. obscurum 578. 615.
H. Onobrychis 395. 462.
Heleocharis ovata 507. 517.
H. palustris 312. 316. 762. 763.
H. uniglumis 510.
Heleogiton glaucum 441. 475. 507.
H. pungens 610. 668.
H. trigonum 607. 673. 674.
H. triquetrum 607. 673. 674.
Helianthemum alpestre 171. 458. 604.
H. canum 244. 263.
H. Fumana 465.
H. grandiflorum 184. 320.
H. guttatum 454.
H. piliferum 397.
H. pulverulentum 251.
H. retrofractum 242. 297.
H. vineale 263.
H. vulgare 397. 513.
Helianthus annuus 587.
Helichrysum arenarium 653.
H. luteo-album 624. 654. 673.
H. Stoechas 454.
Heliotropium europaeum 561.
Helleborus altifolius 3. 5. 11. 12. 15. 29. 33. 43. 92. 101. 136. 239. 260. 330. 792.
H. atrorubens 22. 28. 38. 70. 88. 123.
H. dumetorum 27. 32. 46. 85. 100. 143. 227. 256. 333.
H. foetidus 19. 61. 182.
H. hiemalis 9. 11. 21. 22. 29. 67. 68. 92. 194. 196. 239. 791.
H. intermedius 9. 22.
H. laxus 15. 45. 141.
H. niger 3. 5. 11. 12. 15. 29. 33. 43. 92. 101. 136. 239. 260. 330. 792. 793. 795.

- Helleborus niger* β . 3. 5. 11. 12. 15. 29. 33. 43. 92. 101. 136. 239. 260. 330. 792.
H. viridis 22. 46. 69. 143. 197.
Helminthia echioides 497. 513.
Helosciadium inundatum 480.
H. nodiflorum 399. 443. 508.
H. repens 646.
Hemerocallis flava 504.
H. fulva 639. 665.
Hepatica nobilis 4. 9. 10. 11. 12. 23. 28. 32. 71. 87. 99.
Heracleum angustifolium 684.
H. asperum 566.
H. austriacum 464. 524.
H. flavescens 583. 614. 713.
H. longifolium 583. 614. 713.
H. palmatum 566.
H. Panaces 583. 597. 620.
H. pyrenaicum 639.
H. sibiricum 613.
H. siifolium 376.
H. Sphondylium 618. 658. 672. 693.
Herminium Monorchis 478.
Herniaria glabra 296.
H. hirsuta 653.
H. incana 276. 463. 485.
Hesperis inodora 216. 232.
H. matronalis 233. 328.
H. tristis 158. 231. 333.
H. verna 21. 65.
Heteropogon Allionii 602.
Hibiscus pentacarpos 665.
H. syriacus 586.
H. Trionum 402. 497.
Hieracium alpinum 677.
H. amplexicaule 387. 389. 423.
H. angustifolium 580.
H. asperum 606.
H. aurantiacum 526.
H. Auricula 274. 297.
H. Bauhini 274.
H. bifurcum 412.
H. blattarioides 633.
H. chondrilloides 574. 633.
H. cinereum 213.
H. collinum 185. 213. 260. 284.
H. cydoniaefolium 702.
H. cymigerum 252. 354.
Hieracium cymosum 534.
H. dentatum 572.
H. dubium 241. 364.
H. echioides 258.
H. fallax 213. 284.
H. flagellare 360.
H. flexuosum 568. 679.
H. furcatum 701.
H. fuscum 568.
H. glanduliferum 571.
H. glaucescens 262. 316.
H. glaucum 572. 627.
H. Halleri 677.
H. Jaquini 571.
H. incanum 105.
H. incarnatum 383.
H. intybaceum 578. 677. 474.
H. Lachenalii 474. 604.
H. laevigatum 604. 684.
H. murorum 213. 214. 335. 613.
H. obscurum 181. 284. 334. 362.
H. paludosum 478. 506.
H. parviflorum 386.
H. Peleterianum 193.
H. Pilosella 62. 122. 131. 184. 301. 319. 320.
H. pilosellaeforme 702.
H. piloselloides 253.
H. porrifolium 571.
H. praealtum 213. 259. 284.
H. praemorsum 198. 253.
H. pratense 241. 364.
H. prenanthoides 737.
H. racemosum 708.
H. rupestre 423.
H. sabaudum 706. 738.
H. sanctum 471.
H. saxatile 463. 474.
H. Schraderi 677.
H. setigerum 242.
H. silvaticum 410. 723.
H. silvestre 707. 712. 715. 717.
H. staticifolium 627. 633. 653.
H. succisaefolium 616.
H. Taraxaci 57. 173. 581.
H. umbellatum 712. 738. 751.
H. Vaillantii 253.
H. villosum 463. 563.
Hierochloë australis 22. 40. 46. 68. 127. 145.
H. borealis 248. 360.
Himantoglossum hircinum 229.
Himantoglossum viride 538.
Hippocrepis comosa 213. 265.
H. unisiliqua 193.
Hippophaë rhamnoides 26. 38. 83. 120.
Hippuris maritima 285.
H. vulgaris 237. 294. 307. 315.
H. vulgaris β . fluitans 540.
Hladnikia pastinacifolia 594.
Holcus australis 22. 40. 46. 68. 127. 145.
H. halepensis 446. 544. 556.
H. lanatus 208. 355. 515.
H. mollis 4. 15. 436.
H. odoratus 248. 360.
Holoschoenus australis 646. 651. 666.
H. exserens 610.
H. filiformis 506.
H. Linnaei 493.
Holosteum umbellatum 17. 24. 31. 36. 39. 42. 52. 76. 96. 113. 124. 132. 159. 208. 281. 321. 322.
Homogyne alpina 174. 383. 569. 615. 681.
H. discolor 569.
H. silvestris 526.
Honckenya peploides 285.
Hoppea sibirica 614. 667.
Hordeum bulbosum 401.
H. distichon 390.
H. hexastichon 390.
H. maritimum 156. 284. 347.
H. murinum 473. 482. 515. 557.
H. pratense 481. 484. 511. 514. 541. 547.
H. vulgare 390.
H. Zeocriton 390.
Horminum pyrenaicum 382. 512. 525.
Hottonia palustris 90. 128. 237. 312.
Humulus Lupulus 611. 665. 686.
Hyacinthus botryoides 62. 149. 183. 353.
H. cernuus 58. 176.
H. comosus 160. 189. 353.
H. Muscari 176.
H. non scriptus 44. 46. 138. 144. 334.
H. racemosus 183. 189. 352. 239.

- Hydrocharis Morsus ranae* 690.
Hydrocotyle Schkuhriana 312.
H. vulgaris 286. 312.
Hyoseyamus canariensis 473. 556.
H. niger 304. 364.
H. Scopolia 136. 140. 331. 337.
Hyoseris foetida 194. 232.
H. minima 163.
H. taraxacoides 724.
Hypecoum littorale 485.
Hypericum Androsaemum 368.
H. barbatum 333.
H. commutatum 611.
H. Coris 422.
H. elegans 193. 265. 299. 354.
H. elodes 718. 726. 732. 738.
H. hirsutum 419. 438. 452. 532.
H. humifusum 564. 598.
H. montanum 419. 452. 537.
H. perforatum 601. 604. 629. 671. 672.
H. pulchrum 404. 449. 481.
H. quadrangulum 596. 608. 685.
H. tetrapterum 590. 623. 685.
Hypochaeris Balbisii 734.
H. glabra 484. 489.
H. helvetica 574. 682.
H. maculata 433. 537.
H. montana 582. 669.
H. radicata 415. 417. 489. 513.
Hyssopus officinalis 419. 474. 496.
Jasione montana 655. 685.
J. montana Var. *maritima* 644.
J. perennis 612.
Jasminum officinale 472. 544.
Iberis amara 402. 487. 496.
I. cepeaefolia 386.
I. linifolia 368.
I. nudicaulis 53. 96. 98. 120. 161. 247. 251. 298.
I. pinnata 471.
I. rotundifolia 170. 571.
I. umbellata 455.
Jirasekia tenella 669.
Ilex Aquifolium 230. 343.
Illecebrum capitatum 276.
- Illecebrum serpyllifolium* 264.
I. verticillatum 654. 660. 668.
Impatiens Balsamina 585.
I. Noli tangere 595. 623. 650. 656. 686.
Imperata cylindrica 291. 347. 352. 365.
Imperatoria Ortruthium 583. 616. 650.
I. palustris 665.
Inula britannica 590. 611. 624. 673.
I. Bubonium 471.
I. crithmoides 640.
I. dysenterica 608.
I. ensifolia 631.
I. germanica 605. 619.
I. hirta 686.
I. montana 662. 685.
I. Oculus Christi 631.
I. odora 613.
I. Oetteliana 608. 673.
I. Pulicaria 649.
I. salicina 478. 505. 552.
I. spiraeifolia 471.
I. squarrosa 629.
I. viscosa 640.
Iris arenaria 152. 362.
I. biflora 192. 239. 258. 747. 752. 754.
I. Fieberi 216. 225.
I. foetidissima 468.
I. germanica 239. 280. 340.
I. graminea 239. 248. 344.
I. nudicaulis 217. 264.
I. pallida 275.
I. Pseudo-Acorus 237. 312. 314.
I. pumila 114. 142. 284. 341.
I. sambucina 422. 473.
I. sibirica 355.
I. spuria 547.
I. squalens 552.
I. variegata 255.
Isatis tinctoria 161. 222. 262. 349.
Isnardia palustris 607. 666. 670. 674.
Isolepis setacea 668. 673. 696.
I. supina 664. 673.
I. thalictroides 35. 109. 134. 273. 327.
Juglans regia 60. 180.
Juncus acutiflorus 623. 625. 648. 664.
J. acutus 217.
J. alpinus 377. 488.
- Juncus areticus* 385.
J. articulatus a. 503.
J. articulatus b. 622.
J. articulatus c. 623. 648.
J. bulticus 645.
J. bufonius 166. 422. 517.
J. bafonius b. *strictus* 166.
J. bulbosus 442. 488.
J. campestris α . 21. 30. 31. 46. 48. 55. 66. 93. 97. 145. 148. 166. 192. 240. 250. 323. 343. 351.
J. campestris e. 578.
J. capitatus 374. 517.
J. castaneus 566.
J. compressus 442. 482. 544.
J. conglomeratus 442. 503.
J. diffusus 732.
J. effusus 442. 503.
J. effusus α . 385.
J. filiformis 510.
J. flavescens 521.
J. Forsteri 70. 105. 144.
J. Gerardi 644. 651.
J. glabratus 458.
J. glaucus 513.
J. Jaquini 577.
J. lamprocarpos 622. 624. 664. 673.
J. maritimus 217. 476.
J. melananthos 665.
J. multiflorus 142. 340.
J. niveus 521.
J. obtusiflorus 503.
J. pilosus a. et. z. 34. 106.
J. pilosus b. 380. 383.
J. pilosus d. 445.
J. pilosus e. 405. 467.
J. pratensis 741.
J. pygmaeus 414.
J. repens 611.
J. spicatus 579.
J. squarrosus 480.
J. stygius 566.
J. supinus 488.
J. Tenageia 488.
J. trifidus 385.
J. triglumis 572. 647.
Juniperus communis 19. 45. 61. 142. 182. 341.
J. nana 429.
J. Oxycedrus 206.
J. Sabina 34. 226.
J. phoenicea 280.
Jurinea cyanoides 653.
J. mollis 635. 653. 687.
Ixia Bulbocodium 30.
Kernera saxatilis 171. 524.
Kobresia caricina 701.

- Kochia arenaria* 298.
K. prostrata 727. 728.
K. scoparia 699. 729.
Koeleria cristata 150. 301. 313.
Koeleria glauca 293.
K. hirsuta 573.
K. subspicata 385.
K. valesiaca 51. 99. 113. 156. 254. 281.
K. maritima 471.
Lactuca augustana 685.
L. caerulea 583.
L. perennis 259. 264. 354.
L. quercina 685.
L. sagittata 685.
L. saligna 393. 693. 697.
L. Scariola 642. 659. 691.
L. stricta 530.
L. virosa 604. 616.
Laelia orientalis 157. 305. 367.
Lagenaria vulgaris 395.
Lagurus cylindricus 347. 352. 365.
L. ovatus 281. 291. 347. 352.
Lamium album 65. 147. 189. 349.
L. amplexicaule 8. 14. 20. 39. 53. 65. 74. 125. 161. 189. 204. 760.
L. dissectum 53. 161.
L. hirsutum 637.
L. hybridum 53. 161.
L. intermedium 53. 161.
L. maculatum 34. 107. 270.
L. Orvala 231.
L. purpureum 2. 8. 20. 53. 65. 74. 161. 204. 791.
Lappa major 619. 686. 693.
L. minor 692. 697.
L. tomentosa 602. 643. 659. 696.
Lappago racemosa 486.
Lapsana communis 191. 307. 341.
L. Rhagadiolus 191.
L. stellata 66. 191.
Larbrea bracteata 187.
L. crassifolia 670.
L. uliginosa 187. 237. 293. 311. 337. 346. 357.
Larix europaea 84. 225.
Laserpitium Archangelica 614. 656.
L. asperum 617. 635.
L. hirsutum 577.
Laserpitium hispidum 631.
L. latifolium 619. 635.
L. marginatum 738.
L. nitidum 712. 716.
L. peucedanoides 376.
L. pruthenicum 628. 629.
L. Siler 636. 678.
L. simplex 677.
L. trilobum 628.
Lasiagrostis calamagrostis 421. 522.
Lathraea Squamaria 71. 107. 200. 270.
Lathyrus annuus 278.
L. Aphaca 483.
L. Cicera 499.
L. ensifolius 430. 534.
L. hirsutus 373.
L. inconspicuus 278.
L. incurvus 398.
L. latifolius 439. 453.
L. Nissolia 162.
L. odoratus 394.
L. palustris 554.
L. pratensis 358. 767.
L. sativus 394.
L. sepium 358. 367.
L. setifolius 111. 278.
L. silvestris 437. 529.
L. sphaericus 54. 131. 164. 320.
L. tuberosus 373. 437. 556.
Laurus nobilis 16. 48. 149.
Lavandula Spica 630.
Lavatera thuringiaca 684. 691. 693.
L. trimestris 394.
Ledum palustre 287.
Leersia oryzoides 731.
Lemna gibba 237. 346.
L. minor 237. 346.
L. polyrhiza 237. 346.
L. trisulca 237. 346.
Leontodon alpinus 574.
L. asper 634.
L. aureum 170. 526. 574.
L. autumnalis 712. 720. 734.
L. Brumati 640.
L. bulbosum 112.
L. caucasicus 701.
L. croceus 568.
L. dubius 705.
L. glaucesceus 317.
L. hastilis 202. 319. 344.
L. hastilis β . nitidus 744.
L. hirtum 513.
L. hispidus 181. 246. 319. 358. 516. 672.
Leontodon hyoseroides 583. 680.
L. incanus 105.
L. laevigatum 62. 76. 184. 209.
L. palustris 119. 153. 295. 362.
L. pratensis 616. 694. 715. 731.
L. saxatilis 662.
L. serotinus 491.
L. tuberosum 640.
L. Taraxaci 57. 173. 581.
L. Taxacum 3. 6. 11. 15. 30. 48. 93. 133. 148. 241. 324. 350.
Leonurus Cardiaca 642. 658. 698.
L. Marrubiastrum 658.
Lepidium alpinum 56. 80. 94. 101. 170. 216. 243. 259.
L. brevicaulis 447. 519.
L. campestre 185. 190. 282. 305.
L. Iberis 659. 691.
L. latifolium 425. 484. 493.
L. perfoliatum 157. 349.
L. petraeum 79. 94. 105. 215. 244. 267.
L. procumbens 29. 36. 37. 91. 113. 119.
L. ruderales 283. 305. 367.
L. sativum 178.
L. virginicum 164. 178.
Lepturus cylindricus 285.
L. filiformis 285.
L. incurvatus 284.
Leucium aestivum 481. 529. 547.
L. vernum 2. 6. 10. 13. 15. 27. 35. 47. 109. 146.
Levisticum vulgare 391. 416. 432. 522.
Libanotis daucifolia 566.
L. gracilis 680.
L. montana 635.
Ligusticum apioides 662.
L. aquilegifolium 403. 545.
L. austriacum 613. 650. 681.
L. Levisticum 391. 416. 432. 522.
L. peloponnesiacum 583.
L. Seguieri 457. 521.
Ligustrum vulgare 447. 529.
Lilium bulbiferum 435.
L. candidum 392.

- Lilium chalcedonicum* 229.
L. Martagon 198. 327.
Limnochloa acicularis 638. 656. 673.
L. Baeothryon 502. 507. 517.
L. cespitosa 286.
L. parvula 673.
Limodorum abortivum 341.
Limosella aquatica 673.
Linaria alpina 170. 577. 626.
L. angustifolia 681.
L. arvensis 652.
L. chalepensis 157.
L. chloraefolia 605.
L. commutata 700.
L. Cymbalaria 78. 113. 212. 282.
L. Elatine 652.
L. genistaefolia 635. 655.
L. litoralis 277.
L. maritima 645.
L. minor 190. 305. 746.
L. pelisseriana 161.
L. simplex 562.
L. spuria 700.
L. striata 653.
L. triphylla 193.
L. vulgaris 601. 604. 642.
Lindernia pyxidaria 611. 654. 674.
Linnaca borealis 609. 679.
Linum alpinum 632.
L. angustifolium 476. 500.
L. austriacum 628. 689. 691.
L. catharticum 416. 511. 547.
L. corymbulosum 470.
L. flavum 625. 631.
L. gallicum 276.
L. hirsutum 460. 492.
L. humile 371. 585.
L. laeve 334.
L. marginatum 539. 554.
L. maritimum 285.
L. narbonense 377. 457. 470.
L. nodiflorum 639.
L. perenne 403. 451.
L. Radiola 654.
L. strictum 477.
L. tenuifolium 466. 491.
L. usitatissimum 392. 483.
L. viscosum 513. 525. 545. 557.
Listera cordata 479.
L. ovata 241. 344.
Lithospermum apulum 149. 351.
L. arvense 52. 159. 322.
L. graminifolium 192.
L. officinale 214. 232. 304.
L. purpureo-coeruleum 77 88. 102. 111. 211. 260. 276.
Littorella lacustris 476. 488. 508.
Lloydia serotina 380. 385. 458. 518.
Lobelia Dortmanna 645. 660.
Lolium arvense 469. 544.
L. festucaceum 360.
L. perenne 368. 450. 515. 690.
L. robustum 469. 544.
L. temulentum 370. 440. 561.
Lomatogonium carinthiacum 703.
Lonicera alpigena 105. 268.
L. Caprifolium 58. 143. 175. 332.
L. coerulea 316. 326.
L. etrusca 276.
L. implexa 276.
L. nigra 69. 134. 198. 326.
L. pallida 332. 365.
L. Periclymenum 175. 782.
L. Xylosteum 89. 140. 154. 233. 339. 365.
Lophochloa phleoides 188. 346.
Loranthus europaeus 124. 303.
Lotus ciliatus 471.
L. corniculatus 51. 93. 98. 158. 173. 241. 252.
L. cytisoides 278.
L. Dorycnium 465.
L. hirsutus 232. 319.
L. siliculosus 294. 360.
L. tenuifolius 652.
L. uliginosus 607. 687.
Lunaria biennis 145. 343.
L. rediviva 183. 232. 330. 434. 509.
Lupinus albus 394.
L. angustifolius 394.
L. linifolius 394.
L. luteus 394.
L. varius 640.
Luzula albida 405. 467.
L. albida Var. *rubella* 405.
Luzula campestris 21. 30. 31. 46. 48. 55. 66. 93. 97. 145. 148. 166. 192. 240. 250. 352. 343. 351.
L. flavescent 521.
L. Forsteri 70. 105. 144.
L. glabrata 458.
L. lutea 578.
L. maxima 445.
L. multiflora 142. 340.
L. nivea 551.
L. pilosa 34. 106.
L. spadicea 380. 383.
L. spicata 579.
Lychnis alpestris 632.
L. dioica 369. 401. 474. 528. 557.
L. dioica α . *rubra* 271. 366.
L. diurna 231. 234. 271. 366. 751. 752. 755. 768.
L. Flos cuculi 360.
L. Flos Jovis 387.
L. vespertina 474. 258.
L. Viscaria 216. 250. 340.
Lycium barbarum 391. 447.
L. europaeum 391. 447.
Lycopsis arvensis 52. 159. 323.
L. pulla 157. 261.
L. variegata 188 281. 304.
Lycopus europaeus 607. 624. 666.
L. exaltatus 607.
Lyonia calyculata 115. 288.
Lysimachia guestfalica 622. 664.
L. Linum stellatum 456. 545.
L. nemorum 186. 218. 258. 295. 399.
L. Nummularia 533. 555.
L. punctata 664. 695.
L. thyrsiflora 504.
L. vulgaris 622. 664.
Lythrum Hyssopifolia 673.
L. Salicaria 611. 623. 664. 668.
L. tomentosum 623. 660.
L. virgatum 506. 611.
Maianthemum bifolium 96. 109. 247. 272.
Malachium aquaticum 399. 457. 438. 442. 503.
M. manticum 164. 360.
Malaxis monophyllos 524.
M. paludosa 648. 660.
Malva Alcea 619. 628. 659. 691. 693. 698.

- Malva crispa* 659.
M. italica 663. 693.
M. littoralis 645.
M. mauritiana 678.
M. Morenii 560. 619.
M. moschata 560. 631. 659.
M. nicaeensis 691.
M. rotundifolia 306. 373.
M. silvestris 659. 662.
M. vulgaris 659. 691. 695.
Mandragora vernalis 745. 751.
Marrubium apulum 642. 659.
M. creticum 659. 689. 691.
M. pannonicum 659. 691.
M. peregrinum 661. 663. 691.
M. vulgare 642. 659.
Matricaria Chamomilla 163.
M. Parthenium 191. 307.
Matthiola annua 393. 640.
M. fenestralis 393.
M. incana 278.
M. varia 227. 278. 301. 501.
M. viridis 494.
Medicago carstiensis 402. 530.
M. denticulata 373. 402.
M. falcata 619. 626.
M. Gerardi 54. 101. 163. 257.
M. littoralis 279.
M. lupulina 66. 98. 126. 148. 191. 252. 307. 350.
M. maculata 445.
M. marina 279.
M. media 560. 619. 626. 672. 684.
M. minima 238. 252.
M. mollissima 279.
M. orbicularis 373.
M. polymorpha α . orbicularis 373.
M. procumbens 631. 696.
M. prostata 553.
M. sativa 179.
M. Terebellum 255.
Melampyrum arvense 562.
M. barbatum 121. 202.
M. cristatum 637.
M. nemorosum 685.
M. pratense 685.
M. silvaticum 685.
Melica Bauhini 500.
M. ciliata 403. 500. 526. 544. 556.
Melica coerulea 695.
M. coerulea major 687.
M. nutans 269. 331.
M. uniflora 337.
Melilotus alba 593. 659. 689.
M. arguta 739. 740.
M. coerulea 586.
M. Kochiana 651. 665.
M. officinalis 664. 696.
M. palustris 503.
M. Petitpierreana 369. 514. 546.
Melissa grandiflora 582.
M. Nepeta 639.
M. officinalis 656. 663.
Melittis grandiflora 686.
M. Melissophyllum 686.
Mentha acutifolia 732.
M. aquatica 667. 690.
M. arvensis 562. 623. 712.
M. arvensis Var. *parietariaefolia* 667.
M. canescens 739.
M. crenata 741.
M. crispa 708. 736.
M. crispata 690.
M. dentata 738.
M. gentilis 707. 715. 717. 732.
M. gratissima 623.
M. hirta 719.
M. intermedia 718.
M. odorata 739.
M. piperita 715. 718.
M. palustris 625. 667.
M. pubescens 689.
M. Pulegium 674.
M. rotundifolia 713.
M. rubra 592. 596. 608. 611. 623.
M. sativa 707. 708. 715. 717. 741.
M. silvestris 732. 739.
M. undulata 689. 691.
M. viridis 590. 664. 687.
Menyanthes nymphoides 661.
Menyanthes trifoliata 41. 129. 313. 761.
Menziesia coerulea 656.
Mercurialis ambigua 609. 641.
M. annua 2. 593.
M. ovata 72. 87. 88. 127. 233.
M. perennis 72. 87. 123. 202. 302.
Mesembryanthemum crystallinum 586.
Mespilus Amelanchier 83. 97. 105. 223. 250. 268.
Mespilus Chamaemespilus 158.
M. Cotoneaster 79. 87. 100. 104. 134. 215. 231. 257. 265. 326.
M. germanica 231. 333.
M. Pyracantha 177.
M. tomentosa 212. 224.
M. vulgaris 231. 333.
Meum athamanticum 614. 682.
Meum Mutellina 573. 614.
Mibora verna 37. 119. 296.
Micromeria Juliana 471.
M. montana 602.
M. pygmaea 603.
M. variegata 404.
Micropus erectus 452.
Milium effusum 269.
M. lendigerum 400. 518. 541.
M. multiflorum 535. 553.
M. paradoxum 228.
M. vernale 223.
Mimosa Farnesiana 395.
Moehringia muscosa 56. 172. 422. 430. 523.
Moenchia erecta 96. 113. 122. 249. 281. 301.
Molinia coerulea 695.
M. littoralis 687.
Mollugo tetraphylla 728.
Molopospermum cicutarium 583.
Momordica Elaterium 640.
Monotropa glabra 413.
M. Hypopithys 413. 426. 467. 486. 492.
Montia fontana 293.
Morus alba 60. 180.
Muscari botryoides 62. 149. 183. 353.
M. comosum 160. 189. 353.
M. moschatum 176.
M. racemosum 183. 189. 239. 353.
Myagrum austriacum 518.
M. dentatum 469.
M. paniculatum 164. 195. 262. 297. 483.
M. perenne 372. 462. 542.
M. perfoliatum 162. 349.
M. rugosum 162.
M. sativum 160. 178.
M. sativum α . 210. 216. 282.
M. saxatile 171. 524.
Mycelis muralis 469. 474. 497.

- Myosotis arvensis* 74. 119. 204. 295. 710. 728.
M. cespitosa 507.
M. collina 77. 100. 211. 257.
M. deflexa 424. 439. 464.
M. intermedia 159. 182. 216.
M. Lappula 641.
M. laxiflora 338. 345.
M. lithospermifolia 573.
M. nana 677.
M. palustris 63. 89. 128. 186. 234. 312.
M. repens 637. 656.
M. scorpioides β . *palustris* 63. 89. 128. 186. 234. 312.
M. silvatica 532.
M. silvatica α . *alpestris* 736.
M. sparsiflora 230. 302.
M. squarrosa 641.
M. strigulosa 288. 319. 479.
M. suaveolens 573. 682.
M. versicolor 159. 318. 347.
Myosurus minimus 52. 110. 160. 274. 743. 755.
Myrica Gale 115. 288.
Myricaria germanica 427. 433.
Myricaria squamosa 610.
Myriophyllum alternifolium 540.
M. pectinatum 540.
M. spicatum 540.
M. verticillatum 498. 509.
Myrrhis odorata 218. 228.
Myrtus communis 419. 451. 518. 529.
Najas marina 611. 669.
N. minor 690.
Narcissus majalis 238.
N. poeticus 91. 150. 238. 357.
N. Pseudo-Narcissus 23. 73. 202.
N. radiiflorus 238.
N. Tazetta 29. 91.
Nardus aristata 275.
N. stricta 119. 131. 296. 319. 322. 704.
Narthecium ossifragum 647.
Nasturtium amphibium 443. 505.
N. anceps 185. 221. 225.
- Nasturtium astylon* 427.
N. lippizense 259.
N. microphyllum 479. 555.
N. officinale 63. 118. 128. 153. 186. 292. 311. 363.
N. palustre 164. 235. 311. 325.
N. pyrenaicum 328.
N. rivulare 399.
N. siifolium 508.
N. silvestre 164. 185. 186. 221. 235. 311.
Naumburgia thyrsiflora 504.
Neottia Nidus avis 272. 274. 469.
Nepeta Cataria 601. 642. 659.
N. citriodora 428. 474. 558. 601.
N. nuda 731.
N. pannonica 716. 738.
N. violacea 639.
Neslia paniculata 164. 195. 262. 297. 483.
Nicandra physaloides 678.
Nicotiana macrophylla 585.
N. rustica 585.
N. Tabacum 585.
Nigella arvensis 563. 621. 634. 653.
N. damascena 592. 693.
N. sativa 393.
Nigritella angustifolia 578.
N. fragrans 578.
Nigritella globosa 436.
Noccaea alpina 56. 80. 94. 101. 170. 171. 216. 243. 259.
N. brevicaulis 447. 519.
N. cepeaeifolia 386.
N. procumbens 29. 36. 37. 91. 113. 119.
N. rotundifolia 170. 571. 577.
Nonnaea pulla 157. 261.
Nuphar luteum 540.
N. pumilum 661. 669.
Nymphaea alba 540.
N. lutea 540.
N. minima 661.
Odontites lutea 630. 684. 696.
O. serotina 700. 732.
O. verna 161.
Oenanthe fistulosa 443. 480. 504.
O. karstia 594. 639.
- Oenanthe Lachenalii* 436. 511. 528. 551.
O. peucedanifolia 506.
O. Phellandrium 666.
O. pimpinelloides 553.
O. silaifolia 506. 539.
Oenothera biennis 427. 451. 489. 490. 516.
O. muricata 610.
Olea europaea 390.
Omphalodes scorpioides 78. 86. 215. 230.
Omphalodes verna 44. 138. 334.
Onobrychis Caput galli 402.
O. montana 382.
O. sativa 395. 462.
Ononis Cherleri 252.
O. Columnae 267.
O. hircina 671. 691.
O. minutissima 454.
O. Natrix 611. 628. 691.
O. repens 487.
O. rotundifolia 171. 213.
O. spinosa 602. 629. 689.
O. spinosa α . *mitis* 671.
Onopordon Acauthium 659. 691.
O. illyricum 640.
Onosma arenarium 221. 362.
Onosma echioides 466.
O. stellatum 103. 263.
Ophrys aestivalis 671.
O. alpina 554.
O. anthropophora 345.
O. apifera 341.
O. Arachnites 341.
O. aranifera 345.
O. atrata 112.
O. Bertoloni 258.
O. cordata 479.
O. Corallorrhiza 595. 648.
O. fuciflora 258.
O. Loesellii 510.
O. monophyllos 524.
O. Monorchis 478.
O. myodes 183. 185. 195.
O. Nidus avis 272.
O. ovata 241.
O. paludosa 648. 660.
O. spiralis 706.
Orchis abortiva 341.
O. angustifolia 507.
O. Arachnites 341.
O. atropurpurea 378.
O. bifolia 198. 344.
O. bifolia β . *brachyglossa* 408. 552.

- Orchis conopsea* 538.
O. coriophora 553.
O. fusca 266.
O. galeata 193.
C. globosa 436.
O. haematodes 507. 552.
O. hybrida 203. 268.
O. laxiflora 313. 480.
O. maculata 538.
O. majalis 313.
O. mascula 412. 552.
O. militaris 73. 203.
O. militaris e. 71. 136. 142. 148. 200. 331. 341. 351.
O. moravica 203. 207.
O. Morio 91. 95. 98. 131. 238. 246. 253.
O. odoratissima 361.
O. ornithis 569.
O. ovata 344.
O. pallens 73. 203.
O. papilionacea 35. 48. 112. 148.
O. provincialis 279.
O. pyramidalis 203.
O. rubra 351.
O. saccata 279.
O. sambucina 203.
O. speciosa 614. 682.
O. suaveolens 384. 457.
O. tephrosanthos 71. 136. 142. 148. 331. 341. 351.
O. ustulata 552. 555.
O. variegata 203.
O. virescens 405. 408. 432. 439.
Oreochloa disticha 518.
Oreoselinum legitimum 706. 708. 720. 736.
Origanum heracleoticum 606.
O. Majorana 586.
O. vulgare 409. 419. 459.
Orlaya grandiflora 371.
Ornithogalum arvense 74. 204.
O. bohemicum 40.
O. comosum 265. 299.
O. luteum 28. 35. 52. 74. 89. 108. 160. 204. 234. 271.
O. minimum 28. 31. 47. 89. 99. 146.
O. nutans 239. 353. 364.
O. pratense 150.
O. pusillum 97. 150. 250. 357.
O. pyrenaicum 242. 353.
- Ornithogalum spathaceum* 107.
O. stenopetalum 118.
O. sulfureum 182.
O. umbellatum 61. 76. 153. 182. 208. 304.
Ornithopus intermedius 297.
O. perpusillus 163. 297. 342. 364.
O. scorpioides 54. 117. 149. 163. 292. 354.
Orobanche adenostemon 554.
O. alba 546.
O. arenaria 485. 494.
O. caryophyllacea 554.
O. coerulea 404. 413. 494.
O. coerulea Var. 413. 513. 535. 548.
O. coerulescens 494. 518.
O. cruenta 318.
O. elatior 369. 451. 494.
O. Epithymum 204. 246. 319.
O. Galii 494. 554.
O. gracilis 494. 550.
O. laxiflora 554.
O. loricata 589. 657.
O. Millefolii 413. 494. 513. 535. 548.
O. platystigma 377.
O. ramosa 374. 494.
O. Rapum 212. 251. 338. 494.
O. strobiligena 555.
O. torquata 555.
O. variegata 449. 451. 489. 494.
Orobis albus 73. 138. 202. 335.
O. angustifolius 73. 202.
O. canescens 70. 199.
O. Clusii 596.
O. lacteus 138. 335.
O. laevigatus 378.
O. luteus 378. 385.
O. maritimus 476.
O. niger 532.
O. palustris 554.
O. tristis 468.
O. tuberosus 67. 110. 195. 274.
O. venetus 141. 339.
O. vernus 110. 273.
O. versicolor 73. 202.
Orthopogon Burmanni 732.
Orvala lamioides 231.
Ostrya carpinifolia 280.
Ostericum palustre 665.
- Ostericum verticillare* 582.
Osyris alba 127. 148. 309. 350.
Oxalis Acetosella 25. 35. 64. 79. 80. 106. 110. 188. 216. 219. 269. 273.
O. corniculata 65. 189.
O. stricta 53. 83. 189. 223. 245. 302. 372. 703. 743. 746. 751. 753. 759.
Oxycoccus palustris 288.
Oxyria digyna 576.
Oxytropis campestris 381. 382. 386.
O. cyanea 588.
O. montana 411. 459. 548. 629. 694.
O. pilosa 431. 490. 500.
O. sordida 701.
O. uralensis 576. 676.
Pachypleurum simplex 677.
Paedarota Ageria 387.
P. Bonarota 387.
Paeonia corallina 84. 166. 225. 236.
P. officinalis 199.
P. pubens 51. 103. 121. 156. 264. 299.
Paliurus aculeatus 206. 365.
Panicum capillare 563.
P. ciliare 560.
P. Crus galli 563. 600.
P. Dactylon 652.
P. germanicum 563.
P. glaucum 561.
P. hirtellum 732.
P. Ischaemum 560.
P. italicum 584.
P. miliaceum 563. 584.
P. sanguinale 560. 611. 641.
P. verticillatum 561. 591. 611.
P. viride 515. 591.
Papaver alpinum 581.
P. Argemone 372. 486.
P. Burseri 632.
P. dubium 372.
P. hybridum 375. 402.
P. intermedium 369. 561.
P. officinale 393.
P. pyrenaicum 633.
P. Rhoas 372. 486.
P. somniferum 393.
P. somniferum γ. 393.
P. trilobum 699.
Parietaria diffusa 473.
P. officinalis 641. 657.

- Paris quadrifolia* 109. 273.
Parnassia palustris 647.
Paronychia capitata 276.
P. serpyllifolia 264.
Pastinaca glauca 423.
P. sativa 559. 625. 628. 693.
Pavonia pentacarpos 665.
Pedicularis acaulis 174.
P. asplenifolia 385. 464. 493.
P. comosa 377.
P. foliosa 167. 682.
P. palustris 666.
P. Portenschlagii 575.
P. recutita 170. 573.
P. rosea 633.
P. rostrata 703. 721.
P. Sceptrum 506.
P. silvatica 684. 694.
P. sudetica 695.
P. tuberosa 676.
P. versicolor 383.
P. verticillata 385.
Peltaria alliacea 63. 78. 85. 136. 187. 215. 228. 278. 330. 422. 749. 761. 765.
Peplis Portula 668. 674.
Petasites albus 8. 85. 134. 229. 327. 792. 795.
P. laevigatus 5. 9. 10. 14. 18. 25. 29. 41. 54. 61. 80. 90. 130.
P. niveus 8. 105. 268.
P. spurius 82.
P. vulgaris 8. 10. 16. 20. 29. 49. 63. 90. 152. 187. 236. 361.
Petilium imperiale 176.
Petrocallis pyrenaica 386.
Petroselinum sativum 391.
Peucedanum alsaticum 719.
P. officinale 484. 539.
P. Silaus 551.
Phaca alpina 381.
Ph. astragalina 676. 704.
Ph. australis 225. 704. 736.
Ph. frigida 704.
Phalaris aquatica 275.
Ph. arundinacea 441. 503. 507.
Ph. aspera 156.
Ph. canariensis 584.
Ph. erucaeformis 517. 550.
Ph. paradoxa 159. 291. 352. 365.
Ph. phleoides 255. 363.
Ph. utriculata 275.
Phaseolus multiflorus 394.
Ph. nanus 394.
Ph. vulgaris 394.
Ph. vulgaris β . *coccineus* 394.
Phellandrium aquaticum 666.
Ph. Mutellina 573.
Philadelphus coronarius 176. 192. 245.
Phillyrea angustifolia 274.
Ph. latifolia 24. 35. 77. 110.
Ph. media 49. 154.
Phleum arenarium 475. 491.
Phleum autumnale 415.
Phl. capitatum 576.
Phl. cuspidatum 275.
Phl. echinatum 275.
Phl. pratense 547.
Phl. schoenoides 638. 651. 665.
Phl. tenue 470.
Phlomis tuberosa 372. 442. 546. 551.
Phoenixopus ramosissimus 654.
Ph. vimineus 642. 659. 697.
Phragmites communis 666.
Physalis Alkekengi 495. 545.
Ph. latifolia 585.
Ph. pubescens 585.
Phyospermum aquilegifolium 403. 545.
Phyteuma betonicaefolium 573.
Ph. canescens 687.
Ph. comosum 566.
Ph. cordatum 578.
Ph. fistulosum 383. 436. 573.
Ph. globulariaefolium 677.
Ph. Halleri 583.
Ph. hemisphaericum 676.
Ph. humile 579.
Ph. Michellii 566.
Ph. orbiculare 202. 266.
Ph. Scheuchzeri 573.
Ph. spicatum 270.
Phytolacca decandra 592. 603. 642.
Picridium vulgare 640.
Picris echioides 497. 543.
P. hieracioides 601. 685. 696.
P. pyrenaica 633.
Picris ruderalis 604.
P. sonchoides 202.
P. umbellata 597. 620. 662. 682.
Pimpinella Anisum 585.
P. dioica 267. 352.
P. glauca 268.
P. magna 356. 515.
P. Saxifraga 403. 414. 451. 511. 515.
Pinguicula flavesceus 168. 173. 174. 572.
P. leptoceras 565.
P. vulgaris 36. 49. 114. 152. 286. 360.
Pinus Abies 224.
P. austriaca 267.
P. Cembra 167.
P. Larix 84. 225.
P. Mughus 381. 480.
P. obliqua 228. 330.
P. Picea 224.
P. Pinaster 280.
P. Pinea 193.
P. rotundata 167.
P. rubra 230.
P. silvestris 298.
P. silvestris β . 230.
P. Strobis 180.
Pistacia Lentiscus 112. 280.
Pistacia Terebinthus 112. 280.
Pisum arvense 373. 441.
P. leptolohum 394.
P. maritimum 476.
P. quadratum 394.
P. ramulare 179.
P. saccharatum 394.
P. sativum 179.
P. umbellatum 179.
Plantago alpina 573.
Pl. altissima 506.
Pl. arenaria 655.
Pl. Bellardi 110.
Pl. carinata 127. 276. 308.
Pl. Coronopus 643.
Pl. Cynops 527.
Pl. decumbens 445. 547.
Pl. graminea 249.
Pl. Lagopus 110. 276.
Pl. lanceolata 92. 240. 322.
Pl. major 322. 445. 485. 504.
Pl. maritima 450.
Pl. maritima a. leptophylla 450. 844. 488.

- Plantago maritima* β . γ . 476.
Pl. media 322. 445. 541. 792. 795.
Pl. montana 573.
Pl. Psyllium 561.
Pl. saxatilis 662.
Pl. sericea 249. 418.
Pl. serpentina 249. 347.
Pl. subulata 276.
Platanthera bifolia 198. 344.
Pl. brachyglossa 408. 552.
Pl. chlorantha 405. 408. 432. 439.
Platanus acerifolia 60. 180.
Pl. occidentalis 60. 180.
Pleurospermum austriacum 613. 650. 681.
Pl. Golaka 701.
Plumbago europaea 723.
Poa alpina 565.
P. angustifolia 622. 664.
P. annua 2. 66. 81. 132. 191. 219. 322. 400. 590.
P. aquatica 666.
P. badensis 602.
P. bulbosa 239. 346.
P. cenisia b. *badensis* 602. 636.
P. coarctata 395. 418. 473.
P. compressa 602. 641. 653.
P. distans 234. 294.
P. distichophylla 570.
P. Eragrostis 487.
P. festucaeformis 484. 506.
P. flexuosa 565.
P. glauca 298. 380.
P. glaucantha 429.
P. Halleri 565.
P. hybrida 593.
P. Langeana 418.
P. laxa 565.
P. marginata c. 376.
P. maritima 643.
P. minor 575.
P. nemoralis 376. 380. 396. 418. 429. 536.
P. nemoralis b. *firmula* 620.
P. nemoralis c. 376.
P. nemoralis d. 380.
P. nemoralis e. 429.
P. nemoralis f. 396. 418. 473.
P. pilosa 650.
Poa pratensis 286. 356.
P. rigida 248. 281. 473.
P. sudetica 383. 549. 615.
P. trivialis 424. 541. 547. 792. 795.
P. verticillata 636.
Polemonium coeruleum 429. 450. 547.
Pollinia distachys 241. 638. 662.
P. Gryllus 210. 248. 351. 352. 355. 362.
Polycarpon tetraphyllum 728.
Polycnemum arvense 488.
Polygala alpestris 244. 381. 387. 521.
P. amara 261. 359.
P. amblyptera 460.
P. austriaca 261. 313. 359.
P. Chamaebuxus 5. 141. 339. 788.
P. comosa 405.
P. comosa β . *Hoppeana* 555.
P. major 193.
P. oxyptera 448. 548.
P. serpyllacea 449. 479.
P. uliginosa 73. 115. 129. 202. 287. 313.
P. vulgaris 143. 151. 333. 359.
Polygonum amphibium 661. 669.
P. amphibium β . *maritimum* 645.
P. amphibium γ . *terrestre* 592.
P. aviculare 208. 238. 240. 284. 294. 295. 304. 310. 323. 348.
P. aviculare α . *triviale* 208. 240. 284. 304. 310. 348.
P. aviculare β . *erectum* 238.
P. aviculare γ . *neglectum* 308.
P. aviculare δ . *polycnemum* 294. 295. 484.
P. Bellardi 626.
P. Bistorta 287.
P. Convolvulus 561. 697.
P. dumetorum 619. 698.
P. Hydropiper 607. 686. 711.
P. lapathifolium - *nodosum* 592. 607. 610. 668.
Polygonum lapathifolium 592.
P. laxiflorum 607. 624. 684.
P. laxum 740.
P. maritimum 470.
P. minori *Persicaria* 609.
P. minus 710. 714. 726. 732. 738. 748.
P. nodosum 607. 610. 668.
P. Persicaria 323. 607. 656. 658.
P. tataricum 561. 619. 698.
P. viviparum 382. 577.
Polypogon littoralis 645.
P. monspeliensis 470.
Populus alba 25. 80.
P. canescens 46. 145.
P. dilatata 19.
P. monilifera 19. 60.
P. nigra 24. 25. 43. 75. 80. 137.
P. tremula 43. 737.
P. villosa 46. 144.
Porrum Ampeloprasum 561.
P. arenarium 489. 588.
P. ascalonicum 392.
P. Ceba 585.
P. commune 392.
P. crinitum 397.
P. Ophioscorodon 585.
P. rotundum 561. 588.
P. sativum 392.
P. Scorodoprasum 397. 528.
P. sphaerocephalum 371. 545. 588.
P. strictum 603.
Portulaca oleracea 644. 678.
Potamogeton acutifolius 539.
P. compressus 428. 498.
P. crispus 221. 237. 316. 428.
P. densus 690.
P. fluitans 590. 612. 624.
P. gramineus 428. 443. 498. 663. 733.
P. gramineus δ . *latifolius* 443. 482.
P. lucens 540.
P. marinus 646.
P. natans 690.
P. nitens 590. 668.
P. oblongus 590. 647.
P. obtusifolius 539. 733.
P. pectinatus 611. 624. 661. 668.

- Potamogeton perfoliatus* 221. 237. 316. 428.
P. plantagineus 689. 708. 733.
P. praelongus 639.
P. pusillus 539.
P. rufescens 590. 660.
P. spathulatus 539.
P. trichoides 509. 637.
Potentilla affinis 377.
P. alba 274.
P. Anserina 217. 237. 314. 348. 512. 516.
P. argentea 419. 451. 474. 542.
P. aurea 57. 169. 172. 174. 614.
P. canescens 160. 183. 231. 242. 333.
P. caulescens 268. 467.
P. chrysantha 258.
P. cinerea 62. 103. 120. 184. 263. 297.
P. Clusiana 633.
P. collina 251.
P. Fragariastrum 76. 77. 97. 102. 209. 212. 251. 262.
P. frigida 676. 677.
P. grandiflora 578.
P. hirta 111. 277.
P. hybrida 231.
P. inclinata 333.
P. micrantha 404.
P. minima 458. 467.
P. Neumanniana 274. 307.
P. nitida 677.
P. nivea 579.
P. norwegica 490. 508.
P. obscura 215.
P. opaca 62. 77. 97. 102. 134. 184. 212. 251. 262. 326.
P. patula 194.
P. pedata 215.
P. pilosa 215.
P. recta 214. 339.
P. reptans 623. 626. 671. 691.
P. rupestris 200. 206. 214.
P. salisburgensis 326. 567.
P. subacaulis 103.
P. supina 314. 517.
P. verna 24. 31. 36. 41. 47. 76. 77. 97. 113. 130. 147. 209. 212. 251. 282. 318. 348. 791. 792. 793. 794. 795.
P. Wiemanniana 416. 451. 486.
Poterium glancescens 214. 241. 253.
P. polygamum 241. 261.
P. Sanguisorba 4. 12. 210. 259.
Prenanthes chondrilloides 447.
Pr. muralis 469. 474. 497.
Pr. purpurea 617.
Pr. ramosissima 654.
Pr. tenuifolia 617.
Pr. viminea 642.
Primula acaulis 19. 47. 60. 146. 181. 344.
Pr. Auricula 103. 115. 135. 264. 288. 329.
Pr. carniolica 168.
Pr. ciliata 165.
Pr. crenata 376.
Pr. elatior 6. 16. 34. 48. 106. 150. 269. 356. 740.
Pr. farinosa 288. 329.
Pr. Floerkeana 519.
Pr. glaucescens 376.
Pr. glutinosa 326.
Pr. hirsuta 167.
Pr. integrifolia 165.
Pr. longiflora 382.
Pr. pubescens 165.
Pr. truncata 566.
Pr. venusta 168.
Pr. veris 5. 16. 47. 146. 344. 766.
Pr. veris α . officinalis 5. 6. 16. 47. 146. 344.
Pr. veris β . elatior 16. 34. 48. 106. 150. 369. 356.
Pr. veris γ . acaulis 19. 47. 60. 146. 181. 344.
Pr. villosa 566.
Pr. viscosa 178. 379.
Prismatocarpus hybridus 621.
Pr. Speculum 483.
Prunella alba 499.
Pr. grandiflora 635. 696.
Pr. vulgaris 444. 451. 530. 531. 542.
Prunus Amarella 18. 58.
Pr. Armeniaca 18. 58.
Pr. avium 58. 176.
Pr. Brignola 102. 119. 260. 296.
Pr. cerasifera 58. 176.
Pr. Cerasus 58. 176.
Pr. Cerasus Duracina 59. 177.
Pr. Cerasus juliana 59. 177.
Prunus cereola 58. 102. 177. 260.
Pr. Chamaecerasus 59. 71. 79. 177. 200. 214.
Pr. Chamaecer. β . sativa 59. 177.
Pr. damascena 59. 177.
Pr. dasycarpa 18. 59.
Pr. divaricata 59. 177.
Pr. domestica 59. 177.
Pr. domestica β . 59. 177.
Pr. domestica λ . 58. 102. 177. 260.
Pr. domestica o. 102. 119. 260. 296.
Pr. Duracina 59. 177.
Pr. fruticans 95. 141. 245. 339.
Pr. insititia 117. 143. 154. 291. 333. 366.
Pr. intermedia 117. 149. 154. 291. 353. 366.
Pr. juliana 59. 177.
Pr. Lauro-Cerasus 59. 177.
Pr. Mahaleb 24. 33. 77. 105. 267.
Pr. nigra 75. 102. 139. 205. 261. 336.
Pr. Padus 108. 272.
Pr. semperflorens 392.
Pr. serotina 59. 177.
Pr. spinosa 87. 143. 147. 154. 231. 323. 333. 348. 366.
Pr. spinosa β . serotina 333. 348.
Pr. vinaria 75. 117. 205. 233. 291.
Pr. virginiana 59. 177.
Psilathera tennella 579.
Psilurus nardoides 275.
Pteroneurum maritimum 278.
Pteroselinum alsaticum 719. 731.
Pt. austriacum 606. 619. 683.
Pt. Chabraei 596.
Pt. glaucum 423.
Pt. rablense 613.
Pterotheca nemausensis 471.
Ptychotis ammoides 348. 352. 366.
Pt. Bunius 630.
Pulegium vulgare 674.
Pulicaria dysenterica 608. 623. 665.

- Pulicaria odora* 613.
P. vulgaris 649. 656. 673.
Pulmonaria angustifolia 35. 41. 108. 131. 272. 319.
P. azurea 89. 137. 233. 527.
P. maritima 284.
P. mollis 101. 260.
P. oblongata 140. 338.
P. officinalis 12. 34. 106. 269.
P. saccharata 132. 334.
P. suffruticosa 192.
Pulsatilla alba 166. 431. 519. 521.
P. Burseriana 457.
P. Hackelii 67. 95. 194. 246.
P. montana 100. 257.
P. patens 95. 99. 117. 246. 254. 290.
P. pratensis 97. 131. 251. 320.
P. vernalis 60. 97. 116. 166. 181. 251. 290. 385. 431.
P. vulgaris 12. 13. 34. 38. 61. 105. 121. 722. 728. 774.
Punica Granatum 603. 639.
Pyreus flavescens 663. 673.
P. Monti 673. 689.
P. pannonicus 651. 654.
Pyrethrum Clusii 199.
P. corymbosum 440. 531.
P. inodorum 563.
P. maritimum 725.
P. Parthenium 191. 307.
P. uliginosum 732.
Pyrola chlorantha 449.
P. media 480.
P. minor 343.
P. rosea 270.
P. rotundifolia 468. 527.
P. secunda 273.
P. umbellata 411. 349.
P. uniflora 455.
Pyrus acerba 104. 138. 265. 335.
P. Achras 70. 199.
P. amygdaliformis 111.
P. communis 138. 335.
P. Cydonia 177. 231. 366.
P. dasyphylla 70. 199.
P. Malus 138. 335.
P. nivalis 291. 331. 333. 348. 353.
P. Pollveria 177.
P. Pollvilleriana 59. 177.
Quercus austriaca 336.
Q. coccifera 75.
Q. Ilex 280.
Quercus pedunculata 336.
Q. pubescens 199.
Q. Robur 139. 336.
Q. Suber 280.
Radiola Millegrana 654. 660. 664. 668.
Ranunculus aconitifolius 172. 174. 227. 384. 434. 482. 608.
R. aconitifolius β . 172. 174.
R. acris 84. 130. 134. 151. 226. 318. 327. 357. 763. 767.
R. acris α . 704.
R. acris β . *pratensis* 84. 134. 226. 327. 751. 765.
R. alpestris 168. 379. 381. 384.
R. anemonoides 55. 166.
R. aquatilis 540.
R. aquatilis δ . 428.
R. arvensis 1. 53. 160. 163.
R. aureus 225.
R. auricomus 138. 152. 335. 360.
R. bulbosus 58. 97. 130. 147. 251. 318. 349. 782. 785. 787. 788.
R. cassubicus 109.
R. crenatus 703.
R. circinnatus 540.
R. falcatus 38. 39. 47. 119. 125. 146.
R. Ficaria 26. 28. 39. 44. 83. 89. 123. 139.
R. Flammula 186. 235. 289. 314. 746. 757. 762.
R. fluitans 400. 428.
R. glacialis 581.
R. hederaceus 400. 443.
R. hirsutus 218. 311. 325. 772. 778. 779.
R. illyricus 242. 297.
R. lanuginosus 81. 107. 220. 271.
R. Lingua 667.
R. montanus 57. 174. 573.
R. muricatus 111. 277. 426. 496. 556.
R. ophioglossifolius 471. 505.
R. parnassifolius 384.
R. parviflorus 189. 305.
R. Phthora 568. 583.
R. platanifolius 172. 174. 482.
R. polyanthemus 227. 335.
Ranunculus pyrenaicus 385.
R. repens 205. 218. 237. 711. 748.
R. rutaefolius 519.
R. sceleratus 218. 237. 311. 314. 325. 750. 752. 761. 764.
R. Seguieri 568.
R. Steveni 201.
R. Thora 199. 202. 265. 351.
R. Traunfellneri 381.
R. tripartitus 540.
R. vaginatus 380. 511.
R. verrucosus 277.
R. Villarsii 704.
Raphanistrum segetum 162.
Raphanus Raphanistrum 162.
R. sativus 394.
Rapistrum glabrum 402. 471.
R. hirtum 490.
R. perenne 372. 461. 542.
R. rugosum 162.
Reseda lutea 157. 185. 262. 295. 305.
R. Luteola 495. 542. 589.
R. odorata 392.
R. Phyteuma 369. 545.
Rhagodiolus edulis 191.
Rh. stellatus 66. 191.
Rhamnus Alaternus 13. 35. 111.
Rh. alpinus 192. 327.
Rh. catharticus 249. 332. 365.
Rh. Frangula 235. 313. 343.
Rh. infectarius 249.
Rh. Paliurus 206. 365.
Rh. pumilus 276. 376.
Rh. saxatilis 267. 305.
Rh. Wulfenii 217.
Rh. Zizyphus 391.
Rhaponticum scariosum 594.
Rhinanthus Crista galli 246. 357. 429. 478. 521.
Rh. crista galli β . 318.
Rhinanthus Crista galli γ . 634.
Rhodiola rosea 571. 606. 680. 681.
Rhododendron Chamaecistus 167.
Rh. ferrugineum 389. 632. 675.

- Rhododendron hirsutum* 389. 632.
Rhodothamnus Chamaecistus 167.
Rhus Cotinus 391. 455.
Rh. Toxicodendron 392.
Rh. Typhina 392.
Rhynchospora alba 648. 666. 670.
Rh. fusca 316.
Ribes alpinum 229.
R. Grossularia 79. 88. 175. 214.
R. nigrum 58. 145. 175. 343.
R. petraeum 328.
R. reclinatum 58. 79. 88. 175. 214.
R. rubrum 18. 25. 58. 79. 88. 175. 214.
R. Uva crisa 79. 88. 214.
Robinia Caragana 59. 179.
R. Pseudacacia 179.
Rosa aciphylla 258.
R. affinis 437. 447.
R. agrestis 232. 253.
R. alba 447. 528.
R. alpina 411. 461.
R. altaica 177.
R. andegavensis 348.
R. arvensis 528. 558.
R. arvina 157. 226. 245.
R. baltica 285.
R. blanda 177.
R. camtschatica 392.
R. canina 437. 448.
R. carolina 178.
R. caryophyllacea 437.
R. caucasica 392.
R. centifolia 392.
R. cinnamomea 231. 250.
R. collina 210. 250.
R. coriifolia 392.
R. damascena 18. 59. 178.
R. Dicksonii 392.
R. dimorpha 392.
R. dumetorum 437.
R. farinosa 193. 348.
R. ferox 392.
R. flexuosa 231.
R. floribunda 178.
R. foetida 178.
R. gallica 257. 309. 321. 354.
R. gemella 178.
R. geminata 404. 528.
R. glandulosa 639.
R. glutinosa 392.
R. hibernica 393.
Rosa hybrida 157. 203. 259. 333. 366.
R. inodora 437. 528.
R. involuta 393.
R. Jundzilliana 393. 529. 530.
R. lucida 178.
R. marginata 369.
R. micrantha 407. 528.
R. moschata 178.
R. myriacantha 178.
R. pendulina 169.
R. pimpinellifolia 414. 416. 451.
R. platyphylla 366.
R. psilophylla 437. 448.
R. pumila 157. 203. 259.
R. pyrenaica 224. 330.
R. repens 333. 366.
R. resinosa 567.
R. rotundifolia 448.
R. rubella 178.
R. rubiginosa 416. 437. 451. 528. 558.
R. rubrifolia 521.
R. Sabini 393.
R. sempervirens 231. 448. 558.
R. sepium 407. 420. 437. 461.
R. silvestris 533. 538.
R. spinosissima 454. 545. 602.
R. stylosa 224.
R. sulphurea 393.
R. tomentosa 406. 451. 461. 545.
R. trachyphylla 354.
R. turbinata 178. 354.
R. umbellata 196. 232.
R. uncinella 558.
R. villosa 406. 521.
R. Waiziana 411.
R. Wilsonii 393.
R. Woodsii 393.
Rosmarinus officinalis 77. 24.
Rottboellia filiformis 285.
R. cylindrica 285.
Roucela Erinus 189. 281.
Rubia peregrina 436. 557.
R. tinctorum 557.
Rubus affinis 528. 558.
R. apiculatus 437. 558.
R. argenteus 437.
R. caesius 413. 414. 425. 448. 516.
R. caesius α . *umbrosus* 425. 493.
R. caesius β . *arvalis* 413. 414. 500.
Rubus caesius Var. γ . 528.
R. caesius δ . 448.
R. candicans 532.
R. carpinifolius 437.
R. Chamaemorus 287.
R. cordifolius 405.
R. corylifol. 437. 530. 558.
R. discolor 437.
R. foliosus 437.
R. fruticosus 246. 299. 334. 367. 516.
R. fusco-ater 437.
R. fuscus 437.
R. glandulosus 434.
R. Güntheri 434. 437.
R. hirtus 404. 509. 530.
R. humifusus 437.
R. Hystrix 437.
R. idaeus 309. 324. 337.
R. infestus 437.
R. Koehleri 434. 437.
R. Lejeunei 437.
R. Lingua 437.
R. macroacanthus 437.
R. macrophyllus 437.
R. Menkeii 404. 437.
R. nitidus 528.
R. odoratus 178.
R. pallidus 437.
R. Pseudo-caesius 528.
R. Pseudo.idaeus 448.
R. pubescens 437. 459. 558.
R. pygmaeus 437.
R. Radula 437.
R. Reichenbachii 437.
R. rhamnifolius 532.
R. rosaceus 437.
R. rudis 406. 455.
R. saxatilis 196.
R. scaber 437.
R. Schlechtendalii 413.
R. Schleicheri 437. 530.
R. silvaticus 437. 512.
B. Sprengelii 621. 684. 693.
R. suberectus 246. 299. 334. 367.
R. thyrsoflorus 437.
R. tomentosus 531.
R. vestitus 437.
R. villicaulis 437.
R. vulgaris 437.
Rumex Acetosa 357. 767.
R. Acetosa δ . 613. 681.
R. Acetosella 53. 74. 120. 151. 160. 204. 296. 323. 748. 758. 764.
R. acutus 624.

- Rumex alpinus* 169. 525.
R. aquaticus 442. 503.
R. arifolius 613. 631.
R. crispus 563. 625. 664. 671.
R. digynus 576.
R. Hydrolapathum 624. 661. 669.
R. maritimus 624. 644. 660. 664. 673.
R. maximus 624. 669.
R. Nemolopathum 607. 624.
R. nemorosus 598. 607. 609. 637.
R. obtusifolius 592. 609. 624. 656.
R. palustris 624. 666.
R. Patientia 585. 589.
R. pratensis 468. 548.
R. pulcher 444. 495. 542.
R. scutatus 169.
Ruppia maritima 646. 650. 661.
R. rostellata 646.
Ruscus aculeatus 95. 112. 118. 139. 245. 280. 293. 337.
R. Hypoglossum 193. 310. 343.
Ruta bracteosa 277.
R. divaricata 187. 265.
R. graveolens 418.
Sabulina aquatica 478.
S. austriaca 571.
S. cespitosa 223. 286.
S. fastigiata 588. 652. 655.
S. Gerardi 379. 421. 523. 614.
S. lanceolata 379.
S. laricifolia 632.
S. macrocarpa 619.
S. polygonoides 676.
S. Ponae 56. 171.
S. recurva 580.
S. setacea 265.
S. sphagnoides 567.
S. striata 571. 680.
S. stricta 317.
S. tenuifolia 375.
S. verna 257. 299. 463.
S. Villarsii 583.
S. viscosa 298.
Saccharum Ravennae 649.
Sagina apetala 295.
S. bryoides 716. 720.
S. ciliata 371. 409.
S. decandra 579.
S. depressa 485.
Sagina erecta 96. 113. 122. 217. 249. 281. 301.
S. procumbens 159. 217. 284. 672. 778.
S. procumbens β . fontana 217.
S. procumbens γ . littoralis 284.
Sagittaria sagittae-olia 540.
Salicornia fruticosa 725.
S. herbacea 725. 727.
S. radicans 764.
Salix acuminata 48. 149.
S. alba 26. 48. 83. 133. 148. 222. 225. 350.
S. alba Var. 83. 148. 222. 350.
S. ambigua 288.
S. amygdalina 263. 83. 187. 222. 707. 715.
S. arbuscula 167.
S. arbuscula γ . 115. 288.
S. arenaria 378. 429. 522.
S. aurita 81. 95. 144. 219. 246. 343.
S. babylonica 180.
S. caprea 26. 40. 44. 83. 128. 139.
S. cinerea 90. 128. 129. 144.
S. daphnoides 26.
S. Finmarchica 314.
S. fragilis 83. 222. 350.
S. grandiflora 56. 171. 387.
S. hastata 55. 167.
S. herbacea 570. 679.
S. hippophaëfolia 26.
S. holosericea 83.
S. Jaquini 570.
S. incana 83. 222.
S. iserana 429.
S. limosa 378. 429. 522.
S. Mayeriana 222.
S. mollissima 26. 44. 83. 140.
S. myrsinites 378.
S. myrtilloides 167. 289. 312.
S. obtusifolia 64. 187.
S. pentandra 83. 222.
S. phylicifolia 84. 108. 129. 130. 135.
S. prunifolia 378.
S. purpurea 20. 26. 40. 63. 83. 128.
S. repens 49. 116. 151. 289. 359.
S. reticulata 576.
Salix retusa 167. 576.
S. rosmarinifolia 95. 130. 246. 317.
S. rubra 20. 26. 40. 63. 83. 128.
S. Kusseliana 222. 350.
S. Seringeana 64. 187.
S. silesiaca 224. 259.
S. Starkeana 115. 288.
S. stipularis 48. 149.
S. undulata 20. 26.
S. viminalis 20. 26. 38. 40. 64. 83. 120. 128.
S. vitellina 83. 148. 222. 250.
S. Waldsteiniana 378.
Salsola arenaria 298.
S. hirsuta 725.
S. Kali 714. 725. 727. 729.
S. prostrata 729.
S. Soda 639.
S. Tragus 639.
Salvia Aethiopis 368. 494.
S. austriaca 156. 255.
S. clandestina 274.
S. glutinosa 410.
S. multifida 274.
S. nemorosa 628. 657. 690.
S. officinalis 210.
S. pratensis 66. 96. 147. 150. 191. 248. 346. 355. 783. 785. 788. 789.
S. Sclarea 368.
S. silvestris 559. 693.
S. variegata 363.
S. Verbenaca 445.
S. verticillata 415. 450. 460. 541.
Sambucus Ebulus 564. 683. 691.
S. nigra 245. 282. 304. 515.
S. racemosa 86.
Samolus Valerandi 235. 294. 314.
Sanguisorba auriculata 547.
S. officinalis 547.
Sanicula europaea 195. 272.
Saponaria lutea 579.
S. Ocymoides 101. 260. 459. 583.
S. officinalis 592. 620. 654. 698.
S. Vaccaria 371. 441.
Satureia hortensis 592.
S. Juliana 471.
S. montana 603.
S. pygmaea 603.

- Satureia thymifolia* 422.
S. variegata 404.
Satyrion albidum 225.
 242. 243. 329.
Satyrion Epipogium 598.
S. hircinum 229.
S. nigrum 578.
S. repens 648.
S. viride 538.
Saussurea alpina 568. 675.
S. discolor 569.
S. pygmaea 576.
Saxifraga Aizoides 571.
 680. 681.
S. Aizoon 524.
S. androsacea 384.
S. arachnoides 656.
S. aretioides 166.
S. ascendens 326.
S. aspera 676. 680.
S. atropurpurea 377.
S. biflora 520.
S. bryoides 676. 680.
S. bryoides β . *laxa* 676.
 680.
S. bulbifera 321.
S. Burseriana 464.
S. caesia 379. 524.
S. controversa 326.
S. Cotyledon 169. 377.
 521.
S. crustata 451.
S. cuneifolia 380.
S. decipiens 265.
S. exarata 384.
S. Geum 377.
S. granulata 76. 97. 143.
 151. 208. 250. 323. 332.
 357.
S. hieracifolia 575.
S. Hirculus 670.
S. hirsuta 176.
S. Hohenwartii 633.
S. Hostii 377.
S. hypnoides 423.
S. imbricata 567.
S. leucanthemifolia 572.
S. moschata 519.
S. muscoides 676.
S. mutata 388. 389.
S. nivalis 575. 614.
S. oppositifolia 55. 56. 93.
 168. 170. 171. 243. 431.
 464. 520. 633.
S. paradoxa 572.
S. patens 626.
S. pedemontana 582.
S. petraea 226.
S. planifolia 579.
S. recta 458.
S. rotundifolia 160. 328.
- Saxifraga sedoides* 519.
S. Seguieri 581.
S. squarrosa 632.
S. stellaris 168. 384. 525.
S. stenopetala 459.
S. Sternbergii 263.
S. tenella 567.
S. Tridactylites 55. 78.
 132. 165. 215. 321.
S. umbrosa 328.
Scabiosa agrestis 601.
Sc. arvensis 159. 334. 347.
Sc. atropurpurea 391.
Sc. australis 657.
Sc. columbaria 396. 416.
 547.
Sc. dipsacifolia 582.
Sc. graminifolia 520.
Sc. gramuntia 589.
Sc. hybrida 442. 541. 545.
 557.
Sc. longifolia 582. 678.
Sc. lucida 682.
Sc. ochroleuca 601.
Sc. Scopolii 639.
Sc. silvatica 406. 526.
 531.
Sc. suaveolens 587. 601.
Sc. Succisa 670.
Sc. ucranica 276.
Scandix Anthriscus 495.
Sc. Cerefolium 65. 154.
 189. 366.
Sc. nodosa 304. 353.
Sc. odorata 218. 228.
Sc. Pecten 52. 160.
Schelhammeria cyperoi-
des 624. 649. 669. 674.
Scheuchzeria palustris
 287. 289. 313.
Schmidtia subtilis 667.
Schoberia maritima 725.
Schoenus aculeatus 665.
Sch. albus 648.
Sch. compressus 747.
Sch. ferrugineus 286.
Sch. fuscus 316.
Sch. Mariscus 666.
Sch. mucronatus 470.
Sch. nigricans 477. 550.
Scilla amoena 92. 239.
Sc. autumnalis 625. 693.
Sc. bifolia 26. 30. 48. 81.
 82. 93. 148. 219. 221.
 240. 350.
Sc. campanulata 58. 176.
Scirpus acicularis 638.
Sc. australis 646.
Sc. Baeothryon 502. 507.
 517.
Sc. cespitosus 286.
- Scispus dichotomus* 713.
Sc. fluitans 666.
Sc. glaucus 441. 475.
 507.
Sc. Holoschoenus 493.
 610.
Sc. lacustris 316.
Sc. maritimus 643. 664.
 668.
Sc. Michelianus 607.
Sc. mucronatus 660. 666.
Sc. ovatus 507. 517.
Sc. palustris 312. 316.
Sc. parvulus 673.
Sc. pungens 610.
Sc. radicans 638. 655.
 695.
Sc. romanns b. 506.
Sc. rufus 476. 498.
Sc. setaceus 668.
Sc. silvaticus 237. 314.
 342.
Sc. supinus 664.
Sc. tenuis 510.
Sc. trigonus 607.
Sc. triqueter 607.
Scleranthus annuus 294.
Sc. perennis 454. 461.
 486.
Sc. verticillatus 268.
Sclerochloa dura 296. 314.
Sc. rigida 248. 281. 473.
Scolochloa festucacea 625.
Scolymus hispanicus 691.
Sc. maculatus 643. 659.
 691.
Scopolina atropoides 136.
 140. 331. 337.
Scorodonia heteromalla
 683.
Scorpiurus subvillosa 309.
Scorzonera acaulis 115.
 152. 287. 361.
Sc. angustifolia 227. 328.
Sc. glastifolia 247. 262.
 297.
Sc. grandiflora 583. 584.
 616.
Sc. humilis 142. 341.
Sc. laciniata 158. 350.
Sc. muricata 456.
Sc. oetangularis 191.
Sc. parviflora 551.
Sc. pierioides 640.
Sc. plantaginea 247. 258.
Sc. purpurea 256. 455.
Sc. rosea 379.
Sc. villosa 203.
Scrofularia aquatica 624.
 667.
Scr. canina 575.

- Scrofularia chrysanthemifolia* 434.
Scr. glandulosa 328.
Scr. nodosa 425.
Scr. peregrina 305. 349. 367.
Scr. vernalis 77. 212.
Scutellaria alpina 167.
Sc. galericulata 443. 505.
Sc. hastifolia 687.
Sc. minor 647.
Secale cereale 175.
S. villosum 159.
Sedum acre 414. 473.
S. album 413. 418. 473.
S. anglicum 473.
S. annuum 379. 422. 473. 523.
S. anopetalum 603. 642.
S. atratum 379. 422. 523.
S. boloniense 418. 473.
S. Cepaea 422.
S. dasyphyllum 422. 473.
S. Forsterianum 462.
S. hispanicum 418. 473.
S. maximum 603. 642.
S. purpureum 418. 473.
S. recurvatum 648. 654.
S. reflexum 594. 602.
S. repens 577. 604. 614. 642.
S. rupestre 587. 603.
S. sexangulare 398. 419. 473.
S. Telephium 419. 474. 500. 501.
S. Telephium β . *purpureum* 418. 473.
S. Telephium *e.* *maximum* 603.
S. villosum 406. 510.
Selinum austriacum 606.
S. Carvifolia 694.
S. Chabraei 596.
S. Gmelini 618.
S. Monnieri 625.
S. palustre 618. 622. 688.
S. Seguieri 457. 521.
S. silvestre 688.
Sempervivum arachnoideum 570. 604.
S. Funkii 575.
S. globiferum 603.
S. hirtum 570. 636.
S. montanum 604. 605. 675.
S. tectorum 598. 599. 642. 710.
S. Wulfenii 570.
Senebiera Coronopus 592. 644. 651. 659.
Senecio abrotanifolius 458. 459. 492. 501.
S. alpinus 175. 382. 683.
S. barbareaefolius 695.
S. Cacaliaster 717. 727.
S. carniolicus 569.
S. denticulatus 598. 645.
S. Doria 597. 671. 699.
S. Doronicum 633. 683.
S. erraticus 564. 590. 623.
S. erucaefolius 738.
S. Fuchsii 596.
S. lyratifolius 680. 682. 684. 713.
S. Jacobaea 602. 684. 694.
S. Jacquinianus 617.
S. incanus 677.
S. nemorensis 596.
S. paludosus 611. 619. 664.
S. rupestris 463. 475. 491.
S. sarracenicus 611. 664.
S. silvaticus 536.
S. squalidus 402. 475. 497.
S. tenuifolius 709.
S. umbrosus 717.
S. vernalis 80. 218.
S. viscosus 475. 497.
S. vulgaris 2. 4. 9. 14. 21. 40. 42. 66. 126. 133. 191. 307. 324.
Serapias grandiflora 184. 224.
S. grandiflora β . 184. 214.
S. Helleborine α . *latifolia* 618.
S. Lingua 112. 279.
S. longifolia 670.
S. longipetala 362.
S. oxyglottis 258.
S. rubra 588.
S. viridiflora 637.
S. Xyphophyllum 214.
Serratula alpina 568. 675.
S. alpina γ . 569.
S. arvensis 563.
S. radiata 634.
S. tinctoria 694.
S. tinctoria δ . *dissecta* 649. 684. 693.
Seseli ammoides 348. 352. 366.
S. annuum 706.
S. bienne 706. 710.
S. elatum 636.
S. Hippomarathrum 630. 634. 636.
S. montanum 605.
Seseli saxifragum 630.
S. tortuosum 603.
S. varium 631.
Sesleria coerulea 33. 36. 43. 103. 115. 134.
S. elongata 414.
S. juncifolia 110. 276.
S. sphaerocephala 579.
S. tenuifolia 77. 110. 211.
Setaria germanica 563.
S. glauca 561. 690.
S. italica 584.
S. verticillata 561. 591. 611. 693.
S. viridis 515. 591.
Sherardia arvensis 571.
Sibbaldia procumbens 566. 675.
Sida Abutilon 443. 496. 543. 546.
Sideritis montana 268. 277. 300.
Siebera cherlerioides 575.
Sieversia montana 169. 174. 425. 521.
S. reptans 580.
Silaus pratensis 551.
Silene acaulis 173. 384. 509.
S. acaulis γ . δ . 577.
S. alpestris 632.
S. Armeria 369. 421. 486. 529.
S. anglica 483.
S. cerastoides 401.
S. chlorantha 630. 648. 655. 714.
S. conica 296.
S. conoidea 441.
S. dichotoma 204. 333. 348.
S. gallica 485.
S. inaperta 470.
S. inflata 377. 389. 392. 429. 430.
S. inflata *Var.* 377. 389. 392. 430. 488. 495. 501. 525.
S. inflata *Var. A.* γ . 542.
S. italica 211.
S. linicola 469.
S. maritima 476.
S. nemoralis 309. 321. 335.
S. noctiflora 483. 592.
S. nutans 194. 257. 274. 291.
S. oleracea 392.
S. Otites 597. 600. 601. 663. 691.
S. pendula 176.
S. Pseudo-Otites 553.

- Silene pudibunda* 704. 716.
S. Pumilio 519.
S. quadrifida 633. 680.
S. quinquevulnera 372. 545.
S. rubella 371.
S. rupestris 260.
S. Saxifraga 166.
S. silvestris 372. 375. 406.
S. silvestris β . 372. 545.
S. tatarica 611. 654.
S. tenerrima 413.
S. valesiaca 575.
S. vesicaria 389. 430.
S. viscosa 412. 553.
Siler aquilegifolium 628. 683.
Silybum marianum 678.
Sinapis alba 179. 190. 306.
S. arvensis 162.
S. nigra 190. 306.
Sisymbrium amphibium 443. 505.
S. anceps 185. 221. 325.
S. arenosum 69. 94. 122. 197. 244. 299.
S. austriacum 388.
S. Barrelieri 111. 278.
S. Columnae 283. 306.
S. Irio 283. 306.
S. lippizense 259.
S. Loeselii 283. 366. 756. 760.
S. multisiliquosum 78. 114. 213.
S. murale 283. 306.
S. Nasturtium 63. 118. 128. 153. 186. 292. 311. 363.
S. obtusangulum 121.
S. officinale 51. 114. 126. 147. 157. 283. 306. 349.
S. palustre 164. 235. 311. 325.
S. pannonicum 157. 252. 306. 542.
S. polyceratum 474.
S. pyrænaicum 328.
S. Sophia 190. 283. 306. 746. 756. 760.
S. strictissimum 82. 186. 220. 222.
S. tenuifolium 474. 496. 543.
S. vimineum 21. 40. 65. 126. 306.
Sium angustifolium 624. 666.
S. Falcaria 560.
S. inundatum 480.
Sium latifolium 624. 666.
S. nodiflorum 399. 443. 508.
S. Sisarum 585.
S. repens 646.
Smilax aspera 724.
Sm. nigra 724.
Smyrnium perfoliatum 70. 154. 198. 365.
Solanum Dulcamara 605. 657. 664. 674.
S. flavum 658.
S. humile 658.
S. miniatum 658. 689.
S. nigrum 401. 495. 515. 658.
S. nigrum ϵ . *virginicum* 591.
S. nodiflorum 658.
S. oleraceum 658.
S. pterocaulon 591. 658.
S. rubrum 658.
S. tuberosum 391.
S. villosum 658.
Soldanella alpina 165.
S. minima 376.
S. montana 202.
S. pusilla 376.
Solidago alpestris 715.
S. Virgaurea 715. 738. 741.
Sonchus alpinus 617. 680. 682.
S. arvensis 375. 465. 469. 510.
S. asper 191.
S. oleraceus 191. 672.
S. littoralis 646.
S. maritimus 645.
S. palustris 667.
Sorbus Aria 71. 104. 199. 201. 267.
S. Aucuparia 324. 335.
S. domestica 192.
S. hybrida 193.
S. heterophylla 193.
S. intermedia 225.
S. Tormalis 201. 250.
Sorghum halepense 446. 544. 556.
Sparganium natans 648.
Sp. erectum 625. 669.
Sp. erectum *b.* 625.
Sp. simplex 625. 669.
Spartianthus junceus 257.
Spartina stricta 477. 494. 504.
Spartium junceum 257.
Sp. scoparium 247. 252. 298.
Spergella nodosa 564. 671.
Spergella saginoides 432.
Sp. subulata 598.
Spergula arvensis 372. 486. 516. 518. 586.
Sp. maxima 469.
Sp. nodosa 564.
Sp. pentandra 30. 31. 38. 96. 97. 120. 247. 250.
Sp. saginoides 432.
Sp. stricta 317.
Sp. subulata 598.
Sp. vulgaris 414. 469. 485. 711.
Spinacia inermis 180.
Sp. oleracea 180.
Sp. oleracea β . 180.
Spiraea Aruncus 186. 199. 200. 409.
Sp. carpinifolia 434.
Sp. chamaedrifolia 177.
Sp. denudata 186. 235. 311.
Sp. Filipendula 357.
Sp. flexuosa 321.
Sp. opulifolia 177.
Sp. salicifolia 409. 536.
Sp. Ulmaria 186. 235. 311.
Sp. ulmifolia 500.
Spiranthes aestivalis 671. 695.
Sp. autumnalis 706. 734.
Stachys alpina 523. 533.
St. ambigua 424.
St. annua 562.
St. arvensis 562.
St. germanica 560. 589. 605.
St. maritima 646.
St. palustris 372. 424. 443. 499.
St. recta 560. 588. 605. 684.
St. segetum 499.
St. silvatica 425.
St. spinulosa 471.
Staphylea pinnata 198.
Statice angustifolia 277.
St. arenaria 652.
St. Armeria 182. 208. 301. 318. 736.
St. furfuracea 277.
St. Limonium 644.
St. plantaginea 684.
St. Pseudo-Limonium 644.
St. pubescens 644.
St. reticulata 277.
St. serotina 756.
Steenhammera maritima 284.
Stellaria anomala 164. 321.

- Stellaria bracteata* 187.
St. bulbosa 57. 85. 172. 228.
St. cerastoides 676.
St. crassifolia 670.
St. Dilleniana 529.
St. glauca 289. 342.
St. graminea 160. 209. 318. 357. 366.
St. graminea β . Linn. 289. 342.
St. graminea β . *brevifolia* Walth. 160.
St. graminea γ . 187. 236. 293. 311. 337. 346. 357.
St. Holostea 86. 108. 154. 230. 271. 366.
St. longifolia 665.
St. media 1. 2. 7. 8. 17. 20. 42. 53. 65. 133. 160. 189. 321. 323.
St. neglecta 186. 235.
St. nemorum 219. 233. 273.
Stellera Passeriana 375.
Sternbergia lutea 111. 207. 240. 277. 282.
Stipa Aristella 661. 663.
St. capillata 450. 462.
St. pennata 210. 261.
Stratiotes Aloides 690.
Streptopus amplexifolius 172. 608. 613. 629.
Sturmia Loesellii 510.
Suaeda hirsuta 725.
Subularia aquatica 498. 509. 654.
Succisa australis 657. 665.
S. pratensis 670. 695.
S. transylvanica 690. 693.
Swertia carynthis 703.
Sw. perennis 647.
Symphytum macrolepis 352.
S. officinale 93. 150. 240. 356.
S. patens 240. 547.
S. tuberosum 72. 137. 202. 527.
Syrenia angustifolia 728. 734.
S. cuspidata 126. 154. 308. 364.
Syringa vulgaris 94. 244.
Tamarix gallica 276.
T. germanica 427. 433. 610.
Tamus communis 245. 336. 367.
Tanacetum vulgare 590. 602. 623. 718.
Taraxacum bulbosum 112.
T. glaucescens 317.
T. laevigatum 62. 76. 184. 209.
T. leptcephalum 153. 362.
T. nigricans 575.
T. officinale 3. 6. 11. 15. 30. 48. 93. 133. 148. 241. 324. 350.
T. palustre 119. 153. 295. 362.
T. Scorzonera 115. 152. 287. 361.
T. serotinum 491. 510. 555.
Taxus baccata 26. 84.
Teesdalia nudicaulis 53. 96. 98. 120. 161. 247. 251. 298.
T. petraea 79. 94. 105. 215. 244. 267.
Telephium Imperati 627.
Tetragonia expansa 586.
Tetragonolobus siliculosus 294. 360.
Teucrium Botrys 397. 461. 546.
T. Chamaedrys 588. 603. 634. 642. 658.
T. Chamaepitys 355.
T. montanum 462.
T. Scordium 646. 664.
T. Scorodonia 683.
Thalictrum alpinum 575.
Th. angustifolium 432. 478. 551.
Th. aquilegifolium 68. 118. 141. 153. 187. 196. 292. 339. 364.
Th. flavum 506.
Th. flexuosum 195. 212. 251. 262. 295. 326. 357.
Th. foetidum 212.
Th. galioides 539.
Th. majus 454. 603.
Th. medium 420. 427. 549.
Th. minus 630.
Th. nigricans 551.
Th. simplex 629.
Thesium alpinum 170. 183.
Th. comosum 243. 249.
Th. divaricatum 192. 241.
Th. Linophyllum 332. 362.
Th. montanum 194.
Th. pratense 597. 688.
Th. ramosum 249.
Th. rostratum 226.
Thlaspi alliaceum 251.
Thl. alpestre 68. 76. 99. 130. 196. 209. 255. 318.
Thlaspi alpinum 55. 386. 703. 704.
Thl. arvense 2. 17. 53. 161. 743.
Thl. Bursa pastoris 21. 39. 42. 47. 65. 133. 147. 190. 305. 324. 349.
Thl. campestre 185. 190. 282. 305.
Thl. montanum 25. 31. 33. 61. 78. 98. 104. 170. 181. 212.
Thl. perfoliatum 53. 74. 83. 125. 161. 204. 223. 305.
Thl. praecox 32. 103.
Thl. saxatile 56. 78. 126. 171. 213. 308.
Thrinia hirta 513.
Thr. hispida 734.
Thr. Leysseri 671. 691.
Thr. tuberosa 640.
Thuja occidentalis 180.
Th. orientalis 180.
Th. sphaeroidea 60. 180.
Thymus Acinos 375. 419. 451.
Th. alpinus 56. 94. 169. 243. 568.
Th. angustifolius 444. 448. 485. 490.
Th. angustifolius γ . *laxus* 444.
Th. Chamaedrys 594. 601. 627. 628. 684.
Th. humifusus 423. 429. 462. 499.
Th. pannonicus 183.
Th. Serpyllum 448. 490.
Th. vulgaris 393.
Thysselinum palustre 622. 666. 688.
Th. silvestre 688.
Tilia corallina 393.
T. corylifolia 393.
T. europaea 414. 499. 530. 598.
T. europaea γ . 593.
T. intermedia 393.
T. latebracteata 393.
T. mutabilis 393.
T. obliqua 393.
T. parviflora 598. 684.
T. platyphyllos 393. 409.
T. praecox 393.
T. pyramidalis 528. 542.
T. tenuifolia 393.
T. vitifolia 393.
Tillaea aquatica 714.
T. muscosa 220. 425.

- Tillaea Vaillantii* 223. 345.
Tofieldia borealis 704.
T. calyculata 377. 478.
T. calyculata Var. 377.
T. glacialis 575.
T. rubra 377.
Tordylium Anthriscus 619.
T. maximum 230. 276. 340. 352. 365.
T. nodosum 96. 125. 149. 250. 304. 353.
T. siifolium 376.
Torilis Anthriscus 619. 621. 658. 718.
T. helvetica 561.
T. infesta 619. 674. 698.
T. nodosa 96. 125. 149. 250. 304. 353.
Tormentilla erecta 95. 144. 152. 246. 342. 360. 516.
T. reptans 480. 537.
Tozzia alpina 577. 581.
Trachynia distachya 206.
Tragopogon floccosus 253. 297.
Tr. major 184. 260. 354.
Tr. porrifolius 534. 551.
Tr. pratensis 151. 358. 781.
Tr. undulatus 182. 363.
Trapa natans 307. 315.
Tribulus terrestris 371. 426. 495. 502. 542.
Trichonema Bulbocodium 11. 30.
Trientalis europaea 226. 271.
Trifolium agrarium 420. 438. 527. 532. 594.
Tr. alpestre 429. 532.
Tr. alpinum 568.
Tr. angustifolium 454.
Tr. arvense 562. 598. 672.
Tr. badium 573. 582.
Tr. caespitosum 701.
Tr. campestre 598.
Tr. conicum 446. 543.
Tr. expansum 695.
Tr. expansum β . 580.
Tr. elegans 433. 538.
Tr. filiforme 452. 512.
Tr. fragiferum 638. 652. 671.
Tr. hybridum 667. 688.
Tr. incarnatum 446.
Tr. Kochianum 651.
Tr. lappaceum 279.
Tr. medium 407. 532.
Trifolium Melilotus coerulea 586.
Tr. Melilotus officinalis 664.
Tr. Melilotus vulgaris 593.
Tr. montanum 193. 252. 340.
Tr. nigrescens 345. 358.
Tr. noricum 568.
Tr. ochroleucum 514.
Tr. pallescens 568.
Tr. pannonicum 695. 715.
Tr. parviflorum 182. 207. 185.
Tr. patens 626.
Tr. Petitpierreanum 369. 514. 546.
Tr. pratense 93. 151. 241. 324. 358.
Tr. procumbens 446. 512. 548.
Tr. repens 298. 319. 324.
Tr. rubens 104. 146. 266. 344.
Tr. sativum 395.
Tr. scabrum 242.
Tr. spadiceum 432. 510. 553. 614. 647.
Tr. stellatum 456.
Tr. striatum 258. 286. 316.
Tr. subterraneum 242. 279.
Tr. suffocatum 112.
Tr. tomentosum 471.
Tr. vaginatum 580.
Triglochin maritimum 484. 506.
Tr. palustre 478. 557.
Trigonella Foenum graecum 394.
Tr. monspeliaca 451.
Trinia glauca 268.
Tr. pumila 267. 352.
Triodia decumbens 597. 627.
Triticum acutum 476.
Tr. affine 607.
Tr. caninum 407. 536.
Tr. dicoccum 390.
Tr. durum 391.
Tr. glaucum 426. 455. 476. 490. 500. 541.
Tr. Halleri 541.
Tr. intermedium 254. 300. 310. 321. 489.
Tr. junceum 643.
Tr. littorale 639.
Tr. loliaceum 206. 241. 347.
Tr. monococcum 391.
Triticum polonicum 391.
Tr. pungens α . 476.
Tr. repens 322. 401. 415. 428. 541. 557.
Tr. rigidum 450. 473. 503. 514.
Tr. Spelta 391.
Tr. strictum 490.
Tr. tenellum α . 414. 429.
Tr. villosum 159. 347. 365.
Tr. vulgare 391.
Trixago latifolia 91. 131. 238. 319.
Trollius europaeus 69. 198.
Tulipa Gesneriana 176.
T. silvestris 141.
Turgenia latifolia 621.
Turritis glabra 183. 209. 242.
T. hirsuta 51. 62. 85. 132. 135. 153. 156. 185. 224. 321. 328. 363.
Tussilago alba 8. 85. 134. 229. 327.
T. alpina 174. 383. 569. 615.
T. discolor 569.
T. Farfara 2. 3. 4. 7. 9. 10. 14. 18. 25. 28. 41. 54. 61. 80. 90. 129. 182.
T. laevigata 7. 9. 10. 14. 18. 25. 29. 41. 54. 61. 80. 90. 130. 182.
T. nivea 8. 105. 268.
T. Petasites 8. 10. 16. 20. 29. 49. 63. 90. 152. 187. 236.
T. silvestris 526.
T. spuria 82.
Typha angustifolia 505. 509.
T. elatior 505. 509.
T. latifolia 505. 509.
T. minima 106. 112. 122. 219. 280. 427.
Udora lithuanica 499.
Ulex europaeus 246. 252.
Ulmus campestris 24. 46. 74. 145.
U. ciliata 44. 138.
U. corylifolia 20. 22. 63. 70. 186. 198.
U. glabra 27. 85.
U. major 23.
U. montana 22. 70.
U. suberosa 44. 138.
U. tiliaefolia 22. 70.

- Urtica dioica* 469. 497. 516. 543.
U. pilulifera 395.
U. urens 402. 475. 497. 516.
Utricularia intermedia 443. 504.
U. minor 479. 504.
U. neglecta 511.
U. vulgaris 504.
Uvularia amplexifolia 172. 608.
Vaccinium Myrtillus 96. 116. 138. 166. 247. 290. 335.
V. Oxycoccus 288.
V. uliginosum 287.
V. Vitis Idaea 60. 95. 121. 181. 245. 299. 784. 786.
Vaillantia Aparine 371. 545.
V. Cruciata 80. 88. 217.
V. glabra 45. 141. 339.
V. hispida 276.
V. muralis 285. 301. 308.
Valeriana celtica 579.
V. coronata 188.
V. dioica 114. 152. 286. 360.
V. echinata 64. 188.
V. elongata 570. 571. 579.
V. exaltata 399.
V. Locusta α . *olitoria* 17. 52. 73. 159. 203.
V. montana 134. 165. 326.
V. officinalis 399.
V. officinalis α . *pratensis* 537.
V. officinalis β *exaltata* 506.
V. pratensis 537.
V. rubra 418. 472.
V. salicifolia 579.
V. sambucifolia 425. 523.
V. saxatilis 636.
V. supina 576.
V. tripteris 43. 44. 136. 140. 174. 331. 337. 383. 522. 526.
V. tuberosa 565.
Valerianella auricula 158.
V. carinata 52. 149. 158. 351.
V. coronata 188.
V. costata 52. 158.
V. dentata 158.
V. echinata 64. 188.
V. eriocarpa 158.
V. olitoria 17. 52. 73. 159. 293. 699. 710.
Valerianella tridentata 221.
Veratrum album 433. 551.
V. Lobelianum 433. 551.
V. nigrum 616. 680.
Verbascum ambiguum 427.
V. australe 416. 450.
V. austriacum 405. 438. 439. 453. 537.
V. Blattaria 442. 450. 485. 542. 545. 557.
V. collinum 450.
V. condensatum 556.
V. cuspidatum 411. 455.
V. floccosum 412. 514. 542.
V. Lychnitis 403. 418. 450.
V. mixtum 534. 547.
V. montanum 418.
V. nemorosum 450. 527.
V. nigro-austriacum 403. 450.
V. nigrum 416. 450.
V. orientale 403.
V. phlomoides 416. 427. 473. 499. 542. 556.
V. phoeniceum 157. 249.
V. pulverulentum 456. 495. 542.
V. ramigerum 427. 453. 486.
V. Schottianum 436.
V. sinuatum 408. 495. 557.
V. speciosum 628. 683.
V. thapsiforme 369. 556.
V. thapsoides 403. 418. 450. 491. 495. 556.
V. Thapsus 491. 495. 556.
V. versiflorum 655.
Verbena officinalis 625. 642. 659.
Veronica acinifolia 158. 207. 351.
V. agrestis 7. 14. 17. 39. 42. 52. 75. 124. 132. 158. 207. 303. 790. 794.
V. alpina 168.
V. Anagallis 424. 441. 502.
V. angustifolia 93. 102. 243. 262. 405.
V. aphylla 168.
V. arguta 538.
V. arvensis 20. 37. 39. 42. 64. 91. 119. 124. 132. 158. 188. 238. 248. 280. 295. 303.
V. austriaca 93. 102. 243. 262.
V. Beccabunga 400. 443. 482.
Veronica bellidioides 565.
V. Buxbaumii 64. 18.
V. Chamaedrys 75. 142. 153. 207. 230. 307. 332. 355. 364. 365.
V. Froelichiana 382.
V. fruticulosa 559.
V. hederæfolia 17. 39. 52. 124. 158. 303. 322. 743. 760. 764.
V. latifolia 243. 256. 266. 299. 325. 447. 514. 527. 546.
V. maritima 399. 405. 441. 475. 502. 533. 546.
V. media 695.
V. montana 197. 272.
V. multifida 93. 102. 243. 262.
V. nitida 428.
V. officinalis 195. 338. 403. 436. 450. 520. 529. 698.
V. opaca 52. 64. 75. 124. 158. 188. 207. 303.
V. orchidea 635. 687.
V. pectinata 93. 102. 243. 262.
V. peregrina 158.
V. polita 52. 124. 158. 303. 769.
V. praecox 17. 52. 75. 126. 206. 207. 307.
V. prostrata 75. 91. 93. 102. 132. 208. 210. 238. 243. 248. 262. 302. 307. 320. 346. 365. 405.
V. prostrata a. satureiaefolia 75. 91. 132. 208. 238. 320.
V. prostrata b. genuina 75. 91. 132. 208. 238. 320.
V. prostrata c. angustifolia 93. 102. 243. 262. 405.
V. prostrata d. pectinata 93. 102. 243. 262.
V. prostrata e. austriaca 93. 102. 243. 262.
V. prostrata f. multifida 93. 102. 243. 262.
V. pyrenaica 572.
V. satureiaefolia 75. 91. 132. 208. 238. 320.
V. saxatilis 604. 632.
V. scutellata 607. 624. 666. 669. 674. 686. 693.
V. serpyllifolia 64. 91. 96. 142. 147. 186. 188. 207. 238. 248. 332. 346. 355.

- Veronica spicata* 614. 682. 694.
V. spuria 428.
V. spuria γ. 428.
V. squamosa 630.
V. Teucrium 256. 262.
V. triphyllos 17. 36. 52. 73. 113. 158. 203. 280.
V. urticaefolia 175. 269. 338. 376.
V. verna 17. 52. 73. 158. 203.
V. utriculata 263.
Viburnum Lantana 86. 103. 264.
V. Opulus 332.
V. Tinus 40. 127. 761.
Vicia angustifolia 417. 452. 487.
V. bithynica 158. 205.
V. Bobartii 373. 512.
V. cassubica 410. 478.
V. cordata 483.
V. Cracca 437.
V. dumetorum 406. 534.
V. equina 586.
V. Faba 586.
V. Faba β. minor 586.
V. grandiflora 373. 548.
V. hirta 562.
V. hybrida 373. 452. 592.
V. lathyroides 76. 99. 120. 209. 255. 297.
V. leucosperma 373.
V. lutea 562.
V. narbonensis 54. 66. 162. 191.
V. onobrychioides 162. 358.
V. pannonica 162. 358.
V. pannonica β. flore purpureo 162.
V. peregrina 101. 111. 257. 278.
V. pisiformis 432. 534.
V. polyphylla 373.
V. sativa 402.
V. sativa β. nigra 417. 452. 487.
V. segetalis 163.
V. sepium 87. 151. 231. 358.
V. serratifolia 218.
V. silvatica 432. 440. 535.
V. sordida 358.
V. tenuifolia 406. 417. 461. 478. 535.
V. uncinata 162.
V. villosa 373.
Vignea acuta 222. 236. 287. 291. 311. 315. 481.
V. arenaria 82. 221.
V. argyroglochin 343.
V. axillaris 507.
V. bicolor 115. 287.
V. Boenninghausenia 552.
V. brizoides 270.
V. caespitosa 351. 361.
V. canescens 236. 315. 359.
V. capitata 167. 312. 330.
V. chordorrhiza 317. 363.
V. Davalliana 49. 152.
V. dioica 287.
V. divisa 218. 243. 255. 279. 285. 297. 361.
V. divulsa 270. 367.
V. elongata 236. 313. 315.
V. foetida 569.
V. Gebhardi 569.
V. guestphalica 710.
V. Grypos 378. 382. 390.
V. Heleonastes 317.
V. incurva 569.
V. intermedia 222. 236. 315. 361.
V. lagopina 577.
V. leporina 90. 129. 236. 315.
V. microstachya 507.
V. Moenchiana 238.
V. muricata 140. 338.
V. nemorosa 218.
V. paniculata 236. 311.
V. paradoxa 90. 115. 236. 287.
V. pulicaris 314.
V. remota 218.
V. repens 346.
V. salina 285.
V. saxatilis 431. 550.
V. Schreberi 19. 24. 32. 62. 76. 99. 133. 210. 255. 325.
V. stellulata 220. 236. 315.
V. stenophylla 121. 122. 139. 300. 301. 337.
V. stricta 90. 129.
V. tere-iuscula 236. 317.
V. tripartita 569.
V. virens 218. 236.
V. vulpina 236. 312. 315. 345.
Vinca herbacea 66. 96. 192. 249.
V. major 113. 125. 231. 304.
Vinca minor 28. 45. 89. 124. 142. 234. 303. 340. 773. 780.
Villarsia nymphoides 661. 668. 690.
Viola Allionii 100. 102. 119. 131. 257. 261. 296.
V. alpina 566.
V. biflora 82. 85. 219. 135. 136. 172. 219. 228. 329. 330. 510.
V. calcarata 577.
V. calcarata β. 577.
V. canina 4. 12. 14. 15. 31. 32. 41. 45. 68. 96. 100. 140. 143. 196. 249. 256. 320. 332. 338.
V. canina δ. lucorum 532.
V. cenisia 581.
V. collina 45. 142.
V. hirta 21. 31. 46. 66. 96. 143. 192. 249. 342.
V. lactea 146. 345.
V. littoralis 36. 114. 285.
V. lutea 573. 614.
V. mirabilis 60. 70. 106. 181. 198. 270.
V. odorata 3. 10. 15. 27. 29. 30. 38. 46. 49. 86. 91. 95. 122. 131. 143. 154. 773. 780.
V. palustris 381. 389. 390. 552. 554.
V. persicifolia 68. 129. 145. 196. 313. 314. 342.
V. pinnata 55. 135. 166. 329.
V. Riviniana 109. 272.
V. rothomagensis 153. 363.
V. rupestris 77. 211.
V. Ruppil 71. 81. 200. 219.
V. segetalis 234.
V. silvestris 95. 106. 247. 270.
V. syrtica 36. 114. 285.
V. uliginosa 37. 116.
V. tricolor 1. 36. 38. 42. 114. 119. 132. 285. 295. 321. 323. 758.
V. tricolor Var. δ. syrtica 36. 114. 285. 756.
V. Zoysii 577.
Viscum album 13. 39. 124.
Vitex Agnus castus 698.
Vitis laciniata 175.
V. vinifera 175. 221.

Vulpia bromoides 208. 350.	Willemetia apargioides 383. 506.	Zahlbrucknera paradoxa 572.
V. myuros 275.	Wulfenia carinthiaca 259.	Zannichellia gibberosa 611.
V. pseudomyuros 281. 301.	Xanthium spinosum 660 692.	Z. major 645.
V. sciuroides 281. 301.	X. Strumarium 643. 655. 660.	Z. pedunculata 689. 718.
V. uniglumis 275.	Xeranthemum annuum 663.	Z. polycarpa 645.
Waldsteinia geoides 27. 45. 85. 141. 227. 348.	X. annuum β . 214.	Z. repens 661. 690. 718.
Wahlenbergia hederacea 511.	X. cylindraceum 555.	Zea Mays 587.
Wiborgia parviflora 678.	X. inapertum 214.	Zizyphus vulgaris 391.
		Zostera marina 756.
		Z. uninervis 725.

Nachträge und Verbesserungen.

- Seite 9 Zeile 5 von unten ist statt *Tussilago laevigatus* zu lesen *Tussilago laevigata*.
- „ 34 Nr. 39 ist nach *Arum XXI.* zu lesen *Aron*.
- „ 42 Nr. 59 ist nach *Erodium* einzuschalten *XVI.*
- „ 49 Z. 11 ist statt *XXI* zu lesen *XIX.*
- „ 52 ist zu 3) „Auf Aeckern“ zu setzen (Vergl. auf Saatäckern).
- „ 72 Z. 3 von unten statt 12 lies 17.
- „ 94 u. 96 ist st. *Teesdalie* (vor *XV*) zu lesen *Teesdalia*.
- „ 96 Z. 2 v. u. st. *nudosa* l. *nodosa*.
- „ 102 Z. 5 ist statt *l.* zu lesen *λ.*
Ebend. Z. 12 v. u. st. *Allioni* l. *Allionii*.
- „ 104 Z. 4 v. u. st. *Crateagus* l. *Crateagus*.
- „ 105 Z. 7 v. unten st. *Anemone* lies *Amelanchier*.
- „ 141 Z. 15 st. *fruticans* l. *fruticans*.
- „ 150 Z. 19 statt *γ.* lies *β.*
- „ 154 Z. 11 ist statt *Lonicere* (vor *V*) zu lesen *Lonicera*.
- „ 158 ist zu 3) „Auf Aeckern“ zu setzen (Vergl. auf Saatäckern).
- „ 165 ist Z. 1 zu lesen: „Auf sonnigen Aeckern“ und vor *Barbarea* die Ueberschrift zu setzen: c) Auf steinigen Aeckern.
- „ 167 ist nach *Salix retusa* einzuschalten: *S. Wulfenia W. Wulfensche Weide*.
- „ 168 Z. 14 v. u. statt dunkeln lies trocknen.
- „ 174 Z. 3 v. u. statt *Homogene* lies *Homogyne*.
- „ 179 ist nach *Cheiranthus Cheiri* einzuschalten: *Geranium striatum* s. S. 394.
- „ 208 ist nach Z. 21 vor *Campanula Rapunculus* einzuschalten: *C. patula* s. S. 416.
Ebend. nach der letzten Zeile einzuschalten: *Dianthus Armeria* s. S. 416.
- „ 214 Z. 14 st. *runus* l. *Prunus*.
- S. 219 ist unter h) an feuchten, sandigen Plätzen zu setzen: *Tillaea muscosa* s. S. 425.
- „ 220 st. *Barbara* l. *Barbarea*.
- „ 221 ist zu *Potamogeton crispus* und *P. perfoliatus* zu setzen: in Flüssen.
Ebend. ist nach *Vitis vinifera* einzuschalten: *Armeria vulgaris* s. S. 736.
- „ 232 ist nach *Epimedium alpinum* einzuschalten: *Sisymbrium strictissimum* s. S. 220.
- „ 233 Z. 12 v. u. ist st. *Mlll.* zu lesen *Mill.* und Z. 8 v. u. st. *Asperagus* l. *Asparagus*.
Nach S. 235 ist zu verbessern 236.
- S. 243 können unter Nr. 43. a) noch die S. 170 f. auf Gries an Alpenbächen angegebenen Pflanzen eingeschaltet werden.
- „ 245 Z. 14 st. *fructicosus* l. *fruticosus*
Nach S. 245 ist zu verbessern 246.
- S. 259 Z. 2 v. u. st. *Rchh.* l. *Rchb.*
- „ 260 Z. 14 v. u. ist st. *l.* zu lesen *λ.*
- „ 261 Z. 6 statt *polygonum* l. *polygamum*.
- „ 262 Z. 14 st. *glaucum* l. *glaucescens*.
- „ 263 Z. 18 ist statt *C. P. blos P.* zu lesen.
- „ 274 auf der letzten Zeile st. *Sicth.* l. *Sibth.*
- „ 284 Z. 7 v. u. st. *Steenhammeria* l. *Steenhammera*.
- „ 287 Z. 12 st. *pallustre* l. *palustre*.
- „ 290 f. sind *Vignea acuta* bis *Carex Pseudo-Cyperus* herauszunehmen und auf S. 291 vor Nr. 71 unter die Ueberschrift: „Auf nassem Boden“ zu setzen.
- „ 293 ist nach *Campanula patula* einzuschalten *Cerastium arvense* s. S. 250.
Ebend. ist nach *Dianthus Caryophyllus* einzuschalten: *Alyssum montanum* s. S. 253.
- „ 294 ist *Kochia scoparia* gänzlich zu streichen.

S. 295 ist *Erythraea linarifolia* gänzlich zu streichen.

„ 296 Z. 7 v. u. st. *rubra* l. *rubens*.

„ 309 Z. 9 v. u. ist statt *Corydalis capnoides* zu lesen: *C. ochroleuca Koch.*, gelblichweisser Helmbusch.

„ 317 Z. 2 v. u. statt *caryophyllacea* l. *caryophyllea*.

„ 318 ist nach *Bromus mollis* einzuschalten: *Sagina procumbens* s. S. 159, und vor *Potentilla verna* schalte man ein *P. Anserina* s. S. 237.

„ 321 ist nach *Fragaria vesca* einzuschalten: *Sisymbrium Columnae* s. S. 306.

„ 322 Z. 4 v. u. ist *Lithospermum officinale* zu streichen.

„ 325 ist unter Nr. 99 *Carex Oederi* unmittelbar nach *Ranunculus sceleratus* zu stellen.

Ebend. ist nach *Callitriche verna* einzuschalten: *Potentilla supina* s. S. 314.

„ 327 ist nach *Rhamnus alpinus* einzuschalten: *Evonymus latifolius* s. S. 223.

„ 330 Z. 5 ist statt *Corydalis capnoides* u. s. w. zu lesen: *C. ochroleuca Koch.*, gelblichweisser Helmbusch.

„ 331 sind nach *Melica nutans* einzuschalten: *Pulmonaria azurea* s. S. 233 und *Symphytum tuberosum* s. S. 202; und nach *Pyrus nivalis* schalte man ein *Fragaria elatior* s. S. 137.

„ 333 ist nach *Helleborus dnmetorum* einzuschalten: *H. viridis* s. S. 197

„ 338 Z. 3 ist zu *Viola canina* zu setzen: Var. δ . *lucorum*.

Ebend. ist auf der letzten Zeile statt *laxiflora* zu lesen *laxiflora*.

Nach S. 345 ist zu verbessern 346.

S. 346 ist nach Z. 8 einzuschalten: In langsam fliessenden Wassern *Hippuris vulgaris* β . *fluitans* s. S. 540.

„ 348 ist nach *Euphorbia virgata* einzuschalten *Reseda lutea* s. S. 305

„ 349 ist nach *Sisymbrium officinale* einzuschalten: *S. pannonicum* s. S. 306.

„ 356 Z. 12 ist beizufügen: (An Zäunen.).

Ebend. ist nach *Symphytum officinale* einzuschalten: *S. patens* s. S. 240.

Ebend. ist nach *Pimpinella magna* einzuschalten: *Bunium Bulbocastanum* s. S. 327.

S. 358 Z. 13 v. u. ist statt *taraxifolia* zu lesen *taraxacifolia*.

„ 360 Z. 18 statt *multiflora* l. *multiflora*.

„ 368 ist nach *Chlora perfoliata* einzuschalten: An grasigen Abhängen der höhern Gebirge. *Gentiana obtusifolia* s. S. 431.

„ 370 ist zu 3) „Auf Aeckern“ zu setzen (Vergl. auf Saatäckern), Ebend. Z. 11 v. u. ist statt *Rhod.* zu lesen *Rohd.*

„ 371 Z. 8 v. u. ist bei *Porrum sphaerocephalon* beizufügen: (*Allium sphaerocephalon* L.).

„ 372 ist nach *Papaver dubium* einzuschalten: *P. intermedium* s. S. 369.

Ebend. ist nach *Delphinium Consolida* einzuschalten: *Nigella damascena* s. S. 562.

„ 373 ist nach *Crepis tectorum* einzuschalten: *Chondrilla juncea* s. S. 474.

„ 377 Z. 8 v. u. ist zu *Orobanche platystigma* zu setzen: beilnarbige Sommerwurz.

„ 380 ist nach *Ranunculus vaginatus* einzuschalten: *Tozzia alpina* s. S. 571.

„ 382 Z. 7 v. u. statt *Alpenkresse* l. *Alpenkreuzkraut*.

„ 383 ist nach *Campanula rhomboidalis* einzuschalten: *Phyteuma fistulosum* s. S. 436.

„ 384 Z. 10 v. u. ist nach „steinigen Orten“ zu lesen: und die Varietäten γ . *pedunculosa* und δ . *dianthifolia* in Thälern auf Gerölle.

„ 386 ist nach *Thlaspi alpinum* einzuschalten: *Geranium argenteum* und *G. silvaticum* s. S. 378

„ 390 ist nach *Olea europaea* einzuschalten: *Avena sativa* s. S. 584

„ 391 schalte man nach *Zizyphus vulgaris* ein: *Coriandrum sativum* s. S. 371.

„ 392 ist vor *Linum usitatissimum* einzuschalten: *L. humile* s. S. 371

Ebend. ist nach *Silene inflata* einzuschalten: *Spergula arvensis* s. S. 372.

„ 293 schalte man nach *Thymus vulgaris* ein: *Origanum Majorana* s. S. 586.

S. 396 ist bei Nr. 6 unter b) Auf dörren Anhöhen einzuschalten: *Avena tenuis* s. S. 370.

„ 397 f. ist unter *Porrum* beizufügen: *P. arenarium* s. S. 489 und *P. sphaerocephalon* s. S. 371.

Ebend. ist nach *Teucrium Botrys* einzuschalten: *Acinos villosus* s. S. 588.

„ 398 ist unter Nr. 7 zu setzen: *Reseda Luteola* s. S. 495.

„ 400 ist zu *Ranunculus fluitans* Lam. zu setzen (*R. aquatilis* δ . Linn.)

„ 401 ist bei *Silene cerastoides* einzuschalten: *S. noctiflora* s. S. 483

„ 402 ist vor *Vicia sativa* einzuschalten: *V. hybrida* s. S. 373.

„ 404 Z. 2 ist statt Zwillingsrose zu lesen: zweiblühige Rose.

Ebend. Z. 6 ist nach *Iris biflora* einzuschalten: *Agrostis vulgaris*.

„ 405 an Bergabhängen ist vor *Luzula albida* einzuschalten: *Myosotis sparsiflora* s. S. 230.

Ebend. zu *Polygala comosa* zu setzen: und Var. β . *Hoppeana* (im südlichen Gebiete).

Ebend. c) ist nach *Betonica officinalis* einzuschalten: *Trifolium agrarium* s. S. 420.

„ 406 letzte Zeile statt *nigrescens* l. *nigricans*.

„ 407 Zeile 4 ist zu *Veronica officinalis* zu setzen Var. β .

„ 417 Z. 20 ist nach *Campanula Rapunculus* einzuschalten: *Armeria vulgaris*.

„ 418 ist unter Nr. 29 zu setzen: *Rosa spinosissima* s. S. 454.

„ 419 ist nach *Potentilla argentea* einzuschalten: *Thalictrum majus* s. S. 454; nach *Genista tinctoria* einzuschalten: *Cytisus nigricans* s. S. 406 und nach *Hypericum montanum* einzuschalten: *Hieracium Lachenalii* s. S. 474.

„ 420 ist nach der letzten Zeile einzuschalten: *Helianthemum alpestre* s. S. 458.

„ 424 ist nach *Poa trivialis* einzuschalten: *Brachypodium gracile* S. 468.

Ebend. Z. 14 v. u. ist zu *Sagina procumbens* zu setzen β . *fontana*.

Ebend. unter b) einzuschalten: *Ranunculus aconitifolius* β . *platanifolius* s. S. 482.

S. 425 ist unter e) zu setzen: *Vignea remota* s. S. 218.

„ 428 ist unter c) nach *Calamagrostis acutiflora* einzuschalten: *Lythrum virgatum* s. S. 506.

„ 430 ist unter b) einzuschalten: An Felsen. *Sabulina Gerardi* siehe S. 421.

Ebend. nach der letzten Zeile: An Waldrändern. *Euphorbia amygdaloides* s. S. 529.

„ 431 ist unter k) nach *Gentiana obtusifolia* einzuschalten: In höheren Gebirgen auf Wiesen. *Poa sudetica* s. S. 383.

„ 432 Z. 10 ist statt *cineraria* zu lesen: *cinerea*.

„ 434 ist zu *Ranunculus aconitifolius* zu setzen: β . *platanifolius*, und nach diesem Artikel: *Cardamine trifolia* s. S. 523.

„ 437 Z. 20 ist statt *macroanthus* zu lesen: *macroacanthus*.

„ 438 Z. 9 ist nach *Mespilus vulgaris* einzuschalten: *Cydonia vulgaris*.

„ 439 ist vor g) einzuschalten: Zwischen Gebüsch an Kalkbergen. *Coronilla montana* s. S. 620.

„ 441 ist nach *Silene conoidea* einzuschalten: *Agrostemma Githago* s. S. 621.

„ 442 Z. 8 ist statt *Scabiose* zu lesen: *Scabiosa*.

Ebend. Z. 13 statt *campestris* lies *compressus*.

Ebend. nach *Geranium palustre* einzuschalten: *Althaea officinalis* s. S. 437.

„ 443 Z. 15 v. u. statt *Heliosciadium* l. *Helosciadium*.

„ 444 Z. 6 statt *platyacanthus* l. *platyacanthum*.

„ 447 ist unter Nr. 44 nach *Chondrilla prenanthoides* einzuschalten *Linaria alpina* s. S. 170.

„ 449 Z. 3 statt *Siv.* lies *Sw.*

„ 453 Z. 3 ist nach *Thesium comosum* einzuschalten: *Th. ramosum*.

„ 456 Z. 5 statt *Bulb.* lies *Balb.*
Ebend. Z. 5 v. u. statt *Lisimachia* l. *Lysimachia*.

„ 459 Z. 10 statt *alpestre* l. *alpestris*.

Ebend. ist unter g) einzuschalten: *Saxifraga oppositifolia* s. S. 520.

„ 461 Z. 9 v. u. statt *glaucum* l. *glaucescens*.

„ 464 Z. 15 v. u. st. *Gloerke* l. *Floerke*.

- S. 467 ist unter Nr. 60 einzusetzen; *Potamogeton trichoides* s. S. 509
- „ 470 ist nach *Dactylis hispanica* einzuschalten: *Asterocephalus Scopoli* s. S. 639.
- „ 471 ist nach *Rapistrum glabrum* einzuschalten: *Matthiola annua* s. S. 640.
Ebend. nach *Genista sibirica* einzusetzen: *Lupinus varius* s. S. 640.
- „ 476 Z. 7 v. u. zu *Polygonum aviculare* zu setzen: α . *triviale*.
- „ 478 Z. 17 v. u. statt *Alectrolophus* l. *Alectorolophus*.
- „ 480 unter Nr. 72 st. *Heliosciadium* l. *Helosciadium* und ebendas. st. Wasser-Sumpfdoldchen lies schwimmendes Sumpfdoldchen.
- „ 483 Z. 15 ist statt L. Herit zu lesen l' Herit.
- „ 486 Z. 8 statt *Arrhenaterum* lies *Arrhenatherum*.
- „ 487 Z. 8 statt Rtv. l. Riv.
Ebend. ist nach *Coronilla varia* einzuschalten: *Chondrilla juncea* s. S. 474.
- „ 490 Z. 10 v. u. statt Devf. l. Desf.
- „ 495 Z. 4 st. Wierzbeck. l. Wierzbick.
- „ 497 ist nach *Barkhansia graveolens* einzuschalten: *Chondrilla juncea* s. S. 474.
- „ 498 ist zu *Chara* l. zu setzen: (XXI)
Ebend. Z. 9 v. u. statt *Sabulina* zu lesen *Subularia*.
- „ 501 Z. 7 v. u. statt *Mathiola* lies *Matthiola*.
- „ 505 Z. 7 v. u. ist nach *Heleocharis palustris* einzuschalten: *Myosotis palustris*.
- „ 508 ist zu *Chara* l. zu setzen: (XXI)
- „ 509 ist bei *Potamogeton* einzuschalten: *P. gramineus* s. S. 498, und *P. obtusifolius* s. S. 733.
- „ 511 ist nach *Cynosurus cristatus* einzuschalten: *Sagina procumbens* s. S. 159.
- „ 514 ist nach *Verbascum floccosum* einzuschalten: *Sisymbrium Columnae* s. S. 306.
Eb. bei *Chara* l. beizusetzen: (XXI).
- „ 515 ist *Bunium Bulbocastanum* zu streichen.
- „ 518 ist nach *Cyperus patulus* einzuschalten: *Armeria vulgaris* s. S. 318.
- „ 525 Z. 11 statt inflato l. inflata.
- „ 530 ist bei *Lactuca* einzuschalten: *L. augustana* s. S. 685.
- S. 539 Z. 3 v. u. statt *altifolius* lies *obtusifolius*.
Ebend. Z. 1 v. u. statt Liz. l. Ziz.
- „ 541 ist nach *Hordeum pratense* einzuschalten: *Lolium perenne* s. S. 368.
- „ 542 ist bei *Reseda* einzuschalten: *R. lutea* s. S. 305.
- „ 543 ist bei *Carduus* einzuschalten: *C. tenuiflorus* s. S. 414.
- „ 545 Z. 8 st. *stellulatum* l. *stellatum*.
Ebend. ist auf der letzten Zeile beizufügen: *Nigella damascena* s. S. 562.
- „ 554 ist nach Z. 3 einzuschalten: *Centaurea adonidifolia* s. S. 696.
- „ 555 Z. 3 v. u. statt 5) An Wiesenrändern l. auf trocknen Wiesenhügeln.
- „ 556 Z. 1 ist zu lesen: 5) An Wiesenrändern.
- „ 557 Z. 2 v. u. st. *diurna* l. *dioica*.
- „ 560 ist bei Nr. 3) Auf Aeckern beizufügen: (Vgl. auf Saatäckern).
Ebend. vor *Digitaria* einzuschalten: *Valerianella olitoria*, zweite Generation vom April s. S. 52.
Ebend. Z. 4 v. u. st. *Ischaenum* l. *Ischaemum*.
- „ 561 ist nach *Lolium temulentum* einzuschalten:
Succisa, IV. Abbiss-Scabiose.
S. transylvanica (*Scabiosa transylvanica* L.), siebenbürgische Scabiose.
- „ 575 statt *Sieberia* l. *Siebera*.
- „ 576 statt *Oxyris* l. *Oxyria*.
- „ 577 Z. 3 v. u. ist zu *Viola Zoysii* zu setzen: Wulf.
- „ 578 ist bei *Aconitum* einzuschalten: *A. Koelleianum* s. S. 570.
Ebend. ist nach *Aconitum tauricum* einzuschalten: *Pedicularis rostrata* s. S. 703.
- „ 579 ist nach *Gentiana nivalis* einzuschalten: *Sibbaldia procumbens* s. S. 675.
Ebend. bei *Potentilla* einzuschalten: *P. frigida* s. S. 676.
- „ 589 Z. 9 ist nach *Genista decumbens* einzuschalten: *Hieracium Pilosella*.
- „ 590 ist bei *Potamogeton* einzuschalten: *P. plantagineus* s. S. 708.
- „ 591 Z. 20 statt *Borugo* l. *Borrugo*.
- „ 592 Z. 12 v. u. statt *plathyphyllos* l. *platyphyllos*.

- S. 593 Z. 17 ist nach *Euphorbia Lathyris* einzuschalten: *Lamium album*.
- „ 595 ist unter Nr. 14 b) einzuschalten: In Berggegenden zwischen Gebüsch. *Epilobium montanum* s. S. 709.
- „ 597 statt *Triodia* l. *Triodia*.
- „ 598 ist unter Nr. 18 auf *Brachäcker* zu setzen: *Valerianella olitoria* zweite Generation vom April s. S. 73.
- „ 599 ist unter Nr. 24 einzuschalten: In Dörfern an feuchten Orten. *Polygonum Hydropiper* s. S. 607.
- „ 601 ist nach *Nepeta citriodora* einzuschalten: *Mentha arvensis* s. S. 562.
- „ 605 Z. 15 statt *cariophylloides* l. *caryophylloides*.
- „ 606 Z. 14 v. u. ist nach *Hippocrepis comosa* einzuschalten: *Hieracium murorum*.
- „ 609 ist unter Nr. 34 in Fichtenwäldern zu setzen: *Silene chlorantha* s. S. 630.
- „ 612 ist nach *Lythrum virgatum* einzuschalten *Trifolium pannonicum* s. S. 695.
- „ 613 Z. 15 statt *Korh.* l. *Koch*.
- „ 614 Z. 13 ist bei *Potentilla aurea* beizufügen s. S. 169.
Ebend. ist *Orchis speciosa* nach *Meum athamanticum* zu setzen.
- „ 616 Z. 8 statt *Osthrutium* lies *Ostruthium*.
- „ 619 ist bei *Senecio* einzuschalten: *S. Cacaliaster* s. S. 717.
- „ 624 unten ist vor *Schelhammeria* einzuschalten: *Zannichellia repens* s. S. 661.
- „ 627 ist unter Nr. 47) An Hecken zu setzen: *Asparagus acutifolius* s. S. 619.
- „ 628 ist nach *Laserpitium pruthenicum* zu setzen (*Tormentilla erecta*, *Ajuga pyramidalis*, *Alectorolophus minor*, *Leontodon hispidus* s. May S. 246 und die im Jun S. 448 f. angegebenen Pflanzen.)
Ebend. Z. 2 v. u. statt *Alcaea* l. *Alcea*.
- „ 629 Z. 5 statt *Cnidus* l. *Cnicus*.
- „ 630 Z. 3 statt *Bunias* l. *Bunius*.
- „ 633 Z. 3 statt *alpinum* l. *alpinus*.
Ebend. ist nach *Papaver pyrenaicum* einzuschalten: *Pedicularis rostrata* s. S. 703.
- „ 634 Z. 3 v. u. statt *Christa* l. *Crista*.
- S. 635 Z. 15 statt *Athamantha* lies *Athamanta*.
- „ 639 Z. 8 statt *Asterocephalus* III l. *Asterocephalus* IV.
- „ 643 Z. 18 ist nach *Corydalis lutea* einzuschalten: *Hieracium murorum*.
- „ 644 Z. 8 v. u. statt an l. in.
- „ 645 ist zu *Chara* l. zu setzen (XXI).
- „ 646 Z. 10 von unten statt *Pneumnanthe* l. *Pneumnanthe*.
- „ 649 Z. 3 statt *cyperioides* l. *cyperoides*.
- „ 650 ist nach Z. 8 einzuschalten: An Quellen zwischen Gebüsch. *Senecio Cacaliaster* s. S. 717.
- „ 651 Z. 11 statt *Picreus* l. *Pycreus*.
Ebend. Z. 7 von unten statt *Alsina* l. *Arenaria*.
- „ 653 ist zu *Asparagus officinalis* zu setzen: s. S. 401.
- „ 654 Z. 13 statt *Picreus* l. *Pycreus*.
Ebend. Z. 9 von unten statt *Illeborum* l. *Illecebrum*.
- „ 655 ist unter f) in Sandgegenden zu setzen: *Calamagrostis Epigeios* s. S. 610.
- „ 659 ist *Iberis pinnata* zu streichen.
- „ 663 Z. 3 v. unten statt *Picreus* l. *Pycreus*.
- „ 668 Z. 4 von unten ist zu *Potamogeton gramineus* zu setzen: s. S. 489, und nach *P. pectinatus* einzuschalten: *P. plantagineus* s. S. 689.
- „ 669 Z. 2 statt *Hyprolapathum* l. *Hydrolapathum*.
- „ 671 ist nach *Dipsacus silvestris* einzuschalten: *Thrincia hispida* s. S. 734.
- „ 672 ist zu *Sonchus oleraceus* zu setzen: s. S. 191 und zu *Leontodon hispidus* s. S. 181.
- „ 672 ist statt *Picreus* zu lesen: *Pycreus*.
Ebend. Z. 16 nach *Limnochloa acicularis* das L. zu streichen.
- „ 674 Z. 13 v. u. statt *cyperioides* l. *cyperoides*.
- „ 675 ist vor *Chenopodium album* einzuschalten: *Armeria vulgaris* s. S. 318.
Ebend. ist auf der letzten Zeile zu *Sibbaldia procumbens* zetzen: (Auf den höchsten Jochen.)
- „ 676 Z. 14 statt *Forst-Fingerkraut* l. *Frost-Fingerkraut*, und dazu: (Auf den höchsten Jochen).

S. 681 Z. 5 ist statt s. unter d zu lesen: s. unter a.

„ 684 ist nach *Festuca rubra* einzuschalten:

Succisa, IV. Abbiss-Scabiose.

S. transylvanica (*Scabiosa transylvanica* L.), siebenbürgische Scabiose.

„ 685 Z. 7 v. u. ist zu *Jasione montana* zu setzen Var. *cespitosa*.

„ 686 Z. 2 v. u. ist zu lesen: *Inula*, XIX. Alant. I. *hirta* L., steifhaariger Alant.

„ 688 Z. 11 ist zu lesen: *Calamintha*, XIV. Calaminthe. *C. officinalis* Mnch. (*Melissa Calamintha* L.), Berg-Melisse.

Ebend. Z. 17 v. u. ist vor *Rhamnus* einzuschalten: *Veronica serpyllifolia*, und Z. 15 v. u. vor *Evonymus* einzuschalten: *Hieracium murorum*.

„ 689 statt *Picreus* l. *Pycereus*.

„ 690 Z. 17 statt in Wasserbächen l. in Wassergräben.

„ 690 und 693 ist statt *Succisa transylvanica* zu lesen: *Succisa*, IV. Abbiss-Scabiose. *S. transylvanica* (*Scabiosa transylvanica* L.) siebenbürgische Scabiose.

„ 696 Z. 15 statt *adonidifolia* l. *adonidifolia*.

„ 697 Z. 3 von unten statt *angustifolia* l. *angustifolia*.

„ 702 Z. 3 statt *Serp.* l. *Scop.*

Ebend. Z. 10 statt s. M. lese man: s. May.

„ 703 Z. 7 von unten statt *galcialis* l. *glacialis*.

„ 704 Z. 3 statt *Strub.* l. *Strnb.*

„ 708 Z. 7 von unten statt *Oreoselinum* l. *Oreoselinum*.

„ 710 Z. 10 von unten st. *Act.* l. *Ait.*

Ebend. Z. 9 von unten sollte *Drosera* u. s. w. klein gedruckt und eingeschlossen seyn.

S. 711 Z. 7 von unten statt *Barth.* l. *Bartl.*

„ 712 Z. 12 statt *Allyssum* l. *Alyssum*.

„ 714 Z. 3 statt *Korh.* l. *Koch.*

Ebend. Z. 17 von unten statt *Cucubalu* l. *Cucubalus*.

„ 718 Z. 9 statt 596 l. 590.

„ 720 Z. 10 ist vor *Leontodon hispidus* einzuschalten: *Ajuga pyramidalis*.

„ 722 Z. 2 ist nach *Potentilla minima* einzuschalten: *Saponaria ocyroides*.

„ 725 Z. 15 von unten statt *Forks* l. *Forsk.*

„ 727 ist nach der letzten Zeile beizufügen: *K. scoparia* s. S. 699. Ferner c) Auf Salzwiesen *Erythraea linarifolia* s. S. 725, und dagegen sind diese beiden Artikel auf S. 728 Z. 3 zu streichen.

„ 730 Z. 13 ist nach *Mycelis muralis* einzuschalten: *Crepis tectorum*.

„ 737 Z. 10 ist *Valeriana montana* vor *Bunium* zu setzen.

„ 742 soll der Columnentitel nicht September, sondern August heissen.

„ 754 Z. 15 von unten ist nach *Lloydia serotina* einzuschalten: *Saponaria ocymoides*.

„ 758 Z. 15 ist *Kochia scoparia* zu streichen.

Ebend. auf der letzten Zeile statt *Bscutella* l. *Biscutella*.

„ 762 ist bei Nr. 79 unter A. An Teichen einzuschalten: *Caltha palustris* s. S. 314.

Im Register ist S. 802 bei *Calla palustris* beizufügen 478 und dagegen diese Ziffer bei *Caltha palustris* zu streichen.

- S. 681 Z. 5 ist statt s. unter d zu lesen: s. unter a.
- „ 684 ist nach *Festuca rubra* einzuschalten:
Succisa, IV. Abbiss-Scabiose.
S. transylvanica (*Scabiosa transylvanica* L.), siebenbürgische Scabiose.
- „ 685 Z. 7 v. u. ist zu *Jasione montana* zu setzen *Var. cespitosa*.
- „ 686 Z. 2 v. u. ist zu lesen: *Inula*, XIX. Alant. I. *hirta* L., steifhaariger Alant.
- „ 688 Z. 11 ist zu lesen: *Calamintha*, XIV. Calaminthe. *C. officinalis* Munch. (*Melissa Calamintha* L.), Berg-Melisse.
 Ebend. Z. 17 v. u. ist vor *Rhamnus* einzuschalten: *Veronica serpyllifolia*, und Z. 15 v. u. vor *Evonymus* einzuschalten: *Hieracium murorum*.
- „ 689 statt *Picreus* l. *Pycereus*.
- „ 690 Z. 17 statt in Wasserbächen l. in Wassergräben.
- „ 690 und 693 ist statt *Succisa transylvanica* zu lesen: *Succisa*, IV. Abbiss-Scabiose. *S. transylvanica* (*Scabiosa transylvanica* L.) siebenbürgische Scabiose.
- „ 696 Z. 15 statt *adonidifolia* l. *adonidifolia*.
- „ 697 Z. 3 von unten statt *angustifolia* l. *angustifolia*.
- „ 702 Z. 3 statt *Serp.* l. *Scop.*
 Ebend. Z. 10 statt s. M. lese man: s. May.
- „ 703 Z. 7 von unten statt *galcialis* l. *glacialis*.
- „ 704 Z. 3 statt *Strub.* l. *Strnb.*
- „ 708 Z. 7 von unten statt *Oreoselium* l. *Oreoselinum*.
- „ 710 Z. 10 von unten st. *Act.* l. *Ait.*
 Ebend. Z. 9 von unten sollte *Drosera* u. s. w. klein gedruckt und eingeschlossen seyn.
- S. 711 Z. 7 von unten statt *Barth.* l. *Bartl.*
- „ 712 Z. 12 statt *Allyssum* l. *Alyssum*.
- „ 714 Z. 3 statt *Korh.* l. *Koch.*
 Ebend. Z. 17 von unten statt *Cucubalu* l. *Cucubalus*.
- „ 718 Z. 9 statt 596 l. 590.
- „ 720 Z. 10 ist vor *Leontodon hispidus* einzuschalten: *Ajuga pyramidalis*.
- „ 722 Z. 2 ist nach *Potentilla minima* einzuschalten: *Saponaria ocy-moides*.
- „ 725 Z. 15 von unten statt *Forks* l. *Forsk.*
- „ 727 ist nach der letzten Zeile beizufügen: *K. scoparia* s. S. 699. Ferner c) Auf Salzwiesen *Erythraea linarifolia* s. S. 725, und dagegen sind diese beiden Artikel auf S. 728 Z. 3 zu streichen.
- „ 730 Z. 13 ist nach *Mycelis muralis* einzuschalten: *Crepis tectorum*.
- „ 737 Z. 10 ist *Valeriana montana* vor *Bunium* zu setzen.
- „ 742 soll der Columnentitel nicht September, sondern August heißen.
- „ 754 Z. 15 von unten ist nach *Lloydia serotina* einzuschalten: *Saponaria ocymoides*.
- „ 758 Z. 15 ist *Kochia scoparia* zu streichen.
 Ebend. auf der letzten Zeile statt *Bscutella* l. *Biscutella*.
- „ 762 ist bei Nr. 79 unter A. An Teichen einzuschalten: *Caltha palustris* s. S. 314.

Im Register ist S. 802 bei *Calla palustris* beizufügen 478 und dagegen diese Ziffer bei *Caltha palustris* zu streichen.

Dobel, Carl Friedrich,

Neuer Pflanzen-Kalender oder Anweisung, welche in Deutschland wachsenden
Pflanzen man in jedem Monate blühend finden könne, und an welchem
Standorte nach dem jetzigen Standpunkte der Botanik eingerichtet
Bd.: 2

Nürnberg (1835)

Phyt. 133 n-1/2

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10476992-9